

**HERMANNI
BOERHAAVE DE
COGNOSCENDIS ET
CURANDIS MORBIS
APHORISMI VNACUM
EIVSDEM DE...**

Herman Boerhaave, Karl
Friedrich Kaltschmied





8
92



HERMANNI BOERHAAVE

DE
COGNOSCENDIS

ET

CVRANDIS MORBIS

APHORISMI

VNACVM

EIVSDEM

DE

MATERIA MEDICA

ET

REMEDIORVM FORMVLIS
LIBELLO

AD

SINGVLOS APHORISMOS DIGESTO

ET

SCRIPTORVM BOERHAAVIANORVM INDICE

DENVO

MVLTO EMENDATIORES ET AVCTIORES

PRODEVNT

CVM PRAEFATIONE

CAROLI FRIDERICI KALTSCHMIED

D. ET P. P. O. MEDICINAE, EIVSDEMQUE ORDINIS
IN ACADEMIA IENENSI SENIORIS.

LIPSIAE ET FRANCOFVRTI

PROSTANT APVD I. C. FISCHERVVM. 1758.







LECTORI BENEVOLO

S. P. D.

CAROLVS FRIDERICVS KALTSCHMIED.

Tanto utique nostra tempora prae antiquis artium ac scientiarum splendore fulgent, ut ea, quae iam venusto satis corpore incidunt, olim vix adumbrata comparuerint. Eminenti certe gradu haec arti medicae contigit felicitas, ut sectatores nacta satis strenuos, intra seculi limites caput extollere potuerit, ita, ut, quae antea tenebris obuoluta, ac incerta fragilique nitebantur probabilitate, iam firmo ac inconcusso stent fundamento, inuentis variis, inuentoribus suis artique ipsi eandem conciliantibus famam ac auctoritatem. Mitto, quae ex sagaci ac indefessa celeberrimorum physicorum diligentia in artem

PRAEFATIO.

nostram redundarunt emolumenta. Mitto, quae ars salutaris ex applicatione rei mathematicae, legum v. g. mechanicarum cepit incrementa. Mitto, quae ex iniectionibus in vascula corporis fere minima, in corporis nostri penetralia accesserit inquirendi facilitas, circuitusque humorum perspicuitas. Mitto, quae rei chirurgicae accesserint inuenta ac emolumenta. Quae vero admiratio ac voluptas subit animum, si thesaurum illum incomparabilem perspicimus, quem foecundissima inuentorum aetas in perscrutatione materiae, quam vocant, medicae collegit, imo cumulavit. Quantum praecleari chimici, quantum botanici celeberrimi, quantum acutissimi physici huic addidere augmentum? Ast indignatione perfusi quilibet rei medicae fautores statoresque eiusdem faciem intuentes acerbis certe

PRAEFATIO.

te querelis inuehere coguntur in temeritatem, simplicitatem ac negligentiam eorum, qui nostris temporibus tantis opibus tantisque rei medicae eo vsque thesauris abutuntur, vt hodie ex tanta medicamentorum suppellectile eiusdemque peruerso vsu plus saepe damni in genus humanum, quam utilitatis ac emolumenti redundare perspiciamus.

Commune quidem ab omni aeuo hoc artium scientiarumque incrementis fuit infortunium, vt impedimenta aequali fere robore augmentorum felicitatem infringere ac aemulari fuerint conata, prae reliquis tamen ars salutaris infensa multorum molimina non potest non fatis deplorare. Et quis omnium calamitatum remedicam affligentium funesta breui spatio saltem recensere voluerit nomina, cum fere tot scatero

PRAEFATIO.

videamus naeuis cateruameorum,
qui medicinam peruerse faciunt,
quam quot pretiosis illis naturae
et artis beneficiis materiae fulget
medicae apparatus.

Quaedam saltem acu, quod
aiunt, tangere placet, quae com-
modum in salutem generis huma-
ni ex thesauro medicamentorum
expectandum maxime infringunt
atque imminuunt.

Ex incuria utique medicorum
complurium factum est, ut ad va-
na emanauerit ingenia, ad simpli-
ces peruenerit aures notitia medi-
camentorum etiam prae reliquis
laudabilium, imo, quae vocant,
heroicorum. Quantam horum
temerario usu non solum medica-
stri, sed et ii, qui ab omni alias no-
titia rei medicae abhorrent, edant
stragem, quotidiana testatur ex-
perientia. Quantas abusus mer-
curii saluti hominum infert cala-
mita-

PRAEFATIO.

mitates, quantas calidiorum ac fortiorum medicamentorum abusus edit noxas, vt tot fere homines peruerso vfu remediorum sanitatis patiantur iacturam, quam quot ex corporis fragilitate congenita naturae soluunt debita? aegris tot calices mortis ab imperitis ac nefariis saepe artis opprobriis propinantur, quod pocula vitae a peritis artis sectatoribus vix possunt praeparari.

Quanta hinc in salutem generis humani redundaret felicitas, haud fatis possumus prosequi eloquio, si legum seueritate prospectum esset, ne quis rei medicae non satis gnarus, nec arte politus medicinam facere, aut medicamenta exhibere tentet, neque ex pharmacopoliis cuiquam medicamenta repetere fas esset, nisi a medico probata atque ipsius auctoritate concessa. Quot hominum legiones mortis

PRAEFATIO.

faucibus erepti sanitatem lege publica conseruatam laeti exsultarent? Ast et in ipso medicamentorum tanto apparatu auctoritate publica rei medicae selectus satis sollicitè procuratus non minorem afferret vtilitatem. Tanta enim pharmacorum moles tam accuratam tamque feruidam in acquirendis, in praeparandis conseruandisque innumerae fere copiae medicamentis requirit industriam, vt hominis vix vires sufficiant, singulis decenter prospiciendi. Ex tanta igitur remediorum suppellectile si ea, quae a peritis medicis seligerentur ac vsui publico proficua prae reliquis iudicarentur, summo postea rigore in pharmacopoliis accuratissimae praeparationi subiicerentur legumque auctoritate conseruarentur. Habere, quod et medici et rei pharmaceuticae amatores multum in facien-

cienda medicina iuuaret, compendium, et pharmacopolae accurata magis elaboratione ac conseruatione selecto eiusmodi thesauro decenter possent prospicere, cum tanta copia rerum obruti officio satisfacere ipsis vix integrum sit. Est interdum, vt et maioris pretii medicamina prae reliquis aegrotum reficiant, ast eam in pharmacopoliis pretiosorum copiam, quae vulgo iis inferuntur, vix publico inferuire commodo sagaciores rei medicae sectatores haud fugiet. Et quamuis peruersus seculi genius ad rariora aequae ac chariora saepius rapiat delicatiores, vt iis solum inhient in sanitate tuenda remediis, quae multo pretio vel labore e longinquo reperiuntur, quamuis animalia locorum patientia genita vernaculis saepe vtentia facilius cum sanitate in gratiam redire ament, quam mortife-

PRAEFATIO.

tiferis saepe diffitis regionibus aduolantibus remediorum opibus, haud tamen eorum causa, qui morbos inepta ratione tentare eosque profligare desiderant, pharmacopolii moles crescere remque medicam magis operosam magisque difficilem reddere fas est.

Perfpice, LECTOR BENEVOLE, paruum huncce libellum, auctore celeberrimo, et commentatore magni nominis et famae L. B. a SWITEN vere dignum, lectu dignissimum, nec inuenies ea, quae nostro tempore pharmacopolia onerant, medicamenta; sufficientia tamen cuilibet, qui medici, ductum sanae rationis et artis sequentis, nomen aequè tueri satagit ac famam, verbo, qui dignus laude *Boerhauiana*. Dabam Ienae die 28 Maii 1757.

66X 55 723

PRAE-



PRAEFATIO NOVA
EDITORIS.

LECTORI BENEVOLO

S. P. D.
EDITOR.

Si quae sunt praeclara diuini ingenii
monimenta, quae statim non solum
omnium eruditorum meruerunt plau-
sum et admirationem, sed etiam post au-
ctoris obitum auctoritatem, quam ab eo
acceperant, tuentur et in dies magis ma-
gisque augment, ea profecto sunt, quae in
arte medendi Magnus BOERHAAVIUS
reliquit nobis et posteris huic et futuro
saeculo profutura. Medicorum hic Prin-
ceps temporis nostri Hypocrates sum-
mum sese praestitit, dum viueret, artis sa-
lutaris Doctorem, tam doctrina quam scri-
ptis excellentem. E huius schola tam-
quam

PRAEFATIO.

quam ex equo Troiano meri exiere principes, *Albini, Gorteri, Gaubii, van Royen* et *van Switen* et plures adhuc alii, quos nunc intelligimus, alio loco nominabimus honorificentissime. Hi Magni Summi Doctoris discipuli, si insignia et maxime illustria eius merita ipsi iam dudum haud tribuissent sempiternam nominis celebritatem, illi reddunt vitam ac immortalitatem.

Hinc non solum aulae summorum ac maximorum Principum, sed Musarum sacra in iisque doctorum scholae personant laudibus *Boerhaavianis* ac principis, quibus tam in sanandis morbis, quam in erudiendis discipulis maximo utuntur fructu. Celeberrimi medici id vnice agunt, ut placita *Boerhaauiana* eruditius illustrent commentariis, quos suo loco recensere a re nostra haud erit forsitan alienum. Et sicuti inter genuino scripta *Boerhaauiana* eminent de sanandis et curandis morbis aphorismi, digni quoque iudicati sunt, qui iussu S. R. I. Caesareae Maiestatis in omnibus academiis caesareis non solum in scholis a Doctoribus explicentur, sed in quamplurimis aliis academiis etiam extra Germaniam Doctorum praelectionibus inseruiant. Praeterea

PRAEFATIO.

tereā Vir summe Illustris GERARDVS van SWIETEN temporis nostri Galenus, dignissimus tanto Magistro discipulus, qui, ut ipse testatur, viginti annorum spatio scholas Boerhaauianas frequentauit, huncque Doctorem pertinaci industria summoque studio est sectatus, ab eoque omnia, quae in arte medendi sunt vera, recta, pulchra et recondita, et ad perficiendum consumatum medicum faciunt, accepit, opere magno et exaltato multo labore ac summo studio elaborato, et sub inscriptione Commentariorum in laudatos *Boerhaauii* Aphorismos III. Tomis 4. maj. *Amstelodami* editum cum orbe erudito communicauit, spemque fecit, fore ut hos elegantissimos commentarios Tomo IV. perficiat, quem orbis litteratus auide expectat.

In his egregiis Commentariis Magnus van SWIETEN omnem thesaurum eruditionis Boerhaauianae effudit et alterum sese praebuit *Boerhauium* et tantum hic praeceptoris optimo addidit rependitque immortalitatis, quantum ille in erudiendo ac perficiendo hoc Excellenti et Magno discipulo impendit operae et laboris.

Variae

PRAEFATIO.

Variae extant horum aphorismorum editiones. Primum hi Aphorismi Lugduni Batauorum 1709. 8uo typis descripti sunt, quibus variae successerunt editiones, inter quas eminent, ea, quae Lugduni Batauorum 1737. 8uo recusa est; et ea, quam celeberrimus B. *Schulzius* Halaë 1739. 8uo iuxta priorem denuo typis exprimendam curauit. Priorem ut meliorem commendat ipse auctor, posteriorem emendauit ac correxit experientissimus *Schulzius* praeclarus horum aphorismorum interpret.

Has sequimur editiones, dum de noua instruenda ac euulganda saepius laudatorum aphorismorum editione cogitamus. Huic singulare decus atque ornamentum conciliauit magni nominis Medicus, Illustris KALTSCHMIED docta et eleganti praefatione, qua hanc nostram adornauit editionem. Et ne omnino nihil ad augendam ac perficiendam hanc nouam aphorismorum Boerhaauianorum editionem contulisse videamur; breuem scriptorum *Boerhaauianorum* indicem subiicere e re nostra esse credidimus, quam TVO NUNC BENEVOLE LECTOR sistimus obtutui.

Her-

PRAEFATIO.

Hermanni Boerhaavii illustre ac immortale nomen haec prae se ferunt scripta :

1. *Oratio academica*, qua docetur, bene intellectam a *Cicerone* et refutatam esse *Epicuri* de summo bono sententiam.
2. *Oratio* de commendando studio hypocrático 1701. in opusc. p. 9.
3. - - de usu ratiocinii mechanici in medicina 1703. in opusc. p. 9.
4. - - de repurgatae medicinae facili simplicitate 1709. in opusc. p. 19.
5. - - de comparando certo in physicis 1715. in opusc. p. 27.
6. - - de Chemia suos errores expurgante 1718. in opusc. p. 36.
7. - - de vita et obitu clarissimi *Bernardi Albini* 1731. in opusc. p. 44.
8. - - habita, quum honesta missione impetrata Botanicam et Chemicam professionem publice deponeret 1729. in opusc. p. 44.
9. - - de honore Medici servitute 1731. in opusc. p. 59.
10. - - de Chemia suos externos expurgante L. B. 1718.

II. *Dis-*

PRAEFATIO.

11. *Disputatio philosophica inauguralis de distinctione mentis a corpore.* Lugd. Batav. 1690. 4to.
12. - - *medica inauguralis de utilitate explorandorum in aegris excrementorum et signorum.* Harderouici 1693.
13. *Institutiones medicae in usus annuae exercitationis domesticae* 1708. L. B. 8. prodierunt quas octo aliae secutae sunt editiones omnibus sat notae atque cognitae, vltima earum editio typis descripta est Norimbergae 1756. 8uo.

Has commentariis suis adornarunt Cl. HEVMANNVS cuius commentarii 1752. Lugd. Batav. 8uo IV. partibus typis expressi sunt; et illustris HALLERVS qui praelectiones academicas in proprias rei medicae institutiones, (*Boerhaavii* nempe) edidit, notisque illustravit Goettingae 1739. 8uo et seqq. aliquot voluminibus publicavit.

14. *Aphorismi de cognoscendis et curandis morbis,* Lugduni Batavor. 1709. primum in lucem emissi post aliquoties recusati sunt. Septem eorum nunc extant editiones, e quibus prae-

PRAEFATIO.

praestantiores indicauimus, et non minus praestantem cum variis praemissis nunc renouamus et exhibemus.

Elegantissimus in hos Aphorismos Commentarius est ipsius B. Illustris Auctoris.

15. *Praxis medica*, quae primum Batau. IV. Vol. 1728. 12mo postea vero 1732. et 1738. V. Volum. 12mo Londini prodiit.

Sed huic adhuc anteferenda sunt praestantissima et doctissima in hos aphorismos *commentaria* quae Medicorum Princeps Perillustris Gerard van SWIETEN congeffit elaborauit et communicauit cum publico. Horum Commentariorum Tomus I. 1742. Londini typis expressus est, sed nunc denuo vna cum Tomo II. et III. Lugduni Batauorum 4to maj. 1752 - 1755. excusus est. Et licet ii vna cum praefatione B. illustris HAMBERGERI Hildburghusae statim fuerint repetiti, haec editio tamen multas ob rationes Lugdunensi cedere debet, quae Hildburghusanae omnino palmam praeripit.

PRAEFATIO.

16. *Libellus de materia medica et remedium formularum, quae Aphorismis inserviunt*, primum Lugd. Batau. 1706. et ultimum ibidem 1740. prodiit. Subiunctus quoque a Celeberrimo *Schulzio* Aphorismis Boerhaavianis de cognoscendis et curandis morbis hic libellus, quem sub calcem editionis nostrae adiungere haud intermissimus.
17. *Index plantarum in horto Lugd. Batauor. repert.* Lugd. Batauor. 1716. 8uo.
18. *Index alter plantarum, quae in horto Lugdunenſi aluntur*, 2 Vol. Lugd. Batau. 1720. et 1727. 4to.
19. *Historia plantarum cum suis characteribus et virtutibus*, 1727. 8uo.
20. *Epistola ad Ruyschium de Fabrica Glandularum in corpore humano*, Amstelod. 1722. 4to.
21. *Atrocis nec descripti prius morbi historia*, Lugd. 1724. in opusc. p. 98.
22. *Atrocis rarissimique morbi historia altera*, Leid. 1728. in opusc. p. III.
23. *Tra-*

RRAEFATIO.

23. *Tractatus medicus de lue Aphrodisiaca* praefixus aphrodisiaco, 1728. Leid. fol. in opusc. p. 119.
24. *Tractatus tres de Mercurio* in Frans. Phil. N. 430. p. 433. et 444. 2. in Ac. Sc. 1734. et duo priores in opusc. p. 129.
25. - - *de purganda medicina a curarum sordibus.* Parisiis 1714. 12mo.
26. *Elementa Chemiae*, 2 Vol. Leid. 1732. 4to variis locis et annis diuersaque forma denuo sunt recusa.
27. *Institutiones et experimenta Chemiae* 2 Vol. Paris. 1724. 8uo et anglice 1725. 4to.
28. *De Mercurio experimenta*, Ultraiekti 1735. 8uo et Norimbergae 1736. 4to.
29. *De viribus Medicamentorum*, Anglice 1719. 8uo, Latine 1723. 1724. 1726. et 1734. Paris. 12mo 1752. Ienae et Lipsiae 8uo.
30. *Affectum libris et praxi rarissimum*, Lugd. Batau. 1738. 4to.

PRAEFATIO.

31. *Methodus studendi medicinam*, Anglice 1719. 8uo Latine 1728. 1734. 12mo.

32. *Opuscula omnia in unum collecta*, Hagae 1738. 4to.


Opera medica, Venetiis 1724. 4to.

Opera omnia, Venetiis 1735. 4to.

Haec sunt scripta *Boerhaaviana*, quae eius *aphorismis* a nobis denuo editis addere adiungereque placuit. Et si Tibi **BENEVOLE LECTOR** huic nostrae *Aphorismorum Boerhaavianorum* editioni album adieceris calculum, si scriptorum *Boerhaavianorum* indicem et alia a nobis adlata probaueris, laborum nostrorum pretium sat magnum nos consecutos arbitramur. Vale B. L. et aureis *Boerhaavii* monumentis feliciter cum maxima fruiere utilitate. Dabamus in Athenaeo iuxta Salam die 15. Mens. Iun. A. S. R. cldccclvii.



PRAE-



PRAEFATIO EDITORIS.


Nihil est quod in hoc limine aut de celeberrimo horum opusculorum auctore, nuper caelitis adscripto, aut de ipsorum librorum praestantia, differam. Usque adeo omnibus, et per omnes terrarum angulos, nota paucis attingere, idem ac praeuaticari videtur. Requirebam nuper exempla pro auditoribus, qui sibi hunc potissimum praeficae doctrinae ducem elegerant, quem ipsis explicarem; neque tamen genuinae editionis tot reperiēbam, quot sufficerent. Hinc consilium unum supererat, ut renouandum opus susciperem, postquam non amplius verendum videbatur, ne plenior aliqua editio inutilem reddat praegressas. Sequutus sum in aphorismis illam editionem Lugduni Batauorum **CLBCCXXXVII.** excusam, quam **b. Auctor**

PRAEFATIO.

*genuinam habendam declaruit. Libellum de materia medica damus, qualem Isaacus Seuerinus 1727. Lugduni procudit: quem itidem solum genuinum haberi b. Auctor voluit. Pauca omnino exempla fieri volumus: nulla enim spe auara ad edendum accessimus. Studiosorum commodo id dedimus, ut cuius capiti aphorismorum absoluto mox subiungere-mus, quae ad illud pertinent ex libello de materia medica. Nec operae pepercimus, ut euitarentur typhotetarum vitia: et quae manifesta in priori editione erant, corrigerentur. Si forte una vel altera littera cum alia permutata superest: id speramus neminem posse morari aut sensum obscurare. Quod superest, rogamus BENEVOLVM LECTOREM, velit nostrum inseruendi studium aequi bonique consulere. Halae Magdeburgicae pridie Kalendar. Aprilis
CLCXXIX.*



PRAE-



PRAEFATIO AD APHORISMOS

LECTORI AVCTOR.

En libellum, mole paruum, grauem materia, nec sine labore natum. Auctior ille quinto Leydae prodit, et locis quibusdam paulo explicatior. Regulas vero promittit, quae causas morborum expedire, atque euentus secundare, possint. Experimenta huic quidem necessaria operae Graecorum industria, diligentia Arabum, et paucorum inter recentes accuratio, suppeditauit. Anatome vero, et mechanico, nostris cultior, ratiocinio filum et fundamenta dedit. Vtraque fida! quidquid ignari clament, aut inuidiosi obstrepant. Oderunt quippe et calumniantur isti, quae nec attingere valent: non ergo, nisi sibi met, vocali ignorantia nobiscum.


b 4 cent.

PRAEFATIO.

cent. Vbi autem, dum affectibus indulgent, inania paradoxorum et damnosae nouitatis crimina obtentui sumunt, risum mehercle rerum gnaris excitant! Qui antiqua scrutati, noua non ignorant, videbunt quid praestitum sit. Et hos ego solos idoneos operis iudices agnosco. Sciant autem hi, quos equidem veneror, in priuatos haec exarata usus: assequantur ita et ordinis simul, et breuitatis, causas. Auctores non citavi, quum nimii, vel nulli, nominandi essent. Nec speciosos medicamentorum titulos morbis addidi. Cur? nihil arti exitiale magis noui; neque vero ipse ullum cognosco, quin solo tempestiuo usu tale fiat; hunc vero ubique indicare annisus sum non perfunctorie. Postremo omnia haec stilo scripta in arte recepto magis, quam ad puritatem Augustei seculi exposito; facilius enim ille capitur, huic forte interprete foret opus; saltem plus exegisset, quam quo fruor, otii. Vale!



PRAE-



PRAEFATIO

AD LIBELLVM DE MATERIA MEDICA ET FORMVLIS.

AVDITORIBVS SVIS

S.

H. BOERHAAVE.

Ego, postquam animum medicinae ex auctoritate procerum academicorum docendae applicui, id inprimis credidi mei esse muneris, candide vt vobis exponerem simpliciterque illa, quae, veris experimentorum successuumque euentis, firma in arte cognoscuntur.

Sane, eo quidem proposito, perscrutabar relictā nobis hodie ex iis, quae sapienti industria explorata sibi satisque spectata tradidere veteres. Illa vero, vbi composui rebus, quas medicinam faciendo deprehendebam, inueni obseruatae sollicitae naturae vestigia vbique pressa: neque adeo certius quid sperari posse, neque aliunde colligi meliora.

PRAEFATIO.

Ferebat interim animus et illa vtcunque perlustrare, quae dominante per Europam barbarie, Arabes priscorum nacti monumenta, eorum inuentis addiderunt, quaeque in Latinum versa sermonem nostrae intelligentiae patebant. Sed dolui, gentem solertissimam, licet subnixa esset tam vtilibus adminiculis eius subtilitas, parum boni, mali plurimum, medicae attulisse disciplinae!

Neque perfunctorie deinde excussi recentiorum placita, pulcherrima profecto commendata specie, siue physices excultae fructus, siue spectaueris artium liberalium medicinae promouendae adhibitarum effectus. Gaudebat vtique his intentus animus! interea tamen, licentia fingendi, assumendi audacia, festina nimis, et ambitiosa ad consummandam medicinam properatione, primorum vero auctorum contemptu, neglectu, vel ignoratione, ipsa quidem scientia medica damni plus, quam emolumenti, omni hoc molimine accepisse videbatur: materiem certe, vnde instrui feliciter queat illa, liberalissime aggestam a nostris vt gratamur arti, ita deploramus eius fata, quod tumultuaria opum collectione obruta verius, quam adiuta, siet.

Instituto itaque hoc rerum examine, quid, quaeso, rationi consentaneum magis, quam

PRAEFATIO.

quam vt conijcerentur in aduersaria, quaecunque in omnibus hisce adeo sana, vt peritus nemo de fide horum ambigat? hac itaque perfuncto opera prius dein conandum fuit, vt ex sparsis his conficeretur corpusculum quoddam ad leges disciplinae concinnatum: in quod et ipse intueri possem sedulo, quoties in artis exercitatione versarer, simulque eo referre, si quid noui forte aut insoliti appareret; postremo vt hac agendi ratione veri quid et digesti animo impressum meo vestros in vsus fideliter effundere liceret.

His demum causis natum vidistis *libellum*, quo ausus fui scripta aggrauare medica, *de cognoscendis et curandis morbis*. Cuius profecto toties me puduit, quoties defectus eius mihi nimis notos ipsi putare aggredior, veterumue componere operibus. Hoc scilicet me metiens pede impar deprehendor, qui legitime auctoris boni titulum ambire sustineam. Neque tamen abesse poteram ab audacia euulgandi hosce *aphorismos*, nisi deesse voluissem muneri, quod mihi dederat publica auctoritas, cui obsequia debeo.

Opus igitur aggressus quum cogitarem semper; sola vt esset cura mederi, atque cauere quam religiosissime, ne quid irreperet, quod periculoso semper hac in arte errori

PRAEFATIO.

errori causam praeberet, necessarium duxi in toto opusculo nullum commemorare medicamentum.

Nec iniuria: namque id imprimis arbitrabar nocere, dum, audito remedii nomine et morbi, exercendae se pares arti iactant empirici, impune in hominum perniciem grassantes, donec fero solo tandem cadauerum experimento sapiunt.

Quum interim discipulis deberem exempla, praescripseram ideo in priuatos horum vsus pauca *de materia medica*, huiusque ordinandae legibus, tantam, vt feruerent iis, qui intento me animo audiuerant differentem in scholis domesticis de occasione, qua sola vtilia euaderent.

Estis vero idonei vos testes, quanta circumspeditione vtar, quam saepe toediosa fere ad fastidium vsque minutiarum consideratione odiosus sim, priusquam vobis titulo *medicamenti* vel minimum quid laudare auisim: pulchre gnarus, nihil dari, quod ubique bonum; contra vero id, quod hac rerum facie salutare fuerat, mutata conditione perniciosum saepe apprehendi.

Nefas itaque putavi *medicaminum* nomine haec ipsa euulgare, sed cum admonitione seuera modo describenda dare his, qui ope-

PRAEFATIO.

operam mihi sedulo dederant pro tenuitate mea idoneas cautelas inculcare conanti. Sed, quod doleo, longe aliter euenit: me quippe nec consulto, nec volente, in vſus publicos extundenda curauit haec Londini vir eruditus, alte nimis de vili hoc opusculo, eiusque auctore, ſentiens et ſcribens; neque tamen ita res geſta, quin errores ſimul bene multi, et noxii, in edendo contigerint.

Coactus ita recensui, correxi, amplificaui, nonnulla: vnde deſcribendi labore leuati iis vtamini. Audaſter interim et moneo fideliter, morbi hiftoriam fideliter edocti, ſcrutati *materiae medicae* noxios aequae ac effectus ſalubres, ita demum auxilii vtilis bonitatem affectetis aſſequi: caeteris nocebit magis quam proderit, quidquid hoc opellae eſt. Cui, vt emaculatus prodiret, curam impendit, veſtrosque in vſus indicem adſcripſit. eruditiffimus vir, SAMVEE DVRY, medicinae doctör atque excultor, laudatiſſimus. Valete! ſcripti Lugd. Bat. 17^{II} 19.



INDEX



INDEX CAPITVM.

* Asteriscus denotat materiam medicam.

PROLEGOMENA pag. 1.

| | | |
|--|--------|-----------------|
| M orbi fibrae solidae simplicis. | pag. 5 | |
| - - - debilis et laxae. | 6 | * 8 |
| - - - rigidae, et elasticae. | 13 | * 15 |
| - Vasorum minimorum, et maiorum. | 19 | |
| - Viscerum debiliū et laxorum. | 21 | |
| - - fortium et rigidorum. | 23 | * 26 |
| De simplicissimis humorum vitiis et spontaneis. | 30 | |
| Morbi spontanei ex acido humore. | 31 | * 33 |
| - a glutinoso spontaneo. | 36 | * 39 |
| - ex alcalino spontaneo. | 50 | * 55 |
| De morbis oriundis ab excessu motus circulatorii solo. | 59 | * 62 |
| De morbis, ex defectu circulationis, et plethora. | 63 | * 64 |
| Morbi compositi simplicissimi, obstructio et vulnus. Obstructio. | 65 | * 73 |
| De vulnere in genere. | 74 | * 94 |
| Haemorrhagia. | 105 | * 106 |
| Dolor. | 106 | * 108 |
| Convulsio, etc. | 108 | * 110 |
| Vulnera capitis. | 111 | * 123 |
| - - thoracis. | 125 | * 128 |
| - - abdominis. | 128 | * 131 |
| Contusa. | 132 | * 135 |
| Ossa fracta. | 138 | |
| Ossa luxata. | 143 | |
| Inflammatiō. | 144 | * 153 |
| Abcessus. | 156 | * 159 |
| | | <i>Fistulae</i> |

INDEX


| | | |
|---|----------|--------------|
| <i>Fistulae.</i> | pag. 161 | * 162 |
| <i>Gangraena.</i> | 164 | * 172 |
| <i>Sphacelus.</i> | 178 | * 183 |
| <i>De combustione.</i> | 184 | * 185 |
| <i>Scirrhus.</i> | 186 | * 188 |
| <i>Cancer.</i> | 193 | * 196 |
| <i>De morbis ossium.</i> | 193 | * 196 |
| <i>De morbis internis, et de febribus in genere</i> | 207 | * 223 |
| <i>Frigus febrile.</i> | 228 | * 229 |
| <i>Tremor febrilis.</i> | 230 | |
| <i>Anxietas febrilis.</i> | 231 | * 234 |
| <i>Sitis febrilis.</i> | 237 | * 238 |
| <i>Nausea febrilis.</i> | 239 | * 241 |
| <i>Ructus et flatus.</i> | 243 | |
| <i>Vomitus febrilis.</i> | 245 | |
| <i>Debilitas febrilis.</i> | 247 | * 249 |
| <i>Calor febrilis</i> | 249 | |
| <i>Delirium febrile.</i> | 254 | |
| <i>Coma febrile.</i> | 255 | |
| <i>Peruigilium febrile.</i> | 256 | |
| <i>Convulsio febrilis.</i> | 257 | |
| <i>Sudor febrilis.</i> | 258 | |
| <i>Diarrhoea febrilis.</i> | 259 | |
| <i>Exanthemata febrilia.</i> | 260 | |
| <i>Febris continua.</i> | 262 | |
| <i>Febris continua putrida.</i> | ibid. | |
| <i>Febris ardens.</i> | 264 | |
| <i>Febris intermittens.</i> | 268 | * 275 |
| <i>Morbi acuti febriles.</i> | 278 | |
| <i>Phrenitis.</i> | 279 | |
| <i>Angina.</i> | 283 | |
| - aquosa. | 286 | * 287 |
| - scirrhusa. | 288 | * 288 |
| - inflammatoria. | ibid. | * 290 |
| - suppuratoria. | 292 | |
| - gangraenosa. | ibid. | |
| <i>Angina convulsiva.</i> | 293 | |
| <i>Peripneumonia vera.</i> | 294 | * 309 |
| | | <u>Péri-</u> |

CAPITVM.

| | | |
|---|----------|-------|
| <i>Peripneumonia notha.</i> | pag. 315 | * 317 |
| <i>Pleuritis.</i> | 318 | * 331 |
| <i>Paraphrenitis.</i> | 333 | |
| <i>Hepatitis, et icterus multiplex.</i> | 334 | * 346 |
| <i>Ventriculi inflammatio.</i> | 349 | * 351 |
| <i>Intestinarum inflammatio.</i> | 351 | * 359 |
| <i>Aphthae.</i> | 360 | * 366 |
| <i>Nephritis.</i> | 368 | * 372 |
| <i>Apoplexia.</i> | 373 | * 385 |
| <i>Catalepsis.</i> | 387 | |
| <i>Carus.</i> | 388 | |
| <i>De morbis chronicis.</i> | 389 | |
| <i>Paralysis.</i> | 392 | * 398 |
| <i>Epilepsia.</i> | 399 | |
| <i>Melancholia.</i> | 405 | |
| <i>Mania</i> | 418 | * 420 |
| <i>Rabies canina.</i> | 421 | * 432 |
| <i>Scorbutus.</i> | 432 | * 439 |
| <i>Cachexia.</i> | 446 | |
| <i>Empyema.</i> | 450 | |
| <i>Phthisis pulmonalis.</i> | 454 | * 462 |
| <i>Hydrops.</i> | 467 | * 478 |
| <i>Podagra.</i> | 484 | |
| <i>Morbi virginum.</i> | 492 | * 494 |
| <i>- grauidarum.</i> | 497 | * 499 |
| <i>Partus difficilis.</i> | 501 | * 503 |
| <i>Morbi puerperii.</i> | 503 | * 506 |
| <i>- infantum.</i> | 508 | * 513 |
| <i>Variolae.</i> | 521 | * 531 |
| <i>Morbi epidemici.</i> | 533 | |
| <i>Calculus.</i> | 535 | * 539 |
| <i>Lues venerea.</i> | 541 | * 546 |
| <i>Rachitis.</i> | 551 | * 554 |
| <i>Rheumatismus.</i> | 558 | |



HER.



HERMANNI BOERHAAVE
A P H O R I S M I
DE
COGNOSCENDIS
ET
CURANDIS MORBIS.

PROLEGOMENA.

1.

Omnis humani corporis conditio, quæ actiones vitales, naturales, vel & animales, lædit, morbus vocatur.

2. Quæ vero disciplinæ medicæ pars docet morbum in ipso ægroto præsentem detegere, & curare, praxis appellatur medica. Sanitatem ægris medicina promittit. Cels. 1.

A

3. Qui

3. Qui ergo actionum vitalium, naturalium, atque animalium exercendarum requisita ignorat, adeoque vitæ causas nescit, & sanitatis, ille defectum illarum, id est morbos, cognoscere non poterit.

4. Sanatio porro est morbi (1.) in sanitatem (2.) mutatio: ponit ergo & hæc eadem cognita (3.): quare cognitio & curatio morborum scientiam dogmatum, quæ explicant quæ vita, sanitasque sit hominis, id est instituta physiologica medica, requirunt.

5. Illa mutatio (4.) motum excitat, sopit, vel dirigit, per applicationem instrumentorum, quæ artifex nosse debet, & regere: hinc ponitur perspecta victus, medicamentorum, & chirurgiæ, materia, præparatio, usus.

6. Dirigitur illa applicatio (5.) a mente præscia futuri effectus: quo exigitur scientia generalis legum, iuxta quas actiones illæ exercentur; unde itaque doctrina signorum, & methodi medendi, necessaria est. Adeoque tradituro praxin (2.) omnes partes institutionum medicarum scitu necessariæ prius sunt. Eas ideo ponemus notas, & demonstratas alibi.

7. Mor-

7. Morbus (1.), quum corpori inhæreat, erit effectus corporeus singularis determinatæ causæ.

8. Cuius accurata ablatio sanat.

9. Aufertur correcto malo singulari, vel per remedium in illud solummodo agens; vel auxilio in omnia simul æqua vi agente. Hanc vniuersalem, illam propriam, medelam vocabimus.

10. Vtraque (9.) reperitur obseruatione, similitudine, vel ratiocinio ex hisce binis.

11. Obseruatio habetur: 1. ex accurata historia morbi, enarrante causas, naturam, effectusque mali. 2. Ex enumeratione exquisita eorum, quæ profunt vel nocent, dum casu, vel arte, morbo subministrata sunt. 3. Ex introspectis cadaueribus incisis eorum, quorum morbi obseruati fuerant prius.

12. Ex similitudine concludit, qui obseruatis iam (11.), adeoque cognitis, casum præsentem, hæctenus ignotum, comparans de indole & curatione mali incogniti argumentatur, a præteritis ad futura arguens.

13. Qui denique omnia, quæ ægro accidunt,

cidunt, obseruando cognita (11.), ad amussim ponderat seorsum singula, comparat deinde inter se vniuersa, confert iis, quæ in sanitate contingunt, hincque tandem feueritate ratiocinii subacti assurgit in intellectum causæ proximæ, & auxiliorum ei tollendæ aptorum, verum medici nomen meretur.

14. Ordo itaque optimus describendæ historiæ & curationi morborum erit, qui

1. Vniuscuiusque mali phænomena indiuidua, propria, communia, considerate cognita, iusto ordine, vera fide, proponit.
2. Cuncta, quæ acciderunt ægro ab iis, quæ gessit, ingessit, retinuit, excreuit, vel sibi applicuit, dum morbus adfuit, enarrat.
3. Auxilia victus, manus, medicamentorum, vna cum vera methodo applicandi, prout casus, vel ars, obtulit, exponit.
4. Ea, quæ ex hisce tribus, vt ex datis, iuxta (13.) dictam legem effectui rationis verissime deduci queunt ita, vt pro regulis praxeos accipi tuto possint, concludendo elicit.

15. Mul-

15. Multitudo quidem morborum his ordinandis officit.

16. Sed ordinem dicat: 1. clarior morbi notitia. 2. simplicior eius natura. 3. facillima sanatio. 4. eius requisita ad alium intelligendum cognitio.

17. Ex quo fundamento (16.) omnes sequenti serie tractabimus.

18. *Morborum itaque simplicissimorum species, & curatio* præmittenda reliquis.

19. *Solidarum ergo partium morbi explicandi & sanandi* primum locum postulant.

20. *Fibræ simplicissimæ solidæ morbi explicati, sanati*, inter hos (19.) denique primi sunt.

MORBI FIBRAE SOLIDAE SIMPLICIS.

21. **I**llæ partēs, quæ ex fluido vasis contento secretæ, sibi mutuo vi vitæ, & ope glutinis tenuissimi, aquosi, pinguisque, applicatæ, fibram minimam faciunt, sunt minimæ, simplicissimæ, terrestres, vixque matabiles per eas causas, quæ in nobis viventibus deprehenduntur.

22. Quare in his (21.), separatim spectatis, nullus occurrit morbus, qui medicis observatus, sanatusque describitur.

A 3

23. Sed

23. Sed in fibra minima, ex adunatis his (21.) concreta, morbi simplicissimi sequentes, (24. ad 38.) considerari merentur: sunt enim frequentes, & fundamenta iaciunt intellectui aliorum, licet præteruisi, vel non bene cogniti.

MORBI FIBRÆ DEBILIS ET LAXÆ.

24. **F**ibræ (23.) *debilitas* vocatur adunatio partium minimarum (21.) cum nisu in cohæſionem tam paruo, vt vel illo leui motu solui queat, qui sanitatis effectû fit, vel non multum maiori.

25. Hanc (24.) antecedunt: 1. impedita ingestorum assimilatio in naturam liquidi vitalis fani; quæ debetur iacturæ nimix humoris boni, & inertix virium solidorum in liquida; vel alimentis magis tenacibus sua indole, quam virium permutantium in corpore virtus est. 2. debilis nimium applicatio partis vnus (21.) ad aliam, quæ oritur a nimis debili motu liquorum, isque vt plurimum a defectu motus musculorum. 3. nimia distractio fibræ rupturæ proxima.

26. Producit autem facilem vasculorum

rum ex his (24.) conflatorum extensionem, rupturam, in sua liquida contenta inertiam; unde tumores ab distendenti-
bus, putrefactiones ab stagnantibus vel extravasatis liquidis, tum ea, quæ ex binis hisce sequuntur, infinita.

27. Ex hisce (24. 25. 26.) præsens, futura, præteritaue noscitur: effectus prævide-
tur; & curationis requisita perspiciuntur.

28. Hæc enim obtinebitur: 1. nutri-
mento, in quo materies (21.) abundet,
quodque iam fere ita præparatum sit, ac in
corpore sano & forti fit. Lac, oua, iura
carnium, decocta panis bene fermentati,
vina austera, primaria sunt. Quæ parua
copiam sæpe repetita sumenda. 2. aucto
motu solidi & fluidi per frictiones; vectio-
nes in equo, rheda, naui; ambulationes,
cursus, exercitia corporis. 3. leni com-
pressione vasorum liquidorumque repul-
su. 4. medicamentis acido austeris, aut &
spirituosis fermentatis, prudenter, leni-
terque vsurpatis. 5. omni modo, quo ni-
mia distractio tollitur.

29. *Laxitas fibræ* vocatur ea cohæsi-
o partium (21.) inter se, quæ parua vi potest
mutari ita, ut fiat se ipsa longior; unde pa-

ret, hanc esse debilitatis (24.) speciem, & *flexilitatem* inde pendere; adeoque hæc omnia clare ex dictis (21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.) intelligi, vt & *imminutam elasticitatem*. Namque vitrum, corpus fragilissimum, arte ductum in filamenta subtiliora aranæ filo, cohæret, estque flexile quaquorsum minima vi in omnes spiras, absque ruptura. Crescit pro subtilitate flexilitas. Ac. reg. sc. 1713. hist. II,

30. Quin ex iisdem etiam respondetur ad hæc quæsitæ: Cur aquosa, & pinguia alimenta dant fibras debiles? cur frigidis, iunioribus, quiescentibus, crescentibusque debiles? Cur terrestria, austeraque dant fibras fortes? Cur calidis, exercitatisque fortes? Cur elasticitas robur comitatur?



IN CVRATIONE MORBORVM FIBRAE DEBILIS ET LAXAE.

SECT. 28. N. I.

Materiem, in qua elementa apta constituenda fibræ forti, continent.

Lac fœminæ sanæ ætate integra, motu salubri exercitata, victu laudabili vtentis, si suctu hauritur, aut calidum bibitur ilico, non mutatum igne. Hoc reliqua superat, si, post coctionem in nutrice peractam, potatur. Proximum est asininum, deinde caprinum ac bubulum. *Vsus* definitur iisdem legibus. Oui



Oui recentis albumen adhuc tepens, dilutum in lactis & aquæ æqua portione, sine vlllo igne adhibito. Iura car-nium optima huic proposito, quæ parantur ex carne a pinguedine accurate repurgata, animalis sani, iunioris, exercitati, contusa, minutim scissa, in machina Papiniana elixa, frigesacta dein in hac ipsa machina, iterum ab omni supernatante pingui & sæcibus depurata.

Si olla hæc deficit, ahenum substitui quidem potest, sed subtilius exhalando perit: vnde patet causa ferociæ ani-malium, quæ ex raptu aliorum, quæ viua deuorant, alun-tur.

Ex gallinaceo genere paratum præfertur cæteris, vitu-linum dein, postea ouillum, bubulum denique, proban-tur: quæ ex permistis fiunt, meraciora habentur reliquis.

Decoctum Panis.

Rec. Panis triticeus cum fursuribus rite fermentati, bis cocti.
vnc. viij.

Aq. putealis purissim. lib. iij.

Coque, in vase figulino clauso, per spatium i. horæ, ad-dendo semper, quantum coctione exhalat aquæ, dein cola per seraceum.

Gelatina Panis fit,

Si decoctum præcedens exhalat ad ignem, donec eius pauxillum in lapide frigido fusum coeat.

Cremor Panis erit,

Si frigesactum decoctum spissitudinem cremoris in-duit.

Si huius gelatinæ pauxillum lacti, iusculo, vino, cereui-siæ, aut aquæ, miscetur, fiunt varia leuis nutrimenti ge-nera.

Si sumitur Decocti descripti lib. j.

Succi Citrei vnc. ss.

Aq. still. Cinnam. drach. ij.

Vini Rhenani vnc. iv.

Sacchari q. s. ad gratum saporem, habetur



decoctum panis gratissimum, saluberrimum. *Cujus dosis vnc. j. omni hora calide sumenda.*

Rursum, si eidem vitelli ouorum misceantur, fit aliud, sed viribus idem, edulii genus. *Cuius parcior, ceterum idem, usus.*

Vina Florentina austera, item Gallica rubra acerba, ut & Græca nigrescentia adstringendi sapore prædita, commendantur: quia & vberima spirituum copia, & roborante fibras virtute, præstant.

SECT. 28. N. 4.

Acido austera vegetabilia.

Acaciæ fructus, succus, flos, cortex. *dos. succi inspissati a gran. iv. ad drach. j.*

Acaciæ Germanicæ, seu pruni sylvestris, succus inspissatus. *gran. vi. ad drach. iis.*

Acetosæ species, succus.

Alchimilla.

Anserina.

Belliricæ *drach. i. ad iv.*

Berberis fructus, succus.

Bistortæ radix.

Capparis fructus, cortex, radix.

Corni fructus immaturi, folia.

Cypressi fructus, folia.

Cynosbati flores, fructus, spongia.

Cydonia mala, & pyra, & horum minuz.

Filicis radix.

Fragaria.

Fraxini cortex.

Granatorum flos, poma, cortex.

Hypericum totum.

Hypocistidis succus inspissatus. *drach. j. ad v.*

Lapathi folia, flos, semen, radix.

Mespilorum fructus immaturi.

Myrobalani omnes. *gran. v. ad drach. ij.*

Myr-



Myrti folia.
Nymphææ mai. folia, flores.
Omphacium.
Pimpinella.
Portulaca.
Pruna syluestria.
Pyra austera.
Quercus folia, glandes.
Quinquefolium.
Rhabarbarum drach. fs. ad drach. ij.
Rhus obsoniorum folia, grana.
Rosarum flores.
Sanguisorba.
Sedum maius.
Sorbi fructus.
Tamarindorum fructus, vnc. j. ad vnc. ij. pulpa rite pressa,
& purgata vnc. fs. ad vnc. ij.
Tamarisci cortex.
Terra falso dicta Catechu,
Tormentillæ radix.
Ex quibus infusa, decocta, extracta, pilulæ, vina medi-
cata, formæ variæ, facile parantur. v. gr.

Infusum.

Rec. *Anserinæ* m. j.
Pimpinellæ m. fs.
Tormentillæ rad. vnc. fs.
Conscissa infundantur cum lib. jfs. aquæ feruidæ, spa-
tio i. horæ
Dosis vnc. j. omni triborio interdū.

Decoctum.

Rec. *Fol. Oxylapath.* m. j.
Flor. Rosar. rubr. vnc. iv.
Cort. Tamarisci vnc. ij.
Rad. Acetosæ vnc. iv.
Sem. contusorum Lapathi drach. ij.

Coque



Coque cum aqua ferrata spatio $\frac{1}{4}$ horæ. lib. ij. exhibe.
Capiat vnc. j. ter, quater, in die.

Vel.

Rec. *Acetosa* m. ij.

Rad. Bistortæ vnc. ss.

Flor. Granator. drach. ij.

Cum aq. decoct. spatio $\frac{1}{4}$ horæ, lib. j. admisce *Syrup. Myrtini* vnc. j.

Vfus idem.

Conditum.

Rec. *Mina Cydoneorum* vnc. j.

Conseru. Rosar. rubr. vnc. ss.

Flor. Granat. drach. j.

Syrup. Myrtini q. s. F. Conditum.

Dof. drach. j. ter, vel quater, de die.

Extractum.

Rec. *Acetosa* m. viij.

Lapathi hortensis m. iv.

Quinquefolii m. vij.

Minutim scissa, bene pura, in aqua q. s. cocta, fortiter pressa per prælum, in vase amplo exhalent in spissitatem Extracti. a gran. x. ad drach. ij. vel adde huic extracto.

Radic. Bistortæ sicca q. s. ad massam idoneam formandis pilulis.

Dof. gran. iv. ad xv.

Vinum medicatum.

Rec. *Sem. contus. Acetosa major.* drach. vj.

Flor. Granator. drach. v.

Rad. Cappar. vnc. ij.

Cortic. Fraxini drach. x.

Fol. Pimpinellæ m. ij.

Conscissa & contusa infunde ad vini rubri *Grauisb* dicti vel *Pontacq.* lib. iij.

Capiat vnc. j. ter, quater, in die.

Rec.



Rec. *Cortic. Radic. Capparid.*

Tamarisc. ana vnc. j.

Flor. Hyperici cum stipit. vnc. ij.

F. S. A. Vinum medicatum cum vini austeri rubri lib. iij.

Acido - Austera Fossilia.

Acida in terrenis absorpta, quæ eo potentiora, quo ponderosius acidum, plus terræ absorbit.

Martis in vino Rhenano soluti *drach. j. ad drach. iv.*

- - aceto Vini soluti *gutt. x. ad xxx.*

- - oleo Vitrioli soluti *gr. i. ad vi.*

Rubrica fabrilis.

Vitriolum album, nativum. *gr. i. ad iv.*

- - Stanni. *gr. i. ad vi.*

Alumin. Romani. *gr. i. ad xxx.*

Ex his infinitæ fiunt Formulæ.

Pulvis.

Rec. *Alumin. gr. x.*

Rhei Barbar. gr. v.

Cort. Granat. gr. iij.

M. F. P. pro una dosi.

Pilulæ.

Rec. *Vitriol. Martis calcinati ad albed. drach. ss.*

Gallar. Quercin. gr. x.

Rad. Tormentillæ. drach. j.

Succi Hypocistidos q. s. ut fiant Pil. singulæ gr. ij.

Capiat æger unam ter, quater, de die.

MORBI FIBRAE RIGIDAE, ET ELASTICAE.

31. **R**igiditas fibræ nimia est illa adunatio partium minimarum (21.), quæ tam valide faciat eas cohærere, ut non cedant

dant illi actioni fluidorum, quæ superare debet hanc resistantiam, vt maneat sanitas.

32. Hæc (31.) sequitur eas causas, quas requirit sanatio fibræ debilis (28.), si diu, & nimis perseverant.

33. Nata (31.) vero facit vasa, quæ ex his fiunt, minus flexibilia, angustiora, breviora, liquidorum motui nimis resistantia, & quæ hinc sequuntur; vid. (50. 51. 52. 53.)

34. Ex quibus (31. 32. 33.) ipsis interno-scitur id malum (31.), simulque prævidentur inde secuturi effectus (33.), neque latet curatio.

35. Hæc enim efficitur 1. cibo & potu aquosis, lenibusque, fero lactis imprimis, oleribus mollissimis, farinosis dilutis, nec fermentatis. 2. quiete in aëre humido frigidiusculo, cum somno pleniore. 3. remediis aquosis externis, internisque, tepide applicatis vel assumtis, insulsis, levissimis & blandissimis oleosis, similiter adhibitis.

36. Hinc elasticitas nimia intelligitur, curaturque, quippe rigiditatis (31.) vt plurimum comes, & effectus.

37. Cur pueris, fœminis, otiosis laxitas?
con-

contra vero adultis, viris, exercitatis,
fibrarum, adeoque omnium solidarum
partium, rigiditas? & solutarum valida
contractio?

IN MORBIS FIBRAE RIGIDAE ET ELASTICAE.

SECT. 35. N. 1.

- α. Decocta Panis dilutiora. *vid. 28. N. 1.*
- β. Succī maturorum fructuum horarum crudi, vel cum
aqua diluente parum cocti & saccharo mitificati.
- Aurant. malorum succus.
- Baccarum sambuci succus.
- Ceraforum dulcium omnia genera.
- Citrea poma bene matura, dulcia.
- Cucumeres mites.
- Cucurbitæ mites.
- Ficus.
- Fraga.
- Granata poma matura.
- Iuiubæ.
- Limonia dulcia.
- Mala Armeniaca.
- Melones.
- Mora.
- Perfica mala.
- Poma acido-dulcia.
- Pruna dulcia.
- Ribesia rubra, alba, nigra.
- Rubi Idæi fructus.
- Ex quibus coctione, assatione, &c. multa *edulia* præparari
possunt. e. g.
- Rec. *Pomorum maturorum decorticat. vnc. x.*
Cum aqua decoct. spatio vnius horæ, conterere, & per seta-
cum cola, tunc huius *unc. xxiv.* adde

Nucis



Nucis myristica contrita drach. j.

Panis biscocti contriti vnc. j.

Vini Rhenani vnc. ij.

Sacchari q. s.

Olera mollissima, & farinosa mollia.

Olera, vel his familia.

Atriplex.

Battatas.

Beta.

Borrago.

Brassica rubra.

Bulbocastana.

Chærophyllum.

Cichorea omnia.

Cinara.

Cucumeres.

Dens leonis.

Endiuia.

Lactuca omnes fere.

Pastinacæ.

Portulacæ.

Rapa.

Sisari radix.

Scorzoneræ radix.

Spinachia.

Tragopogoni radix.

Valeriana pratensis.

Farinosa.

Amygdalæ dulces.

Avena.

Fagopyrum vel

Fruementum Saracenicum.

Hordeum.

Mays.

Milium.

Oryza.

Pa-



Panicum.
Pistachia.
Triticum.
Secale.
Spelta.

Ex his fiunt decocta, cremor, puls, vt de Pane, §.
28. N. 1.

Ex iisdem fiunt crudis emulsa.

Rec. *Auenæ excorticat.* vnc. iij.

Amygdal. dulc. vnc. j.

Cum aq. decoct. Hord. F. Emulsio, cuius vnc. xxiv.
admisce

Syrup. Violar. unc. fs.

Aq. stillat. Cinnamom. drach. iv.

Capiat vnc. j. omni hora diei.

Decoctum.

Rec. *Fol. recent. borragin.*

Lactucæ.

Valerianellæ aruensis ana m. jfs.

Rad. recent. contusar. scorzonera vnc. iv.

Semin. contus. Hordei vnc. ij.

Cum aq. decoct. spatio $\frac{1}{4}$ horæ, lib. iv. admisce

Syrup. althææ

Violar. ana vnc. j.

Bibat vnc. ij. omni hora.

SECT. 35. N. 3.

*Aquosa, subfarinosa, suboleosa, mollia,
emollientia.*

α. Aq. decoct. cum farinosis N. 1. huius §.

β. - - - - - emollientibus N. 1. huius §.

Abutilon.

Alceæ rad. fol. flor. sem.

Alfine.

Althææ flor. fol. rad.

B

Bellis



- Bellis.
 Bonus Henricus.
 Branca vrsina.
 Consolida maior.
 - - - minor.
 - - - media.
 Cynoglossa.
 Hyoscyami *fol.*
 Liliorum albor. *bulbi.*
 Linaria.
 Linum.
 Lotus hæmorrhoidalis, & Lotus odora.
 Maluæ, Bismaluæ, *fol. flor. rad.*
 Meliloti *flor. fol.*
 Mercurialis.
 Parietaria.
 Populi *folia, gemmæ.*
 Prunella.
 Pulmonaria.
 Sambuci *fol. flor.*
 Scabiosa.
 Sigillum Salomonis.
 Solanum.
 Telephium.
 Trifolium bituminosum.
 Verbascum.
 Violaria.
 Vulneraria rustica.
 γ. Butyrum recens. Cremor lactis.
 Pinguedo volucrum, *Anat. Anser. Capon.*
 Medulla bouis.
 Olea lenia ex farinosis blandis.
 Ol. amygdal. amarar.
 - - - dule.
 lini.
 mucaginum.
 oliuarum.

Palmæ



Palmae.
Papaveris albi.
Solani.
Trifolii odorati.
Violarum.

Syrupi Similes.

Syrupus Althææ Fernelii.
Borraginis.
Capillorum Veneris.
Iulubinus.
Papaveris albi
- - - erratici.
Symplyti Fernelii.
Violaceus simplex.

Mel Mercurialis.

Unguenta talia.

Unguentum Althææ compositum.

Aureum.
Basilicon.
Populeum.

Ex his balnea, vapores, fatus, litus, decocta, potus, clysinata, &c. fiunt. Cynoglossa vero & hyoscyamus tantum externo profunt usu.

MORBI VASORVM MINIMORVM ET MAIORVM.

38. **V**asorum minimorum, ex fibris simplicibus (21. 23.), applicatu, intertextu, vel intortu, adunatis, factorum morbi ex iisdem causis eandem indolem, effectum, & curationem habent;

B 2

bent; ergo ex dictis (ab 21. ad 38.) intelliguntur.

39. Vasa maiora, ex minimis (38.), applicatu, intertextu, vel intortu, vni-
tis, conflata habent duo diuersa morbo-
rum genera. Horum prius pendet ex
morbis minimi canalis (38.), maiorem
hunc componentis, adeoque origo, na-
tura, efficacia, curatio eius inde (38.)
peti debet. Posterius vero pendet 1. a vi,
qua fluidum, per maiorem hunc canalem
fluens, eius latera extendendo premit:
quæ latera, ex aliis minoribus canalibus
constantia, hac pressione orbantur suo
liquido, vniuntur quoad latera, concre-
scunt in fibræ (21. 23.) solidæ, sed crassio-
ris, speciem: potestque idem & vicinis
communicari vasculis. 2. a liquido cum
vasculo proprio concrecente.

40. Inde vasorum debilitas, laxitas,
robur: rigiditas, elasticitas, de quibus
multa imperitis memorantur, clare in-
telligi possunt. Et meretur dignitas ho-
rum pertractationem.

MOR-

MORBI VISCERVM DEBIL-
VM ET LAXORVM.

41. **V**asorum, & viscerum debilitas vocatur illa partium (23. 38. 39.), hæc constituentium, cohæsiō, quæ tam leui motu tolli potest, vt imparia sint iis efficiundis, quæ sanitatis & vitæ ratio ab his postulat.

42. Quæ alia ætate, atque sexu, alia sunt.

43. Hæc debilitas oritur. 1. ab debilitate fibræ (24.), eiusque causis. (25.) 2. a debilitate canalium minimorum (28.), atque causis huius (38.) 3. ab inertia liquidi per vasa maiora (39.) fluentis, quæ pendet a minuta copia, fluiditate aquosa aucta, motu musculari torpesciente. 4. A numero magno canalium minimorum, pro ratione ætatis, nimis diu remanentium.

44. Ab hac debilitate (41.), per suas causas (43.) producta, oriuntur multi morbi, qui falso temperiei, vel congeniti, habentur; primarii sunt: facilis vasorum dilatatio, tumor; facilis horum compressio, inanitas; liquidi stagnatio;

B 3

cor-

cordi aucta resistantia; liquidorum cruditas; spontanea corruptio; ad actiones vitales, animales, naturales exercendas ineptitudo; & illa omnia, quæ ex his sequi solent, quæ vt infinita numero, ita difficillima curatu, & fecundissima nouis morbis producendis sunt; maxime καχεξία, & κακοχυμία. 2. Facilis vasorum dissolutio ab internis, externisue causis, acribus vel motis; effusio, stagnatio, corruptio, euacuatio liquidi ad vitam sanitatemque necessarii; interceptio motus fluidi per vasa rupta; corruptio eorum, quæ hoc motu vigeabant; qui rursus varii sunt, maxime φθίσις, ἐμπύημα, ὕδρωψ, ἀτρεφία.

45. Quæ (41. 42. 43. 44.) si quis accurate obseruat, ille, non huius modo (41.), sed infinitorum & obscurissimorum morborum originem, præsentiam, euentum internoscet, & solus auxilia impetrandæ sanationi valida & tuta inueniet.

46. In applicatione verò horum, præsens debilitas tarditatem iubet; nec enim alibi perniciosior mutatio subita.

47. Ergo remedia (28.) lente, caute, a primo in vltimum gradum, adhibenda sunt.

sunt. Quorum vsu roboratis vasis, motus validus musculorum adhibeatur, donec omni effectu constet, satis compacta, solidata, & callosa euasisse vasa & viscera.

48. Hinc patet, omnia, quæ de facultate nutrimentorum traduntur, alias vera, alias falsa esse; exercitia musculorum roborare fibras; exercitia vectionis resolvere coacta, roborare laxa, nec dispergere vires; ipsum sanguinem & cruorem in robustissimis esse maxime densum, lentum, blandum; in tenerrimis dissolutum, leuem, acrem; infinitos morbos, facie diuersissimos, vna sæpe radice hærere posse, eaque succisa tolli.

49. Ex iisdem cognitio & curatio laxitatis vasorum & viscerum habetur.

MORBI VISCERVM FORTIVM ET RIGIDORVM.

50. **R**igiditas nimia vasorum & viscerum nominatur illa partium (23. 38. 39.) hæc componentium cohæsiō, quæ non cedat illi motui, qui illa mutare & mouere debebat, vt fierent ea, quæ sanitatis & vitæ tempore ab hac mutabilitate fluebant.

24 MORBI VISC. FORT. ET RIGID.

51. Oritur. 1. ab omni causa fibræ nimis rigidæ (32.) 2. maxime a fibris, valida vi propulsi liquidi vitalis admodum compactis ad se mutuo. 3. ab adunatione canalium minorum, orbatorum suo liquido per violentam pressionem, quâ vitale liquidum arteriosum canalium maiorum latera premit, cuius maxima effectrix causa est valde exercitatus muscularis motus. 4. ab concreto vase in vnum solidum cum proprio liquido stagnante, exsiccatō, coagulato.

52. Vbi obtinet in vasis, producit effectus: 1. similes, vel eosdem iis, qui a fibra nimis rigida (33.). 2. facit in vasis validum nixum, quo fibræ conantur se applicare ad axin sui canalis; arctare cavas suas; premere, comprimere, repellere, expellere sua liquida; hinc eorum motui a corde, adeoque & cordi resistere; vix dilatari, hinc interrompere æquabilem sanguinis motum, adeoque omnium secretionum; minuere copiam sanguinis aliter vno ictu ex corde expellendi; impedire cordis euacuationem perfectam; polypos sanguinis producere; fluidum comprimendo, & a fluidissimis
spo-

spoliando, id condensare, suffocationes, mortem creare. 3. vulneratis vasis magnos hiatus creat per vim magnam, qua trahuntur in sua sustentacula partes vasorum; discissis integre cavitates minuit extremas, vel claudit.

53. Ex his (31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 50. 51. 52.) accurate perspectis clara habetur doctrina, qua noscitur præterita, præsens, futura, agens, & actura vasorum rigiditas, elasticitas, vis, curatio.

54. Eam enim efficiunt 1. remedia curandæ rigiditati fibræ propria (35.). 2. illa maxime, quæ liquidi vitalis copiam, densitatem, pressionem minuunt. 3. quæ motum muscularem suspendunt. 4. ea, quæ humectant, leniunt, emolliunt, diluunt, resoluunt, abstergunt.

55. Ex hisce omnibus (ab 21. ad 55.) morbi partium solidarum proprii intelliguntur, curantur; & ex iisdem clarescit, quid respondendum his quæstionibus: quæ diuersitas structuræ partium solidarum in ætate diuersa? cur homo crescit, perstat, decrescit? cur in vtero materno omnium ocysissime augeatur? cur laxus, fortis, rigidus fit? cur humidus, ple-

26 MORBI VISC. FORT. ET RIGID.

nus, ficcus? cur morte naturali, vel facto senili, moritur? & quo tum morbo? quinam morbi plerumque singulæ ætati proprii? quis victus, quæ vita, quæ medicamenta, cuique tempori vitæ comoda? quænam fides, quæ utilitas, doctrinæ de stricto & laxo in solidis? unde desumenda nota certissima iustæ mensuræ laxi, & stricti, in homine? &c.

56. Vulnus hinc (16.) iam primo pertractandum, post morbos solidi simplicissimos. Sed, quum vitia liquorum spontanea semper trahat secum, de hisce ante vulnera agendum erit, quæ nosci debent ante historiam vulnerum absolendam.

57. Vnde agetur primo de his humorum morbis, qui in illis nascuntur sponte; dum vel sibi ipsis permittuntur, nulla habita ratione vasorum, vel vicio incitati, torpentisue nimium, vitalis motus.

CONTRA MORBOS VISCERVM FORTIVM ET RIGIDORVM.

SECT. 54. N. 2.

Copia minuitur misso sanguine.

Densitas minuitur 1. per aquam tepidam & serum lactis; 2. per minuentia copiam; 3. per minuentia pressionem.

Pressio



Pressio minuitur, 1. minuta copia, 2. minuta densitate. 3. minuto motu.

SECT. 54. N. 3.

Quies corporis & animi huc spectat.

SECT. 54. N. 4.

Humectantia sunt, quæ multa aqua cum saponaceo vel farinoso admixto constant: e. g.

α Aq. decoct. cum farinosis, 35. N. I.

β - - - - - emollientibus, 35. N. I.

γ - - - - - fructibus horæis, 35. N. I.

δ - - - - - oleribus, 35. N. I.

ε - - - - - carne recente insulsa, vel cum ossibus & cornubus.

ζ - - - - - cum piscibus fluuiatilibus, vel marinis cancris, ostreis, astacis, viperis, &c.

Ius carniū humectans, leniens, emolliens, resoluens.

Rec. *Carnis vitulinæ, bene contusæ*, lib. ij.

Hordei mundati vnc. ij.

Cum lib. viij. aquæ decoctis, spatio iij. horarum, vase rite clauso, sub finem adde

Lactucæ recentissimæ sativæ lib. ss.

Agninæ dictæ vnc. iv.

Radic. Scorzonæræ vnc. vj.

Tum ebulliant rursū spatio $\frac{3}{4}$ horæ, addendo semper tantum aquæ, ut a coctione supersint iuris lib. vj.

Ius cancrorum fluuiatilium.

Rec. *Cancror. fluuiatil. viuor.* lib. iij.

Coque spatio horæ, cum aq. lib. xij. tum exemptos contunde vna cum testis, atque coque in priori iure proprio adhuc per horas iv, addendo semper tantum aquæ, ut a coctione lib. viij. circiter supersint, tum ius fortiter exprime, atque ei infunde

Flor.



Flor. Borragin. vnc. ijs.

Buglossi vnc. j.

Radic. Tragopog. vnc. ij.

Dein ebulliant simul spatio $\frac{1}{16}$ horæ.

Sumatur de vitrouis horum ad vnc. ijs. omni biboria

Decoctum humectans.

Rec. Sem. Papaveris albi contus. vnc. j.

Auenæ integræ drach. iv.

Cicer. rub. contusor. drach. xij.

Flor. Borragin.

Althææ ana drach. vij.

Rad. Scorzonæræ vnc. ij.

Glycyrrhizæ drach. ij.

Fol. Maluæ.

Parietariæ ana m. f.

cum Aq. decoct. spatio $\frac{1}{4}$ horæ; pint. ij. admisce

Rob. Ribesiorum,

Sambuci ana vnc. j.

Capiat vnc. ij. omni hora diei.

Lenientia.

Sunt, quæ duritiem, i. e. rigiditatem, tollunt; *vid.*
§. 35.

Emollientia.

Fere eadem ac lenientia.

Diluentia.

Sunt hæc quidem primaria.

1. *Aqua* pura ad teporem sani corporis calida, balneo, fotu, vapore, clysinatæ, potu, adplicata.

2. *Serum lactis* recens similiter vsurpatum.

Resoluentia.

Sunt, quæ id, quod prius fluidum, dein concretum, fuerat, iterum in fluidum reducant.

1. *Diluentia.*

2. *Salina*, ex sale marino, gemmæ, nitro, ammoniaco,



niaco, borace, alcalicis volatilibus vel fixis. Acida rite fermentata &c. composita ex his, sal polychrestus, tartarus tartarificatus, tartarus purgans Sennerti, panacea duplicata ducis Holsatiæ, nitrum stibiaturum, sal viperarum saturatus Tachenii, &c.

3. Saponacea, sales volatiles spirituosii, aromatici, oleosi.

4. Sapo chemicorum ex ol. destillat. & alcali fixo: domesticus ex ol. expresso & alcali fixo.

5. Mellita.

6. Succi horæi maturi, & aloetica.

7. Remedia mechanica, frictiones, &c.

Hæc iterum tot diuersis modis adplicari possunt. v. g.

Forma Mistura.

Rec. *Aq. stillatit. rutæ* vnc. xij.

Borac. Venet. drach. ij.

Sal. volat. oleos. drach. iij.

Mellis puriss. vnc. iij.

M. *Capiat* vnc. j. *omni hora diei.*

In Guttis.

Rec. *Elix. pp. cum sale tartar. præparat.*

Sal. vol. oleos.

Sal. purgant. Sennerti ana vnc. ss.

Capiat gutt. xxv. *quater de die ex vino.*

Pilularum forma.

Rec. *Sapon. Venet.*

Boracis,

Aloes puræ ana drach. ij.

M. F. *Pil. singulæ* gr. iij.

Capiat vnam *quater de die.*

Specie Decocti.

Rec. *Herbæ recentis saponariæ* m. iij.

Beccabunga m. ij.

Fuma-



Fumariæ m. j.

*Rad. recent. graminis,
cichorei ana vnc. ij.*

cum aq. decoct. vase clauso, spatio $\frac{1}{8}$ horæ, per pannum expressi, per quietem depurati, Decocti pint. iij. admisce

Rob. sambuci,

Oxymel. simplicis ana vnc. ij.

Capiat ij. vnc. omni hora calidas.

In Pulvere.

Rec. Spermat. ceti,

Boracis ana drach. ij.

M. F. Pulu. diuid. in dos. viij.

Capiat j. omni bihorio ex pauxillo vini.

Abstergentia.

Sunt, quæ glutinosa fluida, vel semicorrupta solida, depellunt a locis, quibus sua tenacitate adhæserunt, suntque

1. Diluentia.

2. Resoluentia.

3. Maxime saponacea, lixiviosa, fixa, & mellita cum aceto.

DE SIMPLICISSIMIS HUMORVM VITIIS ET SPONTANEIS.

58. **H**umores in homine viuo reperiundi, vel crudi assumptorum naturam retinent hætenus, vel vi actionum naturalium, & miscela fluidorum humanorum, indolem acquisuerunt nostris liquoribus similem.

59. Prio-

59. Priores (58.) vel ex plantis, vel ex aliis sunt hausti animalibus.

MORBI SPONTANEI EX ACIDO HVMORE.

60. **L**iquida nostra, confecta ex plantis farinosis, vel ex horæis fructibus, crudis, fermentatisque, si vires vitæ nostræ vincunt, eam in nobis indolem acquirunt, quam suæ naturæ per calorem foræ debent. Acrimonia acida, & glutinosum pingue hinc oriuntur maxime. Prior ex fermentatis imprimis & non fermentatis: posterius ex farinosis cerealibus, vel leguminosis, non fermentatis, neque coctis nascitur; quo spectant etiam illa, quæ austeri adstrictu tenacitatem humorum creant.

61. Acida hæc acrimonia (60.) causas habet antecedentes 1. alimenta ex farinosis, succulentis acidis, recentibus, crudis, feruentibus iam, vel fermentatis, vegetabilium partibus. 2. Inopiam boni sanguinis in corpore hæc alimenta assumente. 3. debilitatem fibrosæ compagis (24. 29. 41.) vasorum & viscerum. 4. defectum animalis motus.

62. Se-

62. Sedem habet iam nata maxime primæ digestionis officinas, inde tardius sanguinem, denique omnes humores inficit.

63. Producit ructus acidos, famem, morsum ventriculi, dolores iliacos, flatus, spasmos, inertiam bilis, mutationem eius variam, chylum acidum, fæces alui acidum spirantes. Hæc eius effecta in stomacho, & intestinis.

64. In sanguine pallorem, serum chylosum acidum; hinc fœminis lac acidum, aut potius nimium acescens, sudorem acidum; salivam acidam, producit; inde pruritus, obstructiones, pustulæ, ulcera, lactis prompta nimis, quin & forte ipsius quoque sanguinis coagula, & ad circuitum ineptitudo exsurgunt, tum irritamenta cerebri, neruorumque; vnde conuulsio, turbata circulatio, mors.

65. Ex his (60. 61. 62. 63. 64. 65.) recitatis præsens, futura, præterita cognoscitur acida temperies; hinc prænoscentur eius effecta; hinc curatio scitur.

66. Quæ perficitur: 1. alimentis acido oppositis ex animalibus, vegetabilibusque. 2. succis bono sanguini similibus

bus ex auibus rapacibus. 3. roboranti-
ous. 4. motu valido. 5. medicamentis
acidum absorbentibus, diluentibus, ob-
tundentibus, immutantibus.

67. Quorum electio, præparatio, do-
sis, applicatio tempestiua, innotescunt
medico ex cognito malo, eius sede, æ-
grotante, &c.

68. Hinc patet cur pueris, pigris, vir-
ginibus, pauperibus, & certis artificibus,
hic morbus familiaris sit?

AD MORBOS SPONTANEOS EX ACIDO.

SECT. 66. N. I.

Iura ex auibus, piscibus, & quadrupedibus. Ipsæ ho-
rum carnes, in primis assæ. Gelatinæ ex juçe inspissato.
Vinum cum sale paucò alcalino.

Rec. *Sal. absinthii* drach. ij.

Vini Gallici albi vnc. xxiv.

M. Bibatur vnc. j. omni trihorio.

Vegetabilia antacida.

Absinthium.

Alliaria.

Allia.

Anethum.

Anthora.

Angelica.

Anisum.

Apium Celeri.

Aristolochia longa.

- - - *rotunda.*

Armoracia.

Arum.

Asclepias.

Asparagus.

Asphodelus albus.

Basilicum.

Brassica.

C

Cala-



Calamus aromaticus.
 Calamentha.
 Carduus bened.
 . . . Mariæ.
 Carum.
 Caryophyllata.
 Caryophylli aromatici.
 Cochlearia.
 Cepæ.
 Centaurium min.
 Dauci.
 Eruca.
 Eryngium.
 Erysimum.
 Eupatorium.
 Galanga maior.
 . . . minor.
 Helenium.
 Lepidium.
 Maiorana.
 Marrubium.
 Matricaria.
 Mezercon.

Napus.
 Nasturtium.
 Nepeta.
 Origanum.
 Piper.
 Porrum.
 Pyrethrum.
 Raphani.
 Ruta.
 Saponaria.
 Satyrion.
 Serpillum.
 Sabina.
 Satureia.
 Sedum acre vermicul.
 Sinapi.
 Squilla.
 Thymus.
 Thlaspi.
 Victoralis.
 Vrtica.
 Zedoaria.
 Zingiber.

SECT. 66. N. 2.

Tales sunt aues & auiculæ, quæ pascuntur infectis, in primis & pisciculis, vt anas, anser, passer, fringilla, alauda, turdus, perdix rostrata, larus, coturnix. Harum omnium oua.

SECT. 66. N. 3.

Roborantia.

Sunt, quæ fibris, vasis, membranis, visceribus, vim elasticam addunt: 28. N. 1. 4. Item spirituosâ fermentata, cereuisia generosa, vina, hydromel, Sp. vini.

SECT.



SECT. 66. N. 5.

Absorbentia acidi.

Quibus immersa acida vim acrem amittunt ita, ut nec ut acida, nec ut acria, agere porro queant: dum interea nullam ipsa acrimoniam habent, qua corpori noceant, inde aliis sæpe præferri solent. Vno hoc damnosa, si, inerti pituita mista, mole nocent & pondere.

Sunt ossa sicca piscium; mandibula lucii; &c.

Lapis, chelys, testa cancerorum, astacorum.

Ostreoderinata, concha intulorum, &c.

Corallia; perla; mater perlarum; &c.

Creta; bolus; osteocolla; marga.

Lapis hæmatites. *gran.* xv.

Limatura stanni. *gr.* viij.

• • • ferri. *gr.* xij.

Diluentia acidi.

Aqua & aquosa. 54. N. 4.

Obtundentia acidi.

Quæ molli suo lentore inuiscant acria acida ita, ut acies eorum hebetata amittat noxiam; dum simul defendunt membranas, ne offendantur a spiculis acidis; itaque & effecta horum iam impressa tollunt. Solum obfunt quandoque iis, quibus laxa nimis corporis compages ultra labefactaretur.

1. *Oleosa.*

Amygdalæ dulces, & amaræ.

Pistachia.

Nuces auellanae, iuglandes, coccos.

Semen papaveris albi.

Olea expressa ex his, tum oliuarum, &c.

2. *Gelatinosa*, ex iusculis inspissatis carniū & piscium.



3. *Aromata oleosa, leniora, ratione olei.* vid. §. 66. N. 1.
Tum præparata ex his infinita.

Immutantia acidi.

Quæ, cum acidis mista, statim cum hisce efferuescunt, itaque motum cient, stimulant, agitantque, fibras; postea vero, ipsis cum acidis unita, constituunt nouam salis speciem, in qua vis stimulans, diaphoretica, diuretica, resoluens, adhuc superest. Male cedunt tantum his, quibus nimius motus adest infestus.

Sales alcalini fixi, ex quocunque combusto vegetante parati. *gr. vj.*

- - - volatiles ex destillatione animalium, stirpium putrefactorum, aut & plantarum antacidarum recentium, parati (vid. §. 66. N. 1.) *gr. X.*

Saponacci fixi, sapo venetus, &c. *drach. j.*

- - - volatiles. *drach. ss.*

Qui triplices in primis;

1. Spiritus volatiles, oleosi salini, sanguinis, urinæ, cornu cerui, ferici. &c.

2. Offa Helmontiana ex alcohole vini purissimo & sp. Salis ammoniaci fortissimo mistis, & destillando unitis.

3. Sales volatiles alcalini fortissimi cum oleis aromatum sæpe sublimati, atque ita uniti. *e. g.*

Rec. *Sal. C. C. purissimi, sicci vnc. j.*

Olei stillatiz. cortis. citrei drach. j.

Sublima aliquoties ex phiala alta.

Tum præparata ex hisce.

MORBI A GLUTINOSO SPONTANEO.

69. **G**lutinosum pingue ex vegetabilibus habet causas antecedentes, 1. farinosa cruda, austeram immatura. 2. inopiam

piam boni sanguinis. 3. debilitatem vasorum, viscerum, bilis. 4. imminutum motum animale. 5. dissipationem liquidioris per laxata vasa secernentia. 6. retentionem craffioris debilitate instrumentorum excernentium.

70. Nascitur primo in prima officina digestionis, hinc in sanguine, dein in reliquis, inde deriuandis, liquidis.

71. In primis viis facit prostratum appetitum; repletionis sensum; nauseam; vomitum; ingesti cruditatem; bilis inertiam, eius inuiscationem & consumptionem; pituitæ stomachicæ & intestinalis ortum; aluum tardam & tumentem, impedimenta chyli parandi, perficiendi, secernendi.

72. In sanguine visciditatem, pallorem, immeabilitatem; in vasis obstructiones, concretiones, vrinam pallidam vix olentem; saliuam lentam; tumorem album; impeditas secretiones; defectum subtiliorum; sic minimorum canalium coalitum facit.

73. Hinc coctiones, circuitus, secretiones, excretiones, motus vitales, naturales,

rales, animales, omnes perturbantur, unde suffocatio, mors.

74. Ex his (69. 70. 71. 72. 73.) diagnosis, prognosis, anamnesis, mali huius patet, nec vero, sanatio quid indicet, obscurum est.

75. Quæ obtinebitur. 1. usu cibi potusque bene fermentati, sale, & aromate conditi. 2. iusculis volatilium animalium 3. roboratione vasorum & viscerum. 4. aucto motu. 5. medicamentis diluentibus, resolventibus, stimulantibus, biliosis, saponaceis. 6. frictu, calore, balneo, vesicatoriis. Cæterum interiora corporis obsidentur glutinosis, vel spissis, caseosis, mucosis, mucilaginosiis, lemosis, ceraceis, pultaceis, amurcosiis, calculosis, tartareis, ferosis inflammatis, polyposis, meliceratis, steatomatosis, atheromatosis densis, scirrhis concretis. Cauendum religiose ne perturbetur glutinosum beneficum, naturale, lubricans, inungens, defendens, quod oculis, palpebris, naso, ori, faucibus, gulæ, ventriculo, intestinis, pelui, vreteribus, vesicæ, vrethræ, vaginis mucilaginosiis tendinum, articulorum commissuris, laryngi, arteriæ asperæ, bron-

bronchiis, datum in vsus necessarios, cum glutinoso morbofo. Quod fatali idiotarum, & medicastrorum, errore nimis crebrum.



CONTRA MORBOS A GLVTI-
NOSO SPONTANEO.

SECT. 75. N. 1.

Aromata, quibus cibi, potusque, condiri commode possunt, sunt primaria:

Cinnamomum.

Macis.

Nux myristica.

Cortex Aurantiorum.

Thymus.

Origanum.

Caryophyll. arom.

Zinziber.

Piper.

Galanga min.

Cortex Citrei.

Anisum.

Coriandrum.

Serpillum.

Cardamomum.

Hæc pani, vino, cereuisiæ, fermentandis mista profunt.

SECT. 75. N. 2.

Vid. 66. N. 1. 2.

SECT. 75. N. 3.

Vid. 28. & 47.

SECT. 75. N. 5.

Diluentia, resoluentia, vid. 54. N. 4.

Stimulantia.

Quæ mole, densitate, figura, mobilitate, fibrillis vasculorum impacta, vim contractilem augent. Primaria sunt,



1. *Acida Salina.*

Natiua.

Succi citrei.
aurantii.
vuarum.
horæi acidi.

Sales ex succis vegetantibus pressis, sola parati mora.

Fermentata.

Vinum Rhenanum.
- - Mosellanum.
Acetum vini.
- - cereuisiæ.

Sp. aceti.
Tartarus.
Cremor tartari.
Lac acefcens.
Serum lactis acidum.

Ignæ producta.

Sp. falis marini.
gemina.
nitri.
vitrioli.
fulphuris per campanam.

2. *Alcalina Salina.*

Fixa.

Omnia ex cineribus plantarum, vt,
Sales absinthii.
cardui bened.
Tartari.
Cineres clauell. gr. vj.

Volatilia.

Omnia ex destillatis, vel putrefactis animalibus, vt,
Sales & sp. C. C.

Humani sanguinis.
Ossium.
falis ammoniaci.

3. *Sa-*



3. *Salina Composita.*

Sal Marinum.

Gemmæ.

Ammoniacum nativum.

- - - - - artificiale.

nitri.

borax.

Tartarus tartarifatus.

- - - - - regeneratus.

4. *Olea acria Aromatica vel ambusta.*

Olea stillatit. Absinthii.

Cortic. Citrei.

- - - Aurantiorum.

Cassia lignæ. Chamæmeli.

Cinnamomi. Caryophyll. arom. Hyssopi.

Ligni Guajaci. Ligni Juniperi.

- - - Sassafras.

Macis. Maioranæ. Menthæ.

Nucis Myristicæ. Origani Cretici.

Pulegii. Rhodii Ligni.

Rorismarini. Rutæ. Sabinæ.

Tanacetii. Salviæ. Spicæ.

Sem. Anisi, anethi, Cari, Fœniculi.

Succini. Terebinthinæ.

Olea pressa.

Ol. amygdalarum amararum Laurinum.

Macis. Nucis myristicæ.

Olea nativa.

Balsamus Hierichuntanus. Tolutanus. Palmæ.

Peru. Copaibæ. Mecca. Terebinthinæ.

Olea ambusta, acria, per retortam destillata.

Ol. Ambust. Sanguinis. Ossium. Cornuum.

Ouorum. Vrinæ. Lignorum.

De Lateribus, &c.



5. *Spiritus inflammabiles fermentati.*

Farinæ, & Succorum horæorum.

6. *Planta acres aromaticæ dictæ, quæ sale*

N. 2. oleoque N. 4. abundant.

| | | |
|--------------|-------------------|-------------------|
| FOLIA | Abrotani. | Marrubii. |
| | Abfinthii. | Matricariæ. |
| | Agerati. | Melissæ. |
| | Anethi. | Menthæ. |
| | Anisi. | Nasturtii. |
| | Aristolochiæ. | Nepetæ. |
| | Ari. | Nicotianæ. |
| | Betonicæ. | Origani. |
| | Calaminthæ. | Piperitidis. |
| | Cardiæ. | Perficariæ acris. |
| | Chamædryos. | Porri. |
| | Chamæpityos. | Pulegii. |
| | Chelidonii mai. | Rorismarini. |
| | Cochleariæ. | Rutæ. |
| | Dictamni. | Sabinæ. |
| | Hepaticæ nobilis. | Saluiæ. |
| | Erysimi. | Satureiæ. |
| | Eupator. cannab. | Scordii. |
| | Fœniculi. | Serpilli. |
| | Hederæ terrestr. | Soldanellæ. |
| | - - - arbor. | Thymi. |
| | Hyssopi. | Tanacetii. |
| | Lauri. | Thlaspi. |
| | Leuistici. | Veronicæ. |
| | Maioranæ. | Vrticæ. |

Stimulantes aromat.

*Flores herbarum, quarum folia mox recensita sunt,
in primis*

FLORES Agerati

Aurantiorum.

FLO-



FLORES Calthæ.
 Caryophyll. hortensis.
 Centaur. minor.
 Chamæmeli.
 Citrei.
 Croci.
 Eupatorii.
 Lilior. conuall.
 Lupuli.

Meliloti.
 Mari Syriaci.
 Saluiæ.
 Scabiosæ.
 Schœnanthi.
 Spicæ.
 Stœchad. Arab.
 Tanaceti.
 Tiliæ.

Stimulantes aromat. radices.

RADICES Acori.
 Allii.
 Angelicæ.
 Anthoræ.
 Aristolochiæ.
 Armoraciæ.
 Carlinæ.
 Caryophyllatæ mont.
 Ceparum.
 Chelidon. maj.
 Contrayeruæ.
 Costi hortens.
 - - Oriental.
 Curcumæ.
 Cyclaminis.
 Cyperi.
 Doronici.
 Fraxinellæ.
 Fumar. bulb.
 Galangæ.
 Gentianæ.
 Helenii.
 Imperatoriæ.
 Iridis.

Leuistici.
 Mei.
 Ninzing.
 Ononidis.
 Petaſitidis.
 Petroselin.
 Peucedani.
 Præniæ.
 Porri.
 Ptarmicæ.
 Pyrethri.
 Raphani.
 Rubiæ.
 Ruſci.
 Satyrionis.
 Scrophulariæ.
 Sefeli.
 Squillæ.
 Valerianæ.
 Victorialis.
 Vincetoxici.
 Zedoariæ.
 Zingiberis.

Stimu-



Stimulantia aromatica semina.

| | | |
|---------------|------------|------------------|
| SEMINA | Anacardii. | Iuniperi. |
| | Anethi. | Lauri. |
| | Anisi. | Leuistici. |
| | Apii. | Napi. |
| | Aquilegiæ. | Nasturtii. |
| | Bardanæ. | Nigellæ. |
| | Cardamomi. | Rastinacæ. |
| | Cari. | Petroselin. |
| | Celeri. | Porri. |
| | Chermes. | Raphani. |
| | Coriandri. | Santonici. |
| | Cubebæ. | Seselios. |
| | Cumini. | Sinapi. |
| | Dauci. | Thlaspi. |
| | Eruce. | Nux myristica. |
| | Erysimi. | Nuci Persicorum. |
| | Fœnigræci. | |

Stimulantes aromat. cortices.

| | | |
|-----------------|--------------|---------------|
| CORTICES | Guaiaci. | Citreorum. |
| | Sassafras. | Limoniæ. |
| | Iuniperi. | Cascariglias. |
| | Aurantiorum. | Cinnamomi. |

Stimulantes aromat. succi.

| | |
|----------------|-------------|
| Aloe. | Iuniperi. |
| Ambra grisea. | Lacca. |
| - - - liquida. | Labdanum. |
| Ammoniac. Gum. | Mastiche. |
| Anime. | Myrrha. |
| Asa fœtida. | Sagapenum. |
| Bdellium. | Styrax. |
| Benzoin. | Tacamahaca. |
| Elemi. | Thus. |
| Galbanum. | |



7. *Insecta, aselli, formica, vermes mai-
les, cantharides.*

Partes animalium.

Castoreum, zibethum, moschus, vrina, stercora au-
um parum bibentium.

8. *Stimulantia composita.*

Sunt decocta, extracta, conseruæ, condita, tinctura,
spiritus, aquæ, sales volatiles, oleosi, spirituosi, plu-
læ, pulueres.

Decoctum contra glutinosa.

Rec. *Fol. aristoloch. rotund.*

chamædryos.

Rutæ, ana m. j.

Flor. calthæ,

cupator. ana vnc. ss.

Rad. angelic.

imperator. ana drach. vj.

Sem. celeri,

Rapban. hortens. ana drach. iv.

Cort. sassafras vnc. j.

māgellanic. drach. ij.

Cum aq. infundantur fere feruida, spatio ij. horar. dein
decoct. vase clauso, spatio $\frac{1}{2}$ horæ vnc. xlvj. exhibe.

Capiat vnc. j. omni hora calide.

Extractum contra glutinosa.

Rec. *Fol. recent. Absinthii,*

cupator. cannab.

marrub. albi,

tanacetij, ana q. l.

Concissis minutim, contritis dein, per prælum suc-
cum exprime; hunc leni igne depura per secessum sæcis,
dein exhala ad spissitudinem mellis crassi, cui adde

Salis



Salis absinthii Tacheniani $\frac{1}{40}$

Dof. drach. fs. bis de die, vacuo stomacho, ex vino Gallico.

*Similia extracta fiunt ex decoctis inspissatis, & per præ-
lum pressis.*

Conserua.

Rec. Summitat. recent. ruta,
tanacet. ana vnc. j.

Flor. recent. mari Syriac.
rorismar.
lauend. ana drach. iv.

Rad. recent. helenii,
vincetox. ana vnc. j.

Semin. raphani,
nasturtii, ana drach. iv.

Contusis admisce f. a.

Sacchar. albi vnc. iv.

*Capiat drach. j. quater de die, vacuo stomacho, ex vino
Gallico albo, vel Hispanico, maluaric. Canariensi &c.*

Conditum.

Rec. Zingiber. condit.

Rad. belen. condit.

Cortic. magell. ana vnc. j.

Syrup. mentha q. f.

Vt F. conditum.

Capiat drach. fs. sexies de die.

Tinctura.

Rec. Rad. gentiana,
anthona, ana vnc. j.

Flor. centaur. min. vnc. j.

Croci drach. j.

Bacc. Lauri,

Bacc.



Bacc. iuniperi,

Sem. erucæ,

sinapi, ana vnc. iſs.

Cum ſp. vini, in phiala alta vitrea, decoct. ſpatio xij. horar. lib. iij. ſerua.

Dofis drach. ij. ter de die, vacuo ſtomacho, ex vnc. j. Hydromel.

Spiritus.

Rec. Flor. lauend

tanacet.

aurant.

roriſmar. ana vnc. j.

Rad. angelic.

belenii.

imperat.

leuistic. ana vnc. jſs.

Fol. Calaminth.

cochlear.

matricar. ana m. j.

Sem. cari,

celeri,

erucæ,

nasturt. ana vnc. j.

Corz. iunip.

ſaſſafras,

cinnam. ana vnc. jſs.

Cum ſp. vini deſtill. ad dimidium, vt habeantur libr. iſs. bis cohobando ex veſica.

Capiat drach. ij. ex vino, vel hydromelle, ter de die.

Aqua.

Si loco ſp. vini aqua ſumatur in præcedenti, habetur aqua aromatica.

Dof. vnc. jſs. ter de die.

Sal



Sal volatile oleos.

Rec. *Sp. præcedent.* lib. ij.

Ciner. clauel. vnc. iſs.

Sal. Ammon. vnc. iij.

Destil. ex retort. ad lib. j. in hoc dissolue

Ol. stillat. *Cort. citrei* gutt. vj.

lauend. gutt. xx.

maioran. gutt. vj.

Dof. gutt. ix. *ter, quater, de die, ex hydromellis, vel vini,* vnc. j.

Pilulæ.

Rec. *Gumm. ammoniac.*

opobanac. ana drach. j.

Bulbi ari recentis drach. ij.

Sapon. Venez. drach. j.

Ol. stillat. *tanaceri.* gutt. x.

M. F. pilulæ, singul. gr. iij. deaurandæ. **capiat. I.**
omni triborio de die.

Puluis.

Rec. **Ol. destill.** *mentha,*

maiorana,

tanaceri, ana gutt. vj.

Sacchari albi siccissimi vnc. j.

F. S. A. elæosaccharum, cui admisce

Rad. zingib. alb.

Cort. magellanica. ana drach. iv.

Capiat drach. ſs. *ter de die, ex vino.*

Vinum medicatum.

Fiat ut spiritus hæc sect. descriptus. vel ut tinctura, decoquendo cum vino, loco sp. vini. Dof. vnc. ij. ter, quater, de die.

Cereuisia medicata.

Eadem ingredientia spiritus, eadem copia, infundantur in $\frac{1}{4}$ tonnæ cereuisiæ adhuc feruentis.

Pro

Pro potu adfiduo adhibeatur.

Biliofa.

Fel animalium quadrupedum, & fel pifcium, lupi in primis & anguillæ. v. gr.

Rec. *Fell. tauri,*

lupi pifcis, ana drach. iv.

Leni igne lente exhalent in mellis fiffitudinem, tum admifce

Farinæ bulb. ari recentiff. q. f.

F. pil. fing. gr. iij. deaurandæ.

Capiat j. mane, meridie, vefperi, una ante cibum hora.

Huc lapis hyftricus, *pedra d'el porco* dictus, referendus; cuius infufio in *aq. ftillatit. card. bened.* vel & in *vino Rhenano*, facta, propinatur ad vnc. ij. vel iij.

Item Helmontianum, ex *hepate & felle anguillæ* leni igne toftis in pulverem, dein *dati ad drach. j.* ex oblato involucro cum *vini Rhenani* vnc. iij.

Saponacea.

Vid. §. 54. N. 4. inter *refoluentia.*

SECT. 75. N. 6.

Balneum ad glutinofa.

Rec. *Summitatum rutæ.*

fabinæ.

abfinthii,

tanacet.

chamæmel. ana m. iij.

Cum *aq. decoct. pintis xij.* admifce

Sapon. Venet. vnc. iv.

Sal. farmentor. vnc. j.

Veficatoria.

Rec. *Raphani rustican. recentis & succulenti contrit. vnc. fs.*

D

Appli-

Applica ad cutim per horæ dimidium, aut rapidiu, donec inflammationem satis magnam excitatam, dolor feruidus, & rubor partis tumens, testetur.

Rec. Sinapi cum aceto contriti drach. iv.

Applica per horas quatuor.

Rec. Cantharid. sine alis contritar. in pulu. tenuem. drach. ij.

Adcurate misceantur cum drach. vj. fermenti panis, paulillo cum aceto subacti.

Applica spatio xij. horarum, vel donec in vesicam manifesto epidermis elata sit.

MORBI EX ALCALINO SPONTANEO.

76. **N**onnullæ plantæ scatent materia, quæ sponte corrupta non accescit, nec coit, sed resoluitur in foetidum volatile, pingue alcali: tales omnes fere aromaticæ valde acres. Has vero raro assumunt tanta copia, vt morbum creent ex suo ingenio. Sin autem id contigerit, pertinebit ad acre alcali oleosum.

77. Ex animalium partibus confecta nostra liquida varia sunt: 1. pro varietate alimenti, quo se sustinent. 2. pro varietate partis, quæ assumitur.

78. Animalia enim, quæ herbis & aqua alun-

aluntur, chylum acidum, vel facile acidescens, adeoque & tale lac, habent; quod in nobis, suam sequens indolem, vegetabili nutrimento simillima patrat. (Vid. 61. ad 76.) & lentam materiem, caeseo presso similem, in primis viis creat; quæ singularis hic viscidæ species.

79. Quæ aliis nutriuntur animalibus, omnes succos facile alcaliscentes habent.

80. Si alimenta, vi nostri corporis (58.), eo sunt redacta, ut iam liquores fecerint, quales in corpore sano & robusto inveniuntur; post abstinentiam a cibo potuque per viginti horas; tum, si sibi relinquuntur in quiete, & calore, vel etiam si mouentur valide, naturam adipiscuntur ubique eandem putredinis incipientis.

81. In alimentis vero ex aliis animalibus, iam statim, ante mutationem corpori nostro adscribendam, illa in putredinem vergens indoles sponte adest.

82. Putredo hæc (80. 81.) significat eam conditionem humorum, cuius præsentia aqua multum exhalat; salina materies attenuata, acido orbata, vel & mutata, a terra, oleoque suo, separata, fit acris volatilis, alcalina; oleosa pariter, una parte tenuior,

nuior, terra orba, sali illi acri permista, acris; volatilis, foetens euadit; altera autem olei pars, terræ aqua, sale, & oleo priori orbæ permista tenacissime, abit in atram, densam, immeabilem fecem.

83. Infecta, pisces, amphibia, animalia volatilia, repentia, gradientia, natantia, homines denique, ex propria sua natura, in hanc putredinem (82) sponte vergunt semper; acescunt nunquam.

84. Huius putredinis (82) antecedentes causæ sunt: 1. cibi ex aliis animalibus comestis, excepto lacte herbaceo (78), maxime ex infectis, piscibus, auib; rapacibus, ex vegetabilibus alcalescentibus. 2. abundantia boni sanguinis, vel si iam putredini ille proximus. 3. virtus magna vasorum, viscerum, (50. ad 54,) bilis. 4. Stagnatio, vel nimia agitatio, torpente, vel incitato animali motu. 5. Calor ingens diu & multum conciliatus corpori.

85. In primis viis facit sitim, prostratum appetitum, ructus nidorosos, graueolentiam tabidi, corruptique, fordes ori, linguæ, palato, faucibus, amarescentes putridas, nauseam, vomitum putrefactæ biliosæ materie, horrorem aduersus

fus omnia, nisi aquosa, vel acida, cruditatem, putridam, diarrhoeam biliosam, dolores iliacos inflammatorios, caloris molesti sensum.

86. In sanguine producit dissolutionem eius putridam; acrimoniam alcalinam oleosam volatilem; ineptitudinem ad nutriendum; aptitudinem ad consumendum; minimorum vasculorum destructionem; hinc omnes actiones solidarum & liquidarum partium turbat, depravat, destruit; vnde circulatio, secretio, excretio variat; tum febres ardentes, urinæ & omnia secreta putrida, inflammationes, suppurationes, gangrænæ, sphaceli, mors.

87. Ex his (76. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86.) denuo diagnosi & prognosis æque, ac curatio morbi liquido conspicitur.

88. Quæ perficitur 1. alimentis, potibusque, cito acescentibus, vel iam acidis, quo farinosa in aqua cocta, vel ad initium corruptionis digesta, lac, eiusque producta herbacea, fructus horæi, horum acidi crudi, vel fermentati vinosi, acetosiue, succi. 2. acidis medicamentis ex vegetabilibus crudis, vel fermentatis,

aut salibus & sulphure vi ignis in acida conuersis. 3. Salinis alcali absorbentibus, vt est sal gemmæ, marinus, & nitrosus. 4. Aquosis diluentibus. 5. lenibus obtundentibus, qualia farinosa vegetabilia emulcta; vel decocta, sunt; & laudatissimæ boli, acidulo balsamico tecto, & demulcentissimo viscido, constantes. 6. Saponaceis abstergentibus acidis suboleosis, oxymelle, sapis acetosis. 7. quiete, somno, balneo vaporis, fomentisue.

89. Vnde patet vbi, & cur acidus ructus nidorosum sequens bonus? cur, & quibus conualescentibus salis ammoniaci sapor molestus? cur sudor acidum spirans acutis salutaris? quæ acrimonia acida, alcalina, biliosa, oleosa sit? Qui morbi propria significatione putridi dici queant? Cur illi fortissimis, plethoricis, præcipue? an vnquam in homine viuente vlli humores iam vere alcalini reperti sint? rarissime: expertus loquor. Vrina in vesica, diu retenta, aut in calculo rariore absorpta, forte, aliquando, eo peruenire queat. Aliter mors ante fit, tabe factis per acria, necdum alcalina, pulposis vitalium extremis.

90. Hinc

90. Hinc tandem scitur, quid mali faciat nimius vel minor liquorum circulantium motus, & quantum eius effectus variet pro varietate loci, ubi hærent, & humorum, in quos agit? quæ a stagnante, vel ab extrauafato, nocumenta? imò neque obscura hinc ratio ortus viscosi glutinis, quo lentescunt humores nostri; dum spiffa decocta ex animalibus diuturna elixatione parata, nimia ingeruntur copia; aut etiam, dum tegumenta animalium, horumque lentæ, tenacesque, partes extremæ, auidius assumuntur, aut diutius: etenim alia hinc pituitosi indoles, & distincta ab illa, quæ iam exposita in fine (75.).

91. Pertractatis morbis solidi, & fluidi simplicissimis seorsum, agendum sequitur de iis, qui in solido & fluido coniunctim occurrunt simplices quam maxime.

CONTRA MORBOS EX ALCALINO SPONTANEO.

SECT. 76.

Herbæ alcalæscētes, & alcali in corpore humano generantes.

Edules, condimentis seruientes, venenatæ.

Abfinthium.

Alliaria.

D 4

Allium



Allium.
 Alysson.
 Armoracia.
 Arum.
 Atriplex olida.
 Asparagus.
 Barbarea.
 Brassicæ.
 Bryonia alba.
 - - - - nigra.
 Bunium.
 Camelina.
 Capsica.
 Cardiaca.
 Cardamine.
 Cataputia.
 Centaurium minus.
 Chamædrys.
 Chelidonium maius.
 - - - - minus.
 Cochlearia.
 Cepæ.
 Dentillaria.
 Digitalis.

Eruca.
 Erysimum.
 Etula.
 Eupatorium cannabinum.
 Gratiola.
 Iberis.
 Laureola.
 Lepidium.
 Napus.
 Nasturtium aquaticum.
 - - - - hortenſe
 Nerium.
 Perſicaria acris,
 Porrum.
 Raphani.
 Ruta.
 Sabina.
 Satureia.
 Sedum acre min.
 Sinapi.
 Squilla.
 Thlaſpi.
 Victoralis.

SECT. 78.

Ruminantia vel non ruminantia.

Aſina, bos, capra, equa, ouis &c. dant lac aceſcens.

Animalia, quibus victus ex vegetantibus, graminis, fructibus horæis, vel cerealibus, carnes dant & humores haud ita proclives in putredinem alcaleſcentem: unde & cibi inde petiti homini calido tutius concedendi. Sunt autem :

Agnus.

Anas cicur, vel domesticus, cerealibus paſtus.

An-



Anser cicur vel domesticus.

| | |
|------------|-----------------------|
| Aper. | Gallinæ domesticæ. |
| Aries. | Hædus. |
| Bos. | Lepus. |
| Capra. | Perdix domi saginata. |
| Capella. | Phasianus domesticus. |
| Caprillus. | Porcus. |
| Capo. | Sturnus. |
| Ceruus. | Turdus. |
| Columba. | Turtur. |
| Coturnix. | Veruex. |
| Cuniculus. | Vitulus. |

Huic classi adscribere cochleas & limaces licet.

SECT. 79.

Omnes fere pisces, tam marini, quam fluuiatiles, siue molles, siue crustacei, siue ossa habentes; Vix villo excepto.

| | |
|-------------------|-----------------------|
| Alauda. | Gallinago minor. |
| Anas fluuiatilis. | Merula. |
| Anser marinus. | Passer. |
| Cygnus. | Phasianus syluestris. |
| Gallinago maior. | Vanellus. |

Anium vero multæ ambiguae animalculis pascuntur & vegetantibus.

SECT. 88. N. 1.

Vid. 35. N. 1.

SECT. 88. N. 2.

Vid. 75. N. 5.

Stimulantia acida salina.

SECT. 88. N. 5.

Decoctum leniens, acescens.

Rec. *Auenæ cum cortic. vnc. ij.*

Aq. puræ lib. iij.



Decoct. ad residuum lib. ij. transcolato admisce:

Succi citrei recentis vnc. j.

Aq. stillat. cinnamom. drach. ij.

Syrup. mororum vnc. j.

Utatur pro cibo & potu.

Aut.

Rec. *Auena excorticat.* vnc. ij.

Aqua pura lib. iij.

Decoctum ad residuum lib. iij. depuratum stet in tepore per horas xij. vel donec lenissime aceſcat; tum adde

Syrup. violar. vnc. jſs.

Vini Rhenani lib. ſs.

Aq. stillatit. cortic. citrei vnc. iſs.

In uſus eoſdem.

Emulſio ſimilis.

Rec. *Auena excorticat.* vnc. iij.

Fiat cum aq. q. ſ. emulſio, cuius lib. iſs. admisce

Nitri puri drach. ſs.

Syrup. violar. vnc. j.

Aceti squillit. drach. ij.

SECT. 88. N. 6:

Rec. *Oxymell. squillit.* vnc. iij.

Aceti squillit. drach. ij.

Myrrhæ, in aceto ſolutæ in tincturam, drach. j.

Aq. stillat. cichorei vnc. vj.

M. *Capiat* vnc. ſs. *omni hora.*

Vel

Rec. *Aceti in ſpiſſitudinem mellis, per coctionem reducti* vnc. ſs.

Mellis puri vnc. j.

Syrup. cichorei vnc. iſs.

Aq. stillat. fumar. vnc. vj.

M. *Uſus ut prioris.*

Vel



Vel

Rec. *Rob. vibefior.*

Sambuci ana vnc. ij.

Oxymel. fimplic. vnc. j.

Sp. fal. commun. gut. xx.

Aq. decoct. bord. lib. iv.

M. *Utatur pro potu adfiduo ad lubitum.*

DE MORBIS ORIVNDIS AB EXCESSV MOTVS CIRCV- LATORII SOLO.

92. **O**mnia fluida, quæ in vlllo vase, ab arteria magna orto, continentur, ex solo sanguine sunt secreta, qui paulo ante in corde dextro & sinistro mistus erat, & referebat speciem vnus liquidum.

93. Habet tamen & ibi, & tunc, globos maiores, determinatæ molis, figuræ mutabilis, coloris rubri; sphæras flauas, rubris sextuplo minores, serofas; tum latice[m] pellucidum in igne concrefcentem; & aquam pellucidam, leuiorem, tenuiorem, partibus minoribus, sed ob pelluciditatem non cernendis, constantem. Priorum congeries sanguis ruber, posterior serum appellatur. Microscopia vtrumque demonstrant.

94. Rubrum concretum, & a sero serosum

orsum collectum, sola quiete, & laxitate suarum partium, cito resoluitur in ferum, ita, vt in id omnis fere cruor abeat.

95. Serum diu retentum in aëre moderate calido & humido, sola quiete & laxitate partium, resoluitur in tenuius, pellucidius, leuius liquidum, quod putrescit sensim, totumque fere auolat volatile. Quæ crescunt pro ratione tēporis.

96. Sanguis omnis (92.) recens, leui calore, parum superante salubrem, & cum pauco exhalantis dispendio, coit in massam solidam, scissilem, tenacem, non solubilem per aquam, falem, oleum, spiritus. Atque idem fit calore per humida conciliato, singulari concretionis, & simili prioris, genere.

97. Origo rubedinis (93. 94.) feri crescentis, lymphæ concrecentis, (95. 96.) debetur vasorum actioni, circulationis efficacix; vt chyli, lactis, cruoris, & sanguinis, mutata indoles docet, atque microscopia confirmant.

98. Auctus sanguinis per vasa motus oritur corde sæpius, & fortius, contracto.

99. Cor sæpius & fortius contrahitur:
i. cerebro & cerebello in nimiam expressionem

fionem liquidi neruosi agente, vt in affectibus animi, & dolore: 2. irritato corde per accelerationem motus sanguinis venosi, frictione, vel musculis agentibus, pulsus; aut per acre sanguini inhærens aromaticum, salinum, acidum, alcalinum, purulentum, ichorosum, putrefactum, & quandoque specie contagii, pestis, veneni, nondum definiendum mali genus.

100. Auctus motus sanguinis per vasa efficit maiorem vim pulsus sanguinis in vasa excipientia; maiorem renixum vasorum in sanguinem; sanguinis fortem compressionem; vasorum sanguinisque attritum validum ad se mutuo; partium sanguinis attritum validum inter se; calorem maiorem totius; sanguinis exsiccationem diffilato aquoso; eiusdem viscositatem inflammatoriam facile crescentem; sanguinis resolutionem in sales, oleaque volatiliora & acria; vasorum auctam ad initia amplitudinem; liquidorum crassiorum in tenuiora vasa impulsus, horum obstructions destructionesque, inflammationes, suppurationes, gangrænas, sphacelos, scirrhus; & quæ ex his infinita sequi possunt.

101. Co-

101. Cognoscitur ergo aucta circulatio notis eius causis (99.), & effectis (100); sed inprimis pulsū celeri, duroque; respiratione veloce & laboriosa; calore ingenti.

102. Remedia ergo nimio motui compescendo valida sunt, quæ frequentiam, & vim contractionis cordis imminuunt.

103. Quorum illa mentem, hæc corpus, spectant.

104. Priora sunt, quæ magnos affectus, ratiocinio, excitamento contrarii affectus, vel diuertendo, sopiunt.

105. Posteriora agunt quiete musculorum, laxatione venarum (54.), mitificatione acris cuiuscunque, diluendo, vel obtundendo (66. 67. 88.), doloris causas tollendo.



CONTRA MORBOS ORIVNDOS AB EXCESSV MOTVS CIRCVLATORII SOLO.

SECT. 105.

Dolorem tollentia.

Vid. §. 202. 228. 229. postea, vbi omnino de hac re agitur.

DE

DE MORBIS, EX DEFECTU CIRCVLATIONIS, ET PLE- THORA.

106. **D**efectu motus circulatorii morbi fiunt in humoribus illi, qui proxime accedunt ad hos, qui quiescentibus spontanei nascuntur. Modo bene consideretur aër, qui admissus corruptiones spontaneas accelerat, quæ aliter, eo secluso, lentiores. (58. ad 80.) adeoque intellectus, & curatio horum inde peti debet. Atque ex his omnibus plethoræ indices, causa, effectus, signa, remedia intelliguntur, si ad sequentia animus aduertitur.

α. Plethora est copia boni sanguinis maior, quam quæ ferre possit eas mutationes, quæ vitæ inevitabiles accidunt, nisi inducantur morbi.

β. Hanc generat omnis causa, quæ multum laudabilis chyli, & sanguinis conficit, simulque horum attenuationem, consumptionem, perspirationem, impedit.

γ. Quo spectat vis contractilis viscerum chylopteorum magna, ut & in corde & arteriis; simulque laxior venarum, & cæterorum vasculorum compages; ci-
bi

bi blandi, facile in chylum resoluendi; somnus multus, animus sedatus; quies musculosa, consuetudo mittendi sanguinis, naturalis, artificialis.

δ Effectus plethoræ omnes pendent a rarefactione, quæ maiori velocitati, atque inde nato calori, aut causis aliis, per solam observationem cognoscendis, adscribenda: hinc arteriarum dilatatio tam sanguiferarum, quam lymphaticarum; mutata secretio; compressio generis venosi sanguiferi & lymphatici; suffocatio circulaturi; inflammatio; vasorum ruptura; suppuratio; gangræna; mors.

ε Itaque facile cognoscitur præsens; prævidentur futuri effectus.

ζ Curatio absolvitur missu sanguinis; labore; vigiliis; cibo acriori post euacuationes; omissione euacuationum sensim introducta.



CONTRA MORBOS EX DEFECTU
CIRCULATIONIS ET EX PLETHORA.

SECT. 106. L. 2

Cibi acres.

Vid. §. 76.

Condimenta acria aromatica; §. 75. N. 1.

- - - acida; §. 75. N. 5. classe prima, sub titulo
acida salina.

MOR-

MORBI COMPOSITI SIMPLICISSI-
MI, OBSTRVCTIO, ET VVLNVS.
OBSTRVCTIO.

107. **O**bstruēctio est obturatio canalīs, transitum tollens liquido, per eum transiiciundo, vitali, sano, vel morboſo, orta ex exceſſu molis tranſituræ ſupra capacitatem vaſis tranſmiſſuri.

108. Quæ oriuntur ex anguſtia vaſis, magnitudine molis fluxuræ vel vtriſque concurrentibus.

109. Anguſtia vaſis fit compreſſu externo, contractione propria, vel augmento craſſitie in ipsis canalium membranīs.

110. Molecularum moles augetur viſcoſitate fluidi, vel errore loci.

111. Ex vtriſque vero a concurſu cauſarum vtriuſque (109. 110.).

112. Vaſa externe comprimuntur

1. a tumore vicino plethorico, inflammato, purulento, ſcirrhoſo, cancroſo, œdematoſo, ampulloſo, ſteatomato-de, atheromatode, meliceride, hydatidico, aneurifmatico, varicoſo, tophoſo, pituitoſo, calculoſo, calloſo.

2. a fractis, luxatis, diſtortis, diſtractisue

E

parti-

partibus duris, comprimentibus vasa flexilia.

3. Ab omni causa, quæ vasa nimis trahit, & elongat siue tumore, siue pressione partis extra debitum locum positæ, siue vi externa trahente.

4. Ab externis comprimentibus, quo vestes arctæ, fasciæ, pondus incumbens corporis quieti in vnam partem, ligaturæ &c. pertinent, motus, attritus, amplexus partis ad alia corpora.

113. Contractio vasi propria aucta, maxime spiraliū fibrarum, tum quoque longarum, cavitatem arctat, oriturque. 1. ab omni causâ augente vim elasticam fibræ, canalis, visceris. (31. 36. 40. 50. 51.) 2. ab tumore vasculorum minorum, quorum contextu maiorum latera & caua fiunt, nimis impletorum. 3. ab imminuta causâ vasa extendente, siue inanitio, siue inertia fuerit: vnde dissecti canales liquida propria coercent breui.

114. Augetur crassities in ipsa membrana vasis 1. ab omni tumore (112. N. 1.) orto in iis vasis, quæ vnita & contexta membranam efficiunt. 2. ab callis ibidem factis, cartilagineis, membranosis, osseis (51.).

115.

115. Partium fluentium moles augetur, vt immeabilis fiat, vel 1. mutatione figuræ sphæricæ in aliam maiori superficie incurrentem in aperturam vasculi; vel 2. adunatis pluribus prius seiunctis in vnam massulam.

116. Mutatur figura in primis, desinente æquabili, & vndique simul, atque æqualiter, premente pressione moleculæ, proprio elateri iam commissæ, hoc est, languente motu, vel laxato vase, vel minuta copia liquidi.

117. Adunantur moleculæ, quiete, frigore, gelu, exsiccatione, calore, motu circulari violento, & vase forti comprimente, coagulo acido, austero, spirituofo, absorbente, viscositate, oleositate.

118. Errore loci partes fluidi fiunt non meabiles, si in os dilatatum ad basin canalıs conici ruit corpusculum finem longe angustiozem tranare non potens. Plethora, motus auctus, rarefactio liquidi, laxatio vasis, dilatationem hanc præ cæteris creant; maxime si his prægressis, statim contraria horum sequuntur.

119. Vnde causæ, & natura obstructionis cuiuscunque patent.

120. Quæ nata in corpore viuo impedit transitum fluxuræ materiæ; reliqua impingentia sistit; horum actionem excipit; subtiliora exprimit; adunat crassiora; vas extendit, dilatat, attenuat, soluit; fluidum stagnans condensat; functionem integro fluore oriundam tollit; vasa inde irriganda deplet, siccat; capacitatem vasorum transmittendis liquidis minuit; copiam liquidi, velocitatemque per libera vasa auget; adeoque omnia, quæ inde pendere possunt, mala producit.

121. Quare pro diuersitate vasis obstructi, & materiæ obstructuentis, illi effectus (120.) variatis apparent phænomenis.

122. In vasis sanguiferis arteriosis rubris inflammatio primi generis fit, in arteriosis serosis flauis rubra inflammatio errore loci, vel flaua propria illi vasi, calida flaua, in lymphaticis arteriosis dilatatis inflammatio secundi generis flaua, errore loci, vel pellucida, calida, propria illi vasi; in arteriosis vasis lymphaticis, maioribus, cedema calidum; in minoribus dolores sine apparente tumore; in pinguisferis, osseis, medullosis, neruosis, biliosis alia.

123. Qui vero sedem, naturam, materiem,

teriem, causas, effectus obstructionum, hucusque (107. ad 123.) tradita nouit; illi signa, quibus futura, præsensque obstructio, ut & eius effecta, sciuntur, ignota non erunt.

124. Et cognita hac eius diuersitate, difficile non erit, propriam cuique curationem tradere.

125. Nam illa, quæ a compressu externo (112.), indicat ablationem causæ prementis, quæ, ubi possibilis, petenda ex secutura eius descriptione.

126. Ea vero, quæ ab aucta fibrarum contractione oritur, cognoscitur per signa, quibus visceris, vasis, fibræ nimia contractio scitur; (34. 36. 40. 50. 53.) tum quoque illa, ubi hæc contractio a secunda causa (113. N. 2.) per suæ causæ signa clara; ut altera, quam inanitioni prægressæ adscripsimus. (ibidem. N. 3.)

127. Sanatur hæc obstructio (113. 126.)
 1. per remedia contractionem nimiam fibræ, vasis, visceris emendantia (35. 36. 38. 54. 55.) 2. maxime, si ipsi affecto loco applicari possit eorum virtus, quod halitus, fomenta, balnea, litus,

fomenta efficiunt inprimis. 3. per auxilia, quæ vascula, membranas componentia, nimis impleta deplent. Quo euacuante in genere, sed præprimis illis vasculis applicata, spectant, quæ sunt laxantia, diluentia, resoluentia, attenuantia, deterſiua, euacuante. 4. per illa, quæ calloſitatem factam resoluunt.

128. Verum illa obstructionis species, quæ ab hac causa, raro, si vnquam, curari potest. Emollientia, & laxantia præcipua sunt. Vnde mortis patet inuitabilis necessitas, & magna vitæ longæ per medicamenta parandæ difficultas.

129. Illa fluidi ineptitudo ad transeundum per vasa, quæ a figura sphaerica amissa pendet, cognoscitur perspectis eius causis (116), quippe sensibiles plerumque sunt.

130. Sanatur vero remediis, quibus illa figura redditur. Qualia sunt, quæ motum augment per vasa & viscera. Vt stimulantia omnia, & roborantia; tum motus animalis citatior.

131. Liquidi spissior concreta moles, quum oriatur a tam variis & diuersis causis (117.), etiam pro re nata varia remedia,

dia, variam sanandi methodum, requirit: quæ diuersitas in singulis dein morbis indagata ipsa auxilia, & applicandi modum, dabit.

132. At moles concreta in genere tollitur 1. motu vasis reciproco. 2. dilutione. 3. attenuante fluido aduecto, permisto, moto. 4. coagulante causaeducta.

133. Reciprocum vasi motum conciliant 1. quæ distendentes causas temperant. Vt est venæ sectio. 2. quæ vasa roborant. (28. 29. 45. 46. 47. 49.) 3. frictio, & muscularis motus. 4. stimulantia.

134. Diluit aqua, calida inprimis, si hausta, iniecta, exhalans, applicata; atque dein ad loca, vbi soluendum hæret, pulsa sit. Quo deriuantia, attrahentia, propellentia spectant.

135. Attenuant 1. aqua, sal mar. gemm. ammon. nitr. borax, fixus alcalinus, volatilis. 3. Sapones ex alcali & oleo natiui, compositi, fuliginosi, volatiles, fixi, bilis. 4. præparata mercurialia. Quæ ipsa perducuntur ad loca debita per deriuantia, attrahentia, propellentia.

136. Causa coagulans educitur attra-

E 4

ctio-

Etione alterius fortius trahentis. Sic acida in alcalia, olea in alcalia, &c. trahuntur, quæ experimentis chemicis in primis inueniuntur.

137. Verum quum liquidum, in loca aliena pulsus, non penetrabile fit, hincque obstructions creat, producuntur multi, malignique morbi, vnde meretur id malum attente perpendi.

138. Scimus id factum, si nouimus 1. causas eius (118), quæ vt plurimum satis obseruabiles, prægressas fuisse. 2. his dein successisse contrarias. 3. vbi effectus eius clare cernimus (120. 121. 122.).

139. Facile quoque est præuidere, quid fiat ex hoc malo posito per ea, quæ exposita sunt (120. 121. 122. 123.).

140. Curatio fit 1. impactum retropellendo motu retrogrado in vasa maiora. 2. id resoluendo. 3. vasa laxando. 4. suppurando.

141. Impactum retrofertur. 1. euacuando liquorem, qui impactum vrget, magna, subita S. M. vnde nixu contracti vasis retro agitur. 2. frictione ab extremis vasis ad basin.

142. Im-

142. Impactum resolvitur remediis
(133. 134. 135. 136. 137.) ante positis.

143. Vasa laxantur remediis (35. 36. 54.)
propositis.

144. De suppuratione dicetur in histo-
ria inflammationis.

CONTRA OBSTRVCTIONES.

SECT. 135. N. 3.

Sapones *nativi* ex oleo & alcali, sunt succi recep-
tes, maturi, pressi, ex herbis omnibus acrimonia al-
calina validis, §. 76. vel admodum aromaticis §. 75.
N. 6.

Sapones *arte compositi* ex alcali & oleo.

Sapo niger.

- - Venetus.

] *drach.* j. ij.

- - Starckeyanus, siue Helmontianus. *gran.* iv. *scrup.* j.

Sapones *fuliginosi volatiles*.

Sp. oleosi, alcalini, ex aromatibus *alcalescentibus*.
(§. 76.) *gutt.* xv.

- - - ex fuligine. *gutt.* xv.

c - - - ex omni humore, vel solida parte anima-
lium. *gutt.* xviii.

Fuligo ipsa.

SECT. 135. N. 4.

Merc. dulcis. *ad gr.* x.

- - - sublimat. corrosivus, *ad gr.* $\frac{1}{8}$ dilutus.

- - - præcipitat. ruber. *ad gr.* ij.

- - - - - albus. *ad gr.* iv.

- - - turbith. *ad gr.* ij.

- - - niger *ad gr.* xvi.

Attrahentia.

Sunt, quæ laxant locum, quo adducendum, arctant, unde deducendum. Vid. §. 35. 28. N. 4.

Deriuantia.

Quæ liquores pellunt in locum datum; talia sunt euacuantia in loco, frictio artificiosa in vicinis.

Propellentia.

Sunt stimulantia. §. 75. N. 5.

DE VVLNERE IN GENERE.

145. **V**ulnus est soluta cohæsiō recens, cruenta, partis mollis, a corpore duro acuto, moto, pressio, vel resistente.

146. Causa ergo sensibilis eius est dures, acuties, motus, resistentia instrumenti vulnerantis.

147. Subiectum pars mollis, adeoque, textura vasorum sanguiferorum, serosorum, lymphaticorum, adiposorum, nervosorum, membranosorum, tendinosorum; tum vesicularum, quæ ex his conflantur.

148. In quo subiecto (147.) causa (146.) producit cohærentis separationem, liquidi contenti effusionem.

149. Inde lædit actiones, quæ pendent

dent ab integritate partium, & ab determinato fluxu liquorum per vasa.

150. Quæ vulnera proinde occupant eas partes, quarum integritas vitæ inseparabilis, lethalia sunt.

151. Horum (150.) autem alia ineuitabili necessitate mortem ferunt.

152. Alia, sibi relicta, mortem inferunt, sed artis auxilio ita emendari possunt, ut mortis periculum absit.

153. Tandem ex non lethalibus, neglectus, vel error lethalia potest facere.

154. Pro varietate alterius cuiusdam actionis, a parte integra prius exercitæ, etiam alia vulnerum effecta, atque inde variæ appellationes oriuntur, vix ignotæ perito actionum sanitatis.

155. Nec minor nominum, formarum, & effectuum varietas in vulneribus, a diuersitate causæ vulnerantis (146.) quoad figuram, modum adigendi, puniendo, secando, cædendo, agitando, illatum, vim impingendi, ablationem ex vulnere, relictionem in eo, infectionem venenatam.

156. Tum etiam omnia eadem (155.) variant pro differentia partis vulnus excipien-

cipientis (147), quoad eius duritiem, molliem, nexum, situm, effectum, liquida contenta, faciem mutatam.

157. Huius multiplicитatis originem nosse vt opus, ita nomina subtiliter distinguere non iuuat.

158. Si in corpore sano, robustoque factum vulnus in loco visibili, non irrigato magna quadam arteria, nec nimis tendinoso, hæc oriuntur phænomena; si modo a frigore, aëre, ficcatione, vulneris hiatus defenditur.

1. Partes, inter quas causa vulnerans adacta, sensim magis magisque a se mutuo recedunt, licet causa ablata sit, nisi punctura fuerit parua.
2. Cruor primo cum impetu effluit, dein sensim sponte sistitur.
3. Tum crusta sanguinea cauo vulneris innascitur.
4. Et liquor dilutus, rubellus, tenuis effluit.
5. Tum vero labia vulneris incipiunt rubere, calere, dolere, tumere; retorqueri, fundo interim tumido assurgente, præcipue assurgente adipe in aperturam vulneris, ibidemque cito degenerascente.
6. At-

6. Atque eodem tempore febricula cum calore & siti adest.
7. Hinc tertio, quartoue die serius, vel ocyus, vulneri adest liquor tenax, albus, pinguis, æqualis, pus.
8. Simul rubor, calor, dolor, tumor, retorsio labiorum, febricula, cessant, vel minuuntur.
9. Et sensim cauum vulneris a fundo sursum, & ab ambitu versus centrum, crescente noua, rubra, viua, materie, carne dicta, impletur, coeunte margine albo, subcærulescento, molli, æquali.
10. Postremo ficcatur vulnus, & obducitur cicatrice.

159. Si arteria non nimis magna, nec cordi admodum propinqua, omnino transuersim disseccatur, retrosiliens, atque inter solida vicina se recondens, sibimet obturaculo est; & cætera vt (158) prius.

160. Si eadem (159.) vulneratur transuersim non tota dissecta, retrotractis fibris vulnus ampliatur; hinc hæmorrhagia perpetua; & ea sedata, a tenuitate cicatricis cedente aneurisma.

161. Si arteria maior tota dissecta, oritur

tur perpetua, vsque ad defectum animi, vel vitæ, hæmorrhagia; inferius posita tabescunt, & putri exeduntur, sed lenta gangræna; aut arefacta penitus contrahuntur.

162. Nerui maiores, tensique, toti dissecti retrosiliunt, se recondunt, ramulos vulnere paulo superiores trahunt, tendunt, vicinis dolorem, obstructio-nemque creant, parti vero infra vulnus positæ stuporem, immobilitatem, marcoremque, aut & gangrænam.

163. Nerui tensi, tendinosi, puncti, vel dimidiato discissi dolores, aliquando primo obtusos, nonnunquam viuos excitant, primo loco vulneris, post per omnes neruos nexos, vicinosque; hinc calores, tumores, rubores late sparsos, febres, deliria, spasmos, inflammationem, inflammati aperturam cum euacuatione acris, tenuis, & copiosissimi sæpe feri; postea insensilitatem, rigiditatem, exsiccationem, immobilitatem producunt, vel gangrænam, & mortem: atque hæc quidem omnia eo violentiora accidunt, quo neruus est fortius tensus supra partes firmas, usque annexus,
aut

aut & inuoluticris magis tenacibus indutus.

164. Quæ eadem (162. 163.), parum mutata, etiam in tendinibus diuersimode læsis obtinent, atque sæuissima quidem.

165. Et membranæ, tendinum, neruorumque sæpe producta quum sint, iisdem afficiuntur morbis (162. 163.).

166. Quid lymphatica, adiposa, venosa vasa, & vesiculæ patiantur in vulneribus, quid efficiant, ex lege circulationis, & consideratione vicinorum facile intelligitur.

167. Si vulnus oculo patet, eius præsentia, & natura scitur 1. sensu ipso, absterso impedimento conspectus, & suppresso cruoris fluxu. 2. scientia anatomica vicinorum.

168. Vulneris autem absconditi præsentia, & natura noscitur. 1. ex scientia anatomica, situ vulnerandi, modo & vi inflictus. 2. ex læsa actione sequente vulnus. 3. ab excretis, intra vel extra corpus expulsis. 4. ab effectis superuenientibus, dolore, singultu, spasmo, tumore &c.

169. Ex

169. Ex cognitis (167. 168.) determinatur præuisus, vulnerum euentus.

1. mors, vel vita vulnerati.
2. sanatio possibilis, impossibilis, integra, pro parte.
3. curatio facilis, difficilis, brevis, longa.
4. effectus a vulnere, peracta sanatione, superstes futurus; vt tabes, insensibilitas, immobilitas, figura læsa &c.

170. Mors ineuitabilis a vulnere ex quinque effectis sequitur, adeoque necessario lethalia vulnera (151.) hæc sunt:

1. Quæ influxum neruosi liquidi a cerebello in cor intercipiunt. α . cerebelli vulnera; & cerebri profunda adeo, vt medullam oblongatam lædant multum. β vasa sanguifera intra cranium soluta cum effuso cruore, qui pressione, vel concepta putredine vitam tollit, nec terebra leuari potest ob conditionem loci, vt inferiora orbitæ oculi, & ossis temporum, ossis ethmoidis, basios cranii. &c. γ medullæ spinalis superioris profunda vulnera. δ tum ea, quæ neruos cardiacos difsecant.

2. Quæ

2. Quæ sanguinem cordis effundunt ex eius cauis vulneratis: vnde vulnera cordis profunda, in caua penetrantia, lethalia.
3. Quæ cruorem a corde, & a cerebro, cerebelloque deriuant vel in caua corporis, vel extra illud, neque medellam capere possunt ob situm loci. Vt magna vulnera pulmonis, hepatis, lienis, renum, pancreatis, mesenterii, stomachi, intestinorum, vteri in grauidis, vesicæ circa arterias eius maiores, aortæ, carotidum, vertebraliū & similia arteriarum, venarumque.
4. Quæ respirationem intregre tollunt; vt abscissio laryngis cum subductione fistulæ scissæ, vulnera magna bronchiorum, vulnera lata, vtramque cauitatem thoracis, cum admissu aëris, perforantia, vulnera diaphragma ab vtraque parte mediastini thoracis penetrantia, vel eius neruosa diffecantia.
5. Quæ motum chyli in cor tollunt; abscissio œsophagi, magna vulnera ventriculi, intestini tenuioris, superioris

F

inte-

integra dissectio, vulnus ductus thoracici, vel alvei chylosi.

171. Vulnera sua natura lethalia, arte vero curabilia (152) sunt, prædicuntur:

1. Vulnera encephali terebra leuanda.
2. Vulnera arteriæ; venæue maioris in loco, ad quem manus chirurgi peruenire potest.
3. Viscerum, ad quæ manus & medicamenta cum effectû sanationis peruenire possunt.
4. Quæ mortem inferunt emissio suo liquido in caua illa, vnde id educi sine discrimine vitæ potest; vt thoracis, abdominis, vterum, vesicæ, intestinorum quædam vulnera.

172. Prædicitur lethale fore ex non lethali (153.) per has causas.

1. Omissione purgationis effusi puris, vnde tabes purulenta; vel effusi sanguinis, hinc putrefacti.
2. Commisso vitio in sex rebus non naturalibus.
3. Neglectu, vel errore chirurgi.
4. Temperie naturali aut morbosa ægri, vel manifesta iuxta historiam eius ægri,
vel

vel aliquando adeo singulari, vt non nisi hoc euentu se manifestet: quam intentus obseruet semper in suo rescripto ad iudices consultus medicus.

173. Hinc renunciatio de vulneribus, definitio temporis, intra quod lethalitas determinatur, peti possunt.

174. Ex historia pariter vulnorum (ab 145. hucusque.) facilis erit prædictio euentuum aliorum, quæ (169.) præfagienda habentur.

175. Phænomenorum autem (158. 159.) causa patet perito actionum vitalium, & animalium. Vid. morb. solid. & fluid. in genere præmissos.

176. Tunicae arteriarum exteriores, illæsa interiori, punctæ, sectæ, tussæ, distractæ, erosæ, impetu sanguinis dilatantur, saccum formant, qui ad oui sæpe magnitudinem crescit; callosos parietes accipit; pulsât; colore rubello splendet; compressus euanescit; laxatus redit; suam arteriam ampliat; vicina vasa comprimendo angustat. Aneurisma verum vocatur (160.), cuius causa, signa, effectus sponte cernuntur. At-

que eo quoque refertur cordis aneurisma, eius ortus, signa, & effectus.

177. Si ab iisdem causis, similiter vulnerata arteria, curata debilius firmatur, eadem fiunt (176.).

178. Vbi ab iisdem causis (176.) omnes tunicae simul ruptae liquorem effuderint in partes vicinas distentas, nec exeuntem, fit collectio extrauasati cruoris, continenter aucta, & sine mensura, mollis, vix pulsans, liuida, compressu vix euanescens, breui putrescens, hinc gangraenam vicinorum creans. Aneurisma spurium est, (160) cuius causa, signa, effectus ex ipsa hac descriptione cognoscuntur.

179. Alii effectus arteriae dissectae maioris (161.) ex physiologia sponte intelliguntur, vt & phaenomena (162.) primo nerui dissecti.

180. Vt vero clara causa habeatur mirabilium effectuum, qui in nervis punctis, vel partim dissectis, apparent, iuxta dicta (163. 164. 165.) sequentia considerata ex anatomicis, & theoreticis.

181. Nervus omnis visibilis est fasciculus minorum neruorum, membranulis

lis nexorum, arteriolis, venulis, lymphaticis intertextis, vna dein communi membrana vestitus.

Per omnia hæc vascula, neruum componentia, perpetuo fluit liquor suis canalibus proprius a corde, cerebro, cerebello, & medulla spinali. His omnibus vis contractilis satis magna semper adest.

182. Ergo partes nerui integre dissecti a loco vulneris versus firmas partes, quibus nectuntur, retrosiliunt, sub solidis ambientibus se recondunt, eorum vi comprimuntur, orificia claudunt sua, & suorum vasculorum, adeoque præter dicta (162) nihil damni.

183. Si sectus, vel punctus ita sit, ut nonnulli neruulorum dissoluti sint, qui uniti maiorem componunt, partes solutæ retrocedentes (182) trahent minimas fibrillas, quæ nectebant neruulos inter se & vascula (181), unde fiet in his perpetua, lenta laceratio; adeoque dolor ingens, acutus, continuus. Partes vero adhuc cohærentes sustinebunt nunc solæ omnem vim, quam ante simul, ergo plus distraherentur, & lacera-

buntur, adeoque acutissime dolebunt, & distractæ comprimuntur, vt transitus impediatur. Dum vna pars soluta, altera cohærens, ita afficiuntur, vascula intermedia comprimuntur; ergo sanguis, lymp̃ha, spiritus sistuntur, vrgentur, accumuluntur, vnde circa partes inflammatio cruenta, lymphatica, & spirituosa.

Inde nerui vicini, tendines, horum & neruorum vaginæ, musculi, vasa, tenduntur, stringuntur, conuelluntur, hinc cerebri, cerebelli, medullæ spinalis meninges trahuntur, vellicantur, cerebri actio turbatur.

Ex quibus sequitur series omnium phænomenorum (163. 164. 165.) naturali necessitate.

184. Et intelligitur, quæ, & cur punctura, laceratio, vulnus nerui adeo funesta? Item cur membranis, tendinibus, vasisque multis eadem fiant.

185. Vt vulnus sanetur, opus erit:

- i. Auferre ex eo illa, quæ, vel a liquidis & solidis corruptis, vel ab instrumento vulnerante, aut aliunde, ibi relicta adunionem impedirent.

2. sup-

- . supplere perdita, noua regeneratione ablati.
- 3. vnire separata, & in adunatione retinere.
- 4. cicatricem naturali cuti simillimam obducere.

186. Fragmenta impacta metallorum, lapidum, ligni, vitri, globi tormentorum, thrombi cruenti, caro mortua, vel membranae, ossa fracta, primo tollenda, si proderit.

187. Considerata natura vulneris, partis vulneratae, materiae impactae, roboris aegrotantis, symptomatum secuturorum, tolli, an relinqui debeant, iudicatur.

188. Ex iisdem (187.) definitur instrumentum, & modus, quibus tolli queant. (186.).

189. Depurato sic (186. 187. 188.) vulnere, si ablatum quid fuerit de corpore, id repleri debet, generata iterum materia simili perditae. Id fit, si 1. vascula arteriosa, lymphatica, neruosa, &c. ita se habent, vt sua liquida bona excipiant, transmittant. 2. si liquidum bonum naturale debita copia, & apto impetu fertur in illa vasa.

190. His enim (189) fiet canalium vulneratorum, retrotractorum, obturatorum, compressorum, fere exsuccorum (158), impletio, humectatio, extensio, elongatio, implicatio cum vicinis, applicatio ad alia, quæ ex reticularibus plexibus propinqua, & ope boni liquidi conglutinatio.

191. Et, dum hæc (190) ab omni puncto fundi præcipue, & laterum, æqua vi simul fiunt, impletur ab omni parte ad centrum cauitas vulneris materie solida & liquida, amissis simili.

192. Ergo huc (189) requiritur i. victus debitus, vt chylus, serum sanguinis, & materia nutritia blanda, glutinosa, nec facile putrescens sit, sed facilis digestionis, & assimilationis. Decocta farinosa cruda, fermentata, emulsiones, lac, iura, fructus maturi cocti, olera lenissima, primaria sunt, sæpe, at pauca copia simul, exhibita; repletionem, famem, sitim, cauendo.

193. Cognita temperies ægri, tempestatis ratio, consuetudo, & natura comitantis morbi, docet quale, & quo modo præparatum ex his (192) cuilibet profit.

194. Acre,

194. Acre, impetum nimis augens, vitandum. Salsum, aromaticum, acidum, olus acre, vinum, ergo vulneri mala.

195. Item quæ facile putrescunt. Iura nimis spissa, herbæ alcalæscences, ergo obsunt; raphani, nasturtia, brassica, & similia.

196. Tum quæ difficulter in chylum, & sanguinem mutantur. Qualia sunt quæ sale, fumo, aëre induruerunt; vel quæ pingui multo scatent, vt lardum, pisces pingues, item anseres, anates, similes aues piscibus pastæ, &c; denique viscida: vt legumina crassa, farinosa cruda, ova.

197. Ad eundem scopum (189) conducunt medicamenta: quæ tollunt impedimenta nata consolidationi (190. 191.), & plerumque decocti forma exhibentur. Illa ergo erunt varia pro varietate eius impedimenti, quod tollendum erit: nec vllum vtile omnibus habetur.

198. Hinc pro re nata sumuntur ex attenuantibus, inspissantibus, mitigantibus, excitantibus, virtute singulari contrarium vitium emendantibus, aperientibus, laxanti-

xantibus, adstringentibus, adeoque sæpe ex oppositis.

199. Quorum quid eligendum, docet cognita natura vitii in ægro, & tituli horum medicamentorum (197. 198.).

200. Aëris puri semper, ab exhalante putri liberi, sæpe renouati, temperies sicca cum calore temperato optima.

201. Alius feruetur laxa vsu emollientium, laxantium, ἐκκροπωτικῶν.

202. Somnus conciliandus anodynis, victu humido, narcoticis.

203. Animus sit hilaris. Venus vitanda. quies commendanda est.

204. Vt canales in debita conditione (199.) maneant, nec liquida in vulnere corrumpantur, sicque lædant actionem (189. 190. 191.) descriptam, aër arendus, vulnus totum fouendum balsamicis vulnerariis lenibus, implendum carptis, ad æquabilem pressionem, nervisque amicis medicamentis.

205. Quibus (204.) in vulnere retinendis emplastra profunt, vix aliud huic scopo præstantia, quam tenacitatem, non lædentem.

206. Liquida ad vulnus allata, in vulnus
nus

nus effusa, fibræ semimortuæ, canales obstructi, tumefactique, creant in vulnere pus, ichorem, sordes, carnes spongiosas.

207. Quæ (206.) digerente, abstergente, corrodente, exsiccante auxilio tolli solent, sæpe & comprimendo.

208. Illa (207.) adhibenda, donec pus album, blandum, viscidum, læue, æquale, inodorum, adsit; sub quo sordes absterguntur, contusa & tumida consumuntur, corrupta ab aëre separantur, caua implentur, conglutinantur separata.

209. Tum ea, quæ carnem generare dicuntur, applicanda, quæ sunt digerentia leniora.

210. Si autem, peractis, quæ primo scopo (185) satisfaciunt (186. 187. 188.), nihil ex substantia corporis ablatum deprehenditur, labia vnienda ita sunt, ut partes naturaliter unitæ iterum sibi mutuo applicentur, atque ita retineantur.

211. Horum prius absoluitur 1. situ conciliato parti illo, qui quiescenti aderat: 2. leni & æquabili partium ad se invicem

uicem compressu, vt in omni superficie contiguæ sint, & quiescant.

212. Retinentur in adunatione 1. Emplastris tenacibus, digitatis, processibus, ad fines ansatis, vtrunque a latere vulneris appositis, & per fila adducendis. Quæ locum habent in longis scissuris transuersis cutis, vel partium laxarum.

213. 2. Circumductu fasciarum, & appositu spleniorum, vt partes dehiscentes (14. 1.) æquabiliter appressæ maneant, & coeant; quod determinato pressionis modo facile fit. Conuenit vulneribus inflictis iuxta longitudinem partis vulneratæ.

214. 3. Suturis per acus chalybeas, relictas in minori, curuas in maiori profunditate vulneris, acuta acie, cauda caua filum cera obductum abscondente, ad sufficientem a vulnere distantiam infixas ad fundum vsque adaectas, sic pariter in altero labio eduectas, quarum filo adstricto vnita prius labia retineantur, dein leui splenio superductum filum colligitur: id repetitur a medio, vel ab angulo vulneris, ad fines eius, pro necessitate.

tate. Hinc balsamo labia linienda, superpositisque leuibus spleniis supra nodos, emplastro tegendum est vulnus.

215. Conueniunt (214.) recenti, cruento, a magna tamen hæmorrhagia libero, simplici, pleno, puro, transuerso, obliquo, anguloso vulneri.

Nocent (214.) copiosum cruorem stillanti, antiquo, sanioso, purulento, fordido, contuso, substantia propria orbato, crustis obducto, vasis magnis læsis periculoso, nimis profundo, valde inflammato, venenis infecto, in parte necessario mobili hærenti vulneri.

216. 4. Acu manente vulneri per labia eius transfixa, filoque ei ita circumducto, vt horum retroitum impediat, sed retineat vnita. Conuenit magnis, hiulcis, pendularum partium vulneribus.

217. Vltimus scopus (40.) attingitur, curando vt pars parti sic respondeat, quemadmodum olim in sanitate, sicque retineantur, vt nimis nec premantur, nec laxentur; adurentia; stiptica, adstringentia vitando; imprimis vero curando, vt in omni parte æquabiliter prematur vulnus. Quæ omnia obtinentur peractis,

peractis, quæ descripta ab (41. ad 72.),
& dein imposito leni desiccante medica-
mento; denique cicatricem spirituosis
abluendo.

IN VVLNERIBVS.

SECT. 198.

Decocta vulneraria & potus.

1. *Attenuans.*

Rec. *Fol. daphnoid.*
veronica,
ruta ana m. jss.
Rad. caryophyllat. vnc. j.
Flor. centaur. min. pug. ij.
 Decoct. ex aqua lib. iij. admisce
Sal. card. benedict. drach. j.
Syrup. s. rad. aper. vnc. iij.
 Bibat vnc. iv. quater de die calidas.

2. *Inspissans.*

Rec. *Teleph.*
Consolid. mai.
 - - - *min.*
Malua,
Parietaria, ana m. j.
 Decoct. ex aq. lib. iij. admisce
Syrup. althææ vnc. ij.
Vfus ut prioris.

3. *Mitigans.*

Rec. *Sem. contusor. papau. alb.* vnc. iij.
Flor. verbasci vnc. ij.
Fol. bugulæ m. ij.
Rad. scorzoncr. vnc. ij.
glycyrrhizæ vnc. j.

Cum



Cum aq. decoct. lib. iij.
Exhibe in usum eundem.

4. *Excitans.*

Rec. *Rad. imperator.*
 vincetox. ana vnc. j.
Fol. rutæ,
 Scordii. ana m. j.
Sem. contusor. bardan. drach. x.
Sem. contusor. cardamom. drach. iv.
Flor. lauendul.
 centaur. min. ana vnc. ij.

Cum aq. decoct. lib. iij. *exhibe ꝑt. prius.*

5. *Singulari virtute emendans.*

1. Glutinosi. vid. *Attenuans.*

2. Acidi.

Rec. *Sem. sinapi vnc. ss.*
 Rad. armorac.
 Fol. crysimi,
 - - *nasturtii, ana vnc. ij.*

Vase clauso leuiter decoct. lib. ij. *exhibe.*

Sumat vnc. ij. quater de die.

3. Alkali.

Rec. *Rad. oxylaparb. vnc. ij.*
 Fol. trifol. acetos. in. ij.
 Rad. acetosell. vnc. j.
 Flor. borrag. drach. xij.

Cum aq. decoct. leuiter, lib. ij. *Exhibe in eundem usum.*

4. Oleosi.

Rec. *Tamarind. vnc. ij.*
 Crystall. tartari drach. vj.
 Rad. gramin. vnc. v.

Cum aq. decoct. lib. ij. *admisce*

** Rob. sambuci vnc. ij. Vfus idem.*

5. *Aperiens. vid. attenuans.*

6. *Laxans. vid. §. 54. N. 4. decoct. humectans.*

7. *Adstringens. vid. §. 28. N. 4. Titul. decoct.*

SECT.



SECT. 201.

Emollientia alui.

- α Iura carnis bubulæ recent. pinguia.
 β Olera lenia iuri incocta. §. 35. N. 1.
 γ Emollientia & humectantia epota & iniecta. §. 35.
 N. 3. §. 54. N. 4.
 δ Olea inprimis pressa, recentia, amygdal. dulc. oli-
 uarum.
 Laxantia alui fere eadem emollientibus.

Ἐκκοπρωτικά.

- α. Fructus maturi, horæi, acido dulces, pulposi, suc-
 culenti.
 Alkekengi.
 Baccæ ebuli.
 - - - sambuci.
 Caricæ.
 Cerasa hortensia quæcumque.
 Chamæmora.
 Chamærubî.
 Fraga.
 Iuiubæ.
 Mala armeniaca, persica, vulgaria.
 Pruna hortensia alba, cærulea,
 - - - Damascena, Gallica, Prignolensia, rubra.
 Ribesia alba, nigra, rubra.
 Rubi vulgaris nigri.
 - - - idæi albi, rubri.
 Sebesten.
 Tamarindi.
 Vuæ vitis omnes species.
 - - gruinæ.
 - - crispæ.
 β. Horum succi recentes, & musta.
 γ. Calliæ unc. ij.
 Mannæ unc. ij.

Tama-



Tamarindi *unc.* ij.
Pulpæ tamarindor. *unc.* ij.
Succi rosar. pallidar. *unc.* j.
Aloes rosatæ. *gr.* vj.
Passulæ. *unc.* iv.
Galban. *scrup.* fs.
Radic. polypodii quercini *unc.* ifs.
Rhabarbari *scrup.* ifs.
- - - in infuso *drach.* j.
Syrup. althææ Fernelii *unc.* iij.
- - - cichorei cum rheo. *unc.* ifs.
- - - fumariz *unc.* ij.
- - - ros. solutiū. *unc.* ifs.
- - - violar. simpl. *unc.* ij.
Mellis simplicis in aqua dilut. *unc.* ij.
Pilulæ Rufi *ad gran.* vj.

SECT. 202.

Anodyna sunt.

Quæ causas doloris tollunt, minuunt.

1. Diluentia. §. 54. N. 4.
2. Laxantia. §. 35. N. 1.
3. Humectantia. §. 35. N. 4.
4. Acre emendantia. §. 66. 88.
5. Tumores distendentes resoluentia. §. 54. N. 4.

Narcotica sunt.

Quæ acumen sensus obrundunt; & sunt

1. Paregorica mirissima, ut
Sem. papauer. alb. contusor. *unc.* ij.
Syrup. capit. papau. alb. *unc.* ifs.
- - - diacod. *unc.* ifs.
- - - florum rhæados *unc.* iij.

Hinc varia commode parari, adhiberi tuto queunt.
V. G.

G

Haustus



Haustus mitissimus.

Rec. *Aq. stillatiz. flor. rhæad. vnc. iij.*
fabar. vnc. j.
pæonia,
sambuci, ana vnc. iis.
tilia vnc. j.

Syrup. flor. rhæados vnc. iis. M.

Idem paulo magis hypnoticus.

Rec. In præcedenti mistura loco *syrupi rhæados*, tantumdem *syrup. diacodii*, vel *syrup. capit. papau. alb.*

Emulsio mitissima.

Rec. *Amygdal. dulc.*
Strobilor. pini,
Sem. papau. alb. ana vnc. j.

Cum *aq. stillat. flor. rhæad. q. s.*

F. S. A. emulsio, cuius vnc. x. admisce *Syrup. flor. rhæad. vnc. j.*

Eadem paulo plus soporata.

Rec. Loco *syrupi flor. rhæad.* eandem dosin *syrup. diacodii* vel, *capit. papau. albi*, in præcedenti emulsione.

2. *Fortiora narcotica.*

Pilulæ.

Rec. *Opii purissimi gr. ij.*
F. Pil. iij.

Detur una pro dosi, repetendo post horam, si prior nihil effecit, sic & tertio.

Puluis.

Rec. *Opii puriss. parum siccati, gr. ij.*
Corall. rubr.

Sacchar. perlat. ana drach. fs.

M. F. *Pulu. diuidat. in dos. iij.*

Vfus idem, qui in pilulis modo descriptus.

Con-

*Conditum.*

Rec. Opii, in pulverem redacti, præcedentis dosin
vnam.

Miucæ cydoniorum drach. j.

M. F. bolus.

Hic usurpari, geminarique, potest eodem modo.

Haustus in guttulis.

Rec. Opii, parum siccari, drach. j.

Spir. vini rectificat. vnc. j.

F. Tinctura. Dos. gutt. xxx. ex

Aq. stillatit. melissæ vnc. ij.

Syr. flor. rhæados vnc. fs.

Vel.

Rec. Opii parum siccari drach. j.

Sp. Aceti vnc. j.

F. Tinctura. Dos. gutt. xxx. ex

Aq. stillatit. flor. rhæad. vnc. ij.

Syrup. flor. rhæad. vnc. fs. M.

Mistura calida.

Rec. Tinct. opii cum sp. vini rectific. gutt. lxx.

Syrup. papau. albi drach. vj.

Aq. stillat. cortic citrei,

aurantior.

cinnamom. ana vnc. ij. M.

Sumat. cochlear. i. omni $\frac{1}{2}$ hora, donec sopiatur dolor.

Mistura frigida.

Rec. Tinct. opii cum sp. aceti. pp. gutt. lxxx.

Syrup. moror. drach. vj.

Aq. stillatit. borraginis,

papau. erratici, ana vnc. iij.

M. In eodem usus.

Emulsio.

Rec. Sem. papau. alb. contus. vnc. ij.

Cum aq. decoct. hord. F. emulsio, cuius vnc. x. admisce



Syrup. diacod. vnc. iſs.

Tinct. opii cum ſp. vini rectif. gutt. xx.

Aq. ſtillat. cinnamom. drach. ij.

cortic. citrei drach. x.

Capiat vnc. iſs. omni $\frac{1}{2}$ hora, donec incipiat leniri dolor.

Epithema.

Rec. Tinct. opii in ſp. aceti, drach. iij.

Aq. ſtillat. flor. ſambuci,

roſarum, ana vnc. iij.

Aceti ſambucini,

roſacei, ana vnc. ſs. M.

Cum pannis applicetur temporibus vtrimque.

Iuuat hic maxime parti dolenti demulcentia ita apponere, vt tollatur cauſa, quæ his ægris ſomnum arceat, qui eſt dolor in ipſa hac parte. Eo imprimis valent ſequentia tepide applicata, atque in eodem tepore bene conſeruata tamdiu, donec dolor leuatus erit.

Cataplaſma.

Rec. Folior. recent. papau. bortenſ. m. j.

hyoſcyami nigri m. ſs.

althææ m. iv.

Cum lacte recenti decoct. ſub finem admiſce

Farin. ſem. lini vnc. j.

Olei. recent. preſſ. ſem. lini vnc. ij.

F. S. A. cataplaſma.

Fomentum.

Rec. Succum expreſſum ex decocto prioris cataplaſmatis, dilutius parato, lib. iij.

Admiſce ſ. a.

Opii puri drach. ſs.

F. fomentum.

SECT.



SECT. 204.

Balsami blandi vulnerarii ad vulnera pura.

- | | |
|-------------------|-------------------|
| 1. Balsami nativi | Opobalsamum, |
| Copaibæ. | Palmæ. |
| de Gilead. | de Peru. |
| Liquidambar. | - - Tolu. |
| De Mecha. | - - Terebinthina. |

2. Balsami artificiales simplices.

Oleum rectificat. ceræ.

Terebinth. crassum.

Lini.

Hyperici.

Rosarum.

Solani.

Trifol. odorat.

Butyrum recens.

3. Balsami artificiales compositi.

Rec. *Flor. sulph.* drach. iv.*Ol. lini*, vel *oliuarum*, vnc. iv.

Leni igne coq. ad dissolutionem sulphuris integram.

Rec. *Gumm. elemi purissimi, minutissime confissi*, p. i.

Leni igne lente dissolut. admisce

Terebinth. venet. puræ nativæ p. i.

Soluta per linteam traice; tum admisce

Medullæ bouin. coctæ & separatæ a membranis,

p. ij.

Est Balsamus uniuersalis instar Arcæi.

Rec. *Ligni santali rubr.* lib. j.*Aq. communis* lib. iv.Coq. spatio ij. horarum; cola, inspissa in extractum
spissum, cui admisce*Sang. draconis minutissimam in farinam redacti*,
drach. ij.

Huius aliquantulum misce balsamo præscripto, do-



nec habet gratum rubrum colorem. Erit *balsamus ruber*.

Rec. *Ol. oliuarum* lib. iſs.

Lign. ſantali rubr. vnc. ſs.

Coque leniter, donec *ol.* ſaturate rubrum; tum feruidum cola per linteum, in eo ſolue ad ignem lenem

Cera citrina lib. j.

Terebinth. opt. lib. iſs.

Eſt inſtar *balaſami Lucatelli*.

Si ei admiſceſ

Balaſam. Peru. vnc. j.

Erit eo præſtantior.

Uſus omnium: Calefacta inſtilla vulneri, ſuperpone plumaceolum balaſamo rinctum, deliga ſemel ſingulis 24. horis.

SECT. 205.

Emplaſtrum deſenſuum rubrum.

Rec. *Ol. roſac.*

Cera alb. ana vnc. vj.

Bol. Armen.

Sang. dracon. ana vnc. iſs.

Rofar. rubr. pulueriſ. vnc. ſs.

M. Agita, donec refrigeſceta.

Emplaſtrum deſenſuum cæruleum.

- - - de minio.

SECT. 207.

Digeſtiuum.

Rec. *Terebinth. nativ.* vnc. j.

Vitell. ouorum N. i.

Exacte miſtis adde miſcendo

Mell. roſarum vnc. ſs.

Abſter-

*Abstergens.*

Rec. Aloes. }
Myrrhæ, } minutiss. puluerifat.
Fol. Scord. } ana drach. ij.
Sapon. Venet. tenuissime rasi, drach. j.
Accurate contritis simul admisce
Digestiui præced. vnc. iij.

*Corrodentia.*1. *Mitissima.*

Alumen vstum.
Cinis ligni viridis combusti.
Mercurius dulcis.
- - - albus præcipitatus.
Vitriolum album.

2. *Fortiora.*

Mercurius ruber præcipitatus.
Vitrioli colcothar.
Trochisci de minio Vigonis.

3. *Fortissima.*

Butyrum antimonii.
Lapis infernalis.
Mercurius sublimatus corrosiuus.
Oleum tartari per deliquium.
Oleum vitrioli.

Quo fortiora, eo prudentius usurpanda.

Rec. Aloes.
Myrrh. ana drach. j.
Sal. tartari drach. ij.
Aq. comm. vnc. ij.

Coq. in Elixir.

Exsiccantia.

Rec. Aerugin. vnc. v.
Aluminis crudi vnc. j.



Aceti fortis vnc. vij.

Mellis puri vnc. xiv.

Coq. in vnguentum.

Alumen leuiter calcinatum.

Aqua calcis viua.

Lapis hæmatites.

Mastiche.

Sanguis draconis.

Sarcocolla.

SECT. 209.

Carnem generantia, sarcotica dicta.

Balsami vulnerarii. §. 204.

Rec. *Ceræ citrinæ*.

Picis nigræ.

Resinæ vulg. ana lib. ss.

Ol. lini lib. ij. M.

Est basilicon, seu tetrapharmacum.

Rec. *Ceræ citrinæ* vnc. vj.

Olei florum hyperic. infusione parati, lib. ijs.

Lenissimo igne fufis adde

Resinæ pini siccæ, contritæ,

Colophonia vulgaris electæ, ana vnc. ijs.

Vbi simul fluunt, remota ab igne, per linteum traiectis admisce

Terebinthinæ Venetæ puræ vnc. ij.

Baculo mota, vbi densari incipiunt, insperge

Masticæ electæ,

Olibani puri, ana vnc. j.

Croci tenuissime contriti drach. j.

Est vnguentum aureum.

SECT. 212.

Emplastra tenacia.

Rec. *Emplast. diapalmæ q. s.*

Ol. oliuar. parum.

Solue.

Rec.



Rec. *Picis vulgaris* q. s.
Extensa ad linctum applicentur.

SECT. 217.

Cicatrifans, epuloticum dictum.

Vnguentum desiccatiuum rubrum.

diapompholyg.

calcis.

nutritum.

album Rhasis.

Emplastrum album coctum.

de lapide calaminari, seu griseum.

- minio rubrum.

Sparadrapum Gualtheri.

Colophonia ex terebinth. cocta in farinam redacta.

Thus.

Olibanum.

Mastiche.

HAEMORRHAGIA.

218. **S**i cruor manat ex vulnere multus per suas (159. 160.) causas, sistitur
 1. causticis ignitis. 2. corrosiuis 3. adstringentibus. 4. circumstricto filo. 5. dissectione integra. 6. fasciis & splenio pyramidalis comprimmentibus.

219. Reuulsio hic (218.) nihil iuuat, nisi vascula læsa (159.) parua, & plethora adsit. Eadem de victu, potu, & internis medicamentis vera sunt: quæ autem de hæmorrhagia dicta, eadem & fluxui ichoris,

ris, applicari queunt; licet auxilium hic summum in balsamicis crassioribus.



CONTRA HAEMORRHAGIAM.

SECT. 218.

Corrosiva.

Vitriolum album.

Lapis Infernalis.

Oleum Vitrioli.

Adstringentia.

1. *Quæ vasa contrahunt.*

Alcohol.

Sp. Terebinth.

Succus cydoneorum recens immaturorum.

Sanguis draconis.

Crepitus lupi.

Crocus martis.

2. *Quæ cruorem coagulant.*

Alcohol.

Spirit. nitri.

- - - sulphuris.

Vitriolum calcinatum.

Sacchar. saturni.

Granatorum cortex.

- - - flores.

Lapis hæmatites.

D O L O R.

220. **S**i fibra neruosa, cerebro orta, ita extenditur, vel alio modo disponitur, vt dissolutionem minitetur, fit doloris idea.

221.

221. Qui eo acrior, quo fibra rupturæ propior: eo autem mitior, quo naturali est tensioni propior.

222. Vnde dolor summus in eadem parte brevis, mitior diuturnus esse, & intendi potest, & remitti.

223. Causa doloris ergo omne id est, quod talem extensionem, vel dispositionem, (220.) facit.

224. Quo refertur 1. vis naturalis contractionis paucioribus fibris sustentata, dum quædam solutæ sunt (183.) 2. quod vas fibris nervosis contextum nimis replendo distendit; eo obstructio, plethora, cacochymia abundans, auctusque motus circularis, spectant. 3. quod vi distrahit, ut luxatio, tumor, vis externa. 4. omne vulnerans, & rodens.

225. Inde doloris (220.) in vulnere (145.) causa multiplex (224.) cognoscitur.

226. Et effectus, inquit, iactatio, vigilia, febris, calor, sitis, siccitas, convulsio, gangræna, intelliguntur.

227. Tum anodynæ diuersitas, pro varietate causæ, scitur.

228. Doloris causa tollitur ergo 1. laxata

ipsa nervi læsi (163. 164. 165. 183. 184.) conditio, siue euacuatio cruoris nimia prægressa.

233. Quin & effectus eius, perturbatio omnium actionum, cognoscitur.

234. Sanatur. 1. ablato irritante (186.) arte chirurgi. (187. 188.) 2. acri lenito, vel dissipato. 3. sublata nervi conditione (232.) per remedia (228. 229.) descripta. 4. repletionem per lenem, amicum, liquidum alimentum assiduo parca copia ingestum. 5. sedata simul hæmorrhagia (218. 219.).

235. Tumor, & inflammatio levis vulneri bona; si augmentur, mala: balnea, fustus, anodyna, antispastica, loco læso, & toti applicata ægro, profunt: de quibus in historia & curatione inflammationis.

236. Sanguis in caua corporis per vulnus delapsus inde occlusus educendus situ corporis, suctu per fistulam, si recens, vel dilutus primo, apertura vulneris dilatata, vel noua.

237. Si vulnus inter firmas partes corporis descendit, via paranda fordibus pressione, lotionem, ligatura, apertura vulneris noua, vel dilatata.

238. Dilatatio fit cultro, linteis carptis, spon-



spongia, radice gentianæ & fimilibus fic-
cis immixtis, filo alligato, absorbtu hu-
moris tumentibus, ficque dilatantibus.



CONTRA CONVULSIONES.

SECT. 234. N. 2.

Vid. 66. 88.

SECT. 234. N. 4.

Tale est ius carniū recentium.

SECT. 235.

Antispasmodica.

1. Laxantia.
2. Diluentia.
3. Resoluentia.
4. Aborbentia.
- Lapis cancerorum.
- Margarita.
- Ebur.
- Cornu cerui.
- Sanguis hirci.
- Dens apri.
- Vngula alcis, &c. §. 66. N. 5.
5. Opiata. §. 202.

SECT. 236.

Diluitur cruor coagulatus, extrauafatus, his, vel fini-
libus.

Rec. *Mell. commun.* vnc. ij.
Sapon. Vener. drach. ij.
Sal marin. drach. iv.
Aq. pluuie vnc. xij. M.

Rec.



Rec. *Sal ammoniac.*
nitri ana drach. iij.
Vrinæ recent. sani vnc. xij.
Mell. commun. vnc. ij. M.

Rec. *Aloes in aqua solutæ, a fœcibus resinosis rite depurata, iterum leniter inspissatæ, drach. iv.*
Ammoniacy salis drach. ij.
Boracy drach. ij.
Mellis puri vnc. ij.
Aq. pluuiæ vnc. ix.
Vini Gallici albi, vnc. ij. M.

Horum tepefactorum prudens iniectio, lenis dein in loco cum sanguine ibi stagnante conquassatio, diluit, resoluit, a putredine præseruat, egressum parat: vnde summus horum vsus, vbi cruor extra vasa elapsus, in magnis cauitatibus stagnat, coit.

VVLNERA CAPITIS.

239. **V**ulnera capitis lædunt vel sola externa communia; vel perio-steum; vel cranium; vel duram matrem; vel piam simul; vel cerebri vasa, substantiam, corticem, medullam, ventriculos.

240. Sola externa læsa, scitur 1. ex causa vulnerante, eius figura lædente. 2. vi eius parua. 3. loci vulnerati conditione, quoad figuram imprimis. 4. leuitate symptomatum. 5. conspectu. 6. specillo.

241. Hæc (240.) licet leuia videantur, sæpe

sæpe ex propinquitate musculorum, tendinum, futurarum, periostei, cranii, nervorum, vasorum, cerebri, periculosa fiunt; tum quoque a vi contractili partis læsa.

242. Maxime, si contusio simul adest.

243. Aut, si sub parua apertura lata læsio sordes colligit.

244. Collecta enim materies (242. 243.) miros tumores, erysipelas, œdema, dolores, convulsiones, ossis & periostei putredines, febres, mortem, creat: aër caua alluens, incaute appositu emplastro-
rum ibi coercitus, impressus, mira emphysemata facit.

245. Si sola ergo integumenta læsa sine dictis (241. 242. 243. 244.), facilis sanatio per ligaturam idoneam, & curationem descriptam ab (183. ad 239.), licet sæpe appareant maxima: inprimis vero iuuat recens esse, dum incipit curari, rite vniri, raro deligari, & citissime, atque defendi cum cura a nimium humidis, aut laxantibus, & oleosis, ipsoque aëre.

246. Si adsint vero descripta (241.), vtendum remediis variis (183. ad 239.), pro varietate partis affectæ (241.), & mali.

247. Con-

247. Contusa hic (242.) rite digerenda his, quæ dissipare possint, vel suppurare, modo eligantur semper ea, quæ bona nervis membranisque (204. 207. 245.), aut excindenda sunt.

248. Si adsit malum (244.), dilatare cultro, & depurare opus (238. 207. 208.).

249. Pericranio læso, vt nudet diu os, vel vt putrefiat, os priuatur vasis periostei, adeoque & suis, stagnat in his liquor, putrefactus squamam separat, vnde os flauum, fuscum, nigrum, tandem foliolum deponit.

250. Cuius causa (249.) interrupta vaforum continuitas, frigusue aëris constringens, & exsiccans fines vasculorum in osse; falso accusata eius malignitate.

251. Effectus vero, augmentum malorum (249.).

252. Curatio fit. 1. os leuiter parua te-
rebra diuersis, vicinisque, locis, vsque ad
medium perforando, vnde exfoliatio ca-
uetur, periosteum inde renascitur. 2. in-
de arcendo pus, faniem, pinguia, aquea,
aërem, applicatis plumaceolis sp. vin. ma-
stichino imbutis. 3. raro, & citissime de-
ligando.

253. Qua arte ex punctis fodicatis (252.) & vndique, emergit noua substantia quasi carnea cito, tumque reliqua (249.) sanantur, vt dictum, (245. 246. 247. 248.).

254. Si caluaria læsa est, pro varietate causæ, fissæ, fractæ, contusa, intropressa, vel euulso fragmento spoliata erit, atque hæc vel in vna, vel in vtraque eius tabula.

255. Sic affecta (254.) scitur 1. causa vulneris forti. 2. vulneris magnitudine collata figuræ loci vulnerati. 3. specillo. 4. atramento affuso. 5. strepitu inter mordendum. 6. visu fracti, contusi, vel punctis pallidis colorati cranii. 7. tactu ipso. 8. symptomatibus integumentorum; carne circa septimam diem abscedente, dolore, natura puris tenui, & graueolente, vulneris malignitate aliena.

256. Effectus huius mali (254.) 1. partis osseæ separata mors. (249. 250. 251.) 2. infectio vicinorum. 3. hinc sæpe totius ossis infecti putrefactio. 4. caries diploes. 5. integumentorum cranii & cerebri corruptio. 6. inde mala affecti cerebri, conuulsio, sopor, paralyfis, apoplexia, mors.

257. Ex

257. Ex quibus (254. 255. 256.) & cōgnitio, & prædictio huius morbi noscuntur.

258. Et indicatur ad curationem 1. loci læsi detectio. 2. mundatio. 3. terebratio ossis. 4. eius periostei regeneratio. 5. reliqui vulneris sanatio.

259. Locus detegitur. 1. incidendo tegumenta læsa per scalpellum recta, angulosa, perpendiculari, decussata sectione, in os vsque impressa, caute in fractis & vacillantibus fragmentis, varia electa pro varietate loci, & mali. 2. separando secta a cranio exacte per scalprum. 3. infarctu carpti lintei.

260. Cruor, pus, sanies, sordes, spongiolis absorbentur; fragmenta, festucæ, squamæ ossis, si parua, libera ab omni membrana, oculo mox patentia, sunt, eximuntur vossella; vel soluuntur forfice; quæ mundatio artificialis.

261. Eadem nimis magna, hærentia viuis, abscondita, relinquuntur, nam vel sponte separantur, vel recrescunt ad viua. Hæc mundatio naturalis.

262. Si os contusum, album, fuscum, liuidum, fissumue apparet, minutis hinc

H 2

inde

inde foraminulis perterebrandum, vt præscriptum (252.), ita enim viua exeunt, & mortua expellunt cito.

263. Quo ipso (262.) periostei regeneratio cita (252.).

264. Sanatio tum reliqui descripta est (245. 246. 247. 248. 253.).

265. Inde patet, cur angusta fissura periculosior sæpe, quam ingens cranii contusio (256.).

266. Et patet, hanc methodum (252. 262.) præferendam vstioni, scalpris, trepanis veterum in his malis (249. 254. 256. 262.).

267. Cranium in iunioribus intropressum, in adultioribus post fracturam intropressum, cerebrum premit; pro varietate loci pressi, pro varia magnitudine, profunditate, acutie, punctura prementis, producit hebetudines, sopores, vertigines, tininitus, caligines, deliria, vomitum bilis, dolores capitis, conuulsiones, paralyfes, lotii fœcumque spontaneum exitum, apoplexias, febres, mortem.

268. Quin & ipsum cerebrum ita læsum, corruptum hinc inflammatione, supura-

puratione, gangræna, fungo, hæmorrhagia, similia mala (267.) parit.

269. Id vitii (267.) noscitur tactu, visu, ablatis integumentis (259.).

270. Ablatio pungentis, restitutio prementis in statum naturalem, conseruatio huius status, sufficiunt curationi.

271. Ergo detectum cranium (259.) molle in pueris, emplastro tenaci eleuatur; in adultis, si firmum, eleuatorio attollitur; si vacillans terebram non sustinet, perforanda iuxta fracturam caluaria, vt vecti possit attolli impressum vacillans; iuuat sternutatio, & animæ retentio.

272. In situ tenetur cauendo pressio-
nem externam apta deligatione.

273. Fisso, fracto, contusoue cranio, si arteriæ, venæ, lymphatica vasa sub cranio rupta effuderint suos humores, hi pre-
mendo cerebrum producant mala (267.),
tum putrescendo in pus, ichoremue, infi-
ciunt tenerrima vicina cerebri, vnde rur-
sum similia. Hæc vasa ex cranio in du-
ram, ex hac in piam, inde in cerebrum,
sinus, ventriculos decurrentia variis locis
varia periculo & sanatione damna produ-
cunt.

274. Concussus validus capitis, integro sæpé cranio, eadem (273.) facit rumpendo, comprimendo.

275. Cognoscuntur mala hæc (273. 274.) ex nota causa; eius impetu; loco excipiente; vomitu bilioso; visu, auditu, olfactu, gustu, tactu minutis, depravatis, sublatis; vertigine, caligine, lapsu; sopore, stertore; resolutione; convulsione; delirio; lethargo; apoplexia; horripilatione; febre geminata; cruore per os, nares, aures effluente; rubore faciei & oculorum.

276. Quis vero locus intra cranium sit læsus scitur. 1. ex sensibilibus externis (249. 254. 255. 256. 262. 267. 269.), si adsunt. 2. inuento loco cranii læso (255.) per artem. 3. ex tumore & rubore cutis capillis orbæ ad applicationem emplastri. 4. ex motu spontaneo manus ad certam capitis partem. 5. ex symptomatibus lateris vnius paralytici, alterius convulsi.

277. Tum. 1. cruor effusus ilico tollendus. 2. loca infecta depuranda. 3. officula forte infixæ cerebro euellenda.

278. Extrauasatus sanguis aufertur. 1. resorbendo. 2. dissipando. 3. perforando cranium.

279. Re-

279. Resorbetur, si in venas, largo missu sanguinis, & succenturiata purgatione alui, euacuatus, vi vitæ repellitur.

280. Hinc statim ad maximam copiam, ægro tolerabilem, vtraque hæc euacuatio instituenda (279.), &, si iuuat, pro re nata repetenda, iterumque, si post has administratas minuuntur symptomata. (273. 274.).

281. Dissipatio attenuati perficitur. 1. resorbendo (279. 280.) partem dissipandi. 2. attenuando per diluentia aquosa, & resoluentia calide pota. 3. parti affectæ rarsæ imponendo emplastra, cataplasmata, fomenta, ex discutientibus neruinis, cephalicisque. 4. auribus, naribusque eadem applicando.

282. Quæ (279. 280. 281.) si statim non tollunt, minuuntur valde symptomata (273. 274.), sed hæc vel persistunt, vel augentur, illico perforandum cranium, ut exitus detur humoribus (273. 277. 1^o.) & facultas depurationi (277. 2^o.), & euulsioni fragmentorum (277. 3^o.).

283. Locus, vbi terebra applicanda, cognoscitur. 1. ex loco læsionis noto (276.) vbi optime fit, si nihil vetat.

284. Vetat 1. futura. 2. musculi plurimi. 3. cauitates ossis frontis. 4. arteria maior ossi inserta. 5. inferior situs loci. 6. vacillatio fracti, contusi, cariosi ossis. 7. inæqualitas eminentis & excauati iterum cranii.

285. Tum, qui læso cognito (276.) proximus, applicandæ terebræ locus optimus est.

286. Quin, vrgentibus symptomatibus (273. 275.), licet nullus locus certo inueniri queat (276.), tamen trepanum applicandum & ab vna, & ab altera, parte cranii in finem descriptum (277.).

287. Inuento loco (276. 283. 284. 285. 286.), abrafo capillitio, inciduntur integumenta (259.), separantur a cranio, eleuantur labia, ficcatur os, tegitur carptis linteis, sistitur cruor (218.), lenitur dolor (227. 228. 229.), prohibetur inflammatio (235.), & si non vrget valde malum, rite facta deligatione in diem sequentem relinquitur apparatus.

288. Tum capite firmato, auribus obturatis, aëre calefacto, deterfo ossi terebra cum stylo applicatur, æquabili, æqualiter & modice acta, fronti supposita, terebratione

tione agitur, donec vestigium rite sit impressum.

289. Exemto tunc stylo pergitur, terebra lente adaëta, scobe assiduo erasa, donec cruor erumpens, ossis mollities, mutatio soni diploen attactam doceat; quæ sæpe non præsens frustra expectatur.

290. Eloto tum cruore, & per alcohol calidum compresso, exemta accurate scobe, summa cum cautela, lente, patienter, vno alteroue gyro tantum agendus modiolus, assiduo euerrenda scobs, perpetuo inspiciendum, an color in circulo exarato mutetur, assiduo exploranda fundi æquabilitas, tum variata pressione terebræ, pro vario colore apparente, os soluitur eo usque, vt parum adhærescat & æqualiter.

291. Vbi color cærulescens; eius per totum ambitum æqualitas, segmenti vacillatio docent, fere perforatum esse cranium, segmentum vecte, cochlea, vel cochleari eximendum.

292. Dein asperitas lateralis ossis radenda lenticulari cultello, scobs demenda, via paranda cruori & fordibus exituris per sternutationem animæ retentionem,

& depressorium prudentissime & raro, foramen implendum tegendumque tenui, molli linteo imbuto medela membranis amica, & apta lamella plumbi ansata.

293. Curatur dein vt vulnus membranæ (185. ad 239.).

294. Ita enim intra 40 & 50. dies separati sunt margines ossei foraminis; quotidie enascitur caro cauum replens, quæ sensim durior, tandem calli ossei, cauati, vel eminentis formam adipiscitur: vbi debilitas & dolor aliquis remanent.

295. Inflammatio, suppuratio, gangræna, fungus excrescens raro membranarum, & ipsius etiam corticis inprimis cerebri, tolluntur remediis, quæ his malis propria, tum applicatione antiphlogisticorum, detergentium, antisepticorum, filo, & lamella plumbea (292.). Cæterum malignitas vulnerum capitis censetur 1. loco. in occipite, vertice, pariete, futuris, pessima. 2. symptomatibus. febris post septimam cum frigore, tremore, vulnere pallido, arido, liuido, osse aspero, flauo, hemiplegia, conuulsione. 3. ætate. 4. temperie. 5. tempestate anni. 6. malignitate impuri, putrisque aëris.

296. Si

296. Si cruor, pus, fordes sub membrana latentes deprehenduntur post perforatum cranium, audacter incidenda, per-tundendaue erit membrana coercens.

IN CAPITIS VVLNERIBVS.

SECT. 247.

Ad contusa digerenda.

Valent, quæ attenuant, diluunt, a putredine seruant.

1. *Imponatur vnguent. hoc plumaceolis exceptum.*

Rec. *Terebinth. vnc. ij.*

Vitelli ouor. N. i.

Exacte mistis admisce

Vnguent. basilici vnc. ij.

Aloes puræ drach. iv.

2. *Huic superponatur emplastrum hoc*

Rec *Gumm. galban. depurati, & dein cum oui vitello subacti, vnc. iv.*

Ceræ citrin. vnc. ij.

Ol. hyperici drach. iij. M.

3. *Tandem huic apparatusui superadde hoc fomentum panis laneis calidis exceptum, expressum, quantum ferri potest calidissime adplicatum.*

Rec. *Fol. recent. rutæ,*

scordii, ana m. ij.

Flor. centaury. min.

sambuci,

rosarum, ana vnc. iij.

Cum aq. decoct. & express. *vnc. xxx. admisce*

Sp. vin. vnc. v.

Sapon. vener. drach. ij.

SECT.



SECT. 252. N. 2.

Rec. *Spir. vini semel rectificat.* vnc. j.

Aq. stillat. rosar. vnc. fs.

Mastiches puluerisat. drach. iij.

In phiala alta coctum serua vsui.

SECT. 279.

Purgatio hic conduens,

Aquam purgans, nec acriter tamen irritans.

*Rec. *Scammon. Syriac. pur. gr.* xiv.

Sp. reginae Hungariae drach. ij.

In mortario vitreo S. A. tritis, & a face separatis, admiſce

Syrup. rosar. solut. cum fenna drach. vj. F. Hau-
stus.

Rec. *Radic. jalapp. pulv.* drach. j.

Sacchari puri drach. ij.

In mortario vitreo diu tritis admiſce sensim, & diuifim,

Aq. pluuiæ vnc. iij.

F. emulſio S. A. cui dein affunde

Syrup. Rbei vnc. fs.

F. Haustus.

SECT. 281. N. 2.

Attenuans, diluens, aquosum, hic bonum.

Rec. *Lign. Santal. alb.* vnc. fs.

citrini vnc. j.

sassafras vnc. fs.

Folia rutæ m. fs.

agrimoni. m. j.

Flor. stæchad. Arab.

Lauendul. ana drach. ij.

Rad. fœniculi,

petroselini,

rusci, ana vnc. j.

Cum.

Cum aq. decoct. vase clauso spatio $\frac{1}{4}$ horæ lib. iv. exhibe.
Sumat vnc. ij. omni semiborio, sorbendo.

SECT. 281. N. 3.

Vid. 247. N. 2. 3.

SECT. 295.

De his remediis singulatim in historia horum morborum.

VVLNERA THORACIS.

297. **V**ulnera Thoraci inflicta, nec in caua penetrantia, cognoscuntur adspectu, stylo, aëre nulla arte exiliente, iniectæ tepidæ repulsi, corporis situ, vt in accepto vulnere, eodem, signis certis adnati pulmonis ad illum locum pleura, quem transit ictus.

298. Si obliqua descendunt illa (297.) supra, vel intra costas, sæpe dein pleura erosa in caua Thoracis pus deponunt, maxime, si puri ad externa egressuro via quacunq; arte impeditur. Tumque Empyema fit, & inde multa mala.

299. Quare in curatione abstinendum ab omni turunda, emplasticis, compri-
 mentibus; contra depurantibus, balsamicis,

micis, plumaceolis, leui ligatura vten-
dum & situ corporis apto.

300. In caua Pectoris adire scimus 1. considerata causa cum amplitudine vul-
neris. 2. Specillo corpori, in situm vul-
nerandi reposito, applicato. 3. Aëris in
pulmonem inspiratu forti, dum clausum
vulnus, mox naribus & ore clausis nixu
expirantis edito, tumque detecto subito
vulnerē, expiratione, & saepe sono eius
agitati in cauo pectoris. 4. Iniectione. 5.
Emphysemate, quando aër thoracis ca-
uo contentus; pertusi pulmonis actione
assidue auctus; calefactus; rarescens;
pressus inspiratu; exire impeditus libere
ex vulnere; in labiis vulneris actus per
membranam cellulosam; auctus; facit vt
sape totus homo, hinc inde ad ii. polli-
ces, tumore pellucido, leui tumeat; solis
plantis pedum; manuumque volis exce-
ptis. Ac. reg. Sc. 1713. hist. p. 15. 18. Item
4. 14. & 119. 120. vbi emphysema lethale
a costis fractis illæsa cute. 6. cruoris spu-
mosi exitu.

301. Effectus talis vulneris saepe. 1. aë-
ris ingressi pressio in pulmonem, respira-
tioni hinc, & circulationi ineptum. 2. Ef-
fusus

fusus cruor in Thoracem, & accumulatus. 3. eius extrauafati, calefacti, moti, clausi vndique, putrefactio. 4. hinc pleuræ, pulmonum, mediastini, diaphragmatis, pericardii maceratio, erosio, corruptio, fætor. 5. infiniti ex his oriundi morbi. 6. cruoris excreatio.

302. Effusi hic cruoris signa. 1. orthopnea. 2. decubitus in dorsum commodior, in latus læsum difficilis, in sanum impossibilis. 3. sequelæ descriptæ (301.) 4. pondus in septo. 5. fluctuatio materiæ. 6. natura, & situs, vulneris inflicti. 7. debilitas ingens, cum pallore, sudore frigido. 8. omnium fere symptomatum incrementum perpetuum.

303. Estque tum illico educendus. 1. situ, motu, nixuque corporis. 2. suctu per tubum flexilem, ad latera perforatum, obtusum ad finem. 3. iniectu liquoris diluentis, resoluentis, depurantis. 4. dilatione vulneris. 5. alia apertura inter secundam & tertiam costam veram inferiorem, ad distantiam quatuor digitorum a vertebriis, & ab angulo inferiori omoplatæ, facta instrumento secante, sectione costis parallela, inter has media, deorsum directæ acie.

304.

304. Si nullis distenduntur turundis, raro deteguntur, aër arcetur, fuctu artificiofo, & nixu refpirationis debito expellitur aër admiſſus, frigus caute vitatur, breui & optime fanantur, ſi curabilia ſunt.

305. Tumque præcauentur omnia illa & ſæua ſymptomata (301.).

CONTRA VVLNERA THORACIS.

SECT. 303. N. 3.

Vid. 236.

VVLNERA ABDOMINIS.

306. **A**bdominis vulnera non penetrantia in cavitatem noſcuntur. 1. ſtylo, & ſitu. 2. iniectu. 3. cauſa vulnerante cognita, & natura vulneris.

307. Si profunde fere uſque ad peritonæum penetrauerint, debilitatis ibi tegumentis, herniæ occaſionem præbent in corpore robuſto. Peius nihil, quam, ſi oblique decurrentia inter integumenta abdominis fiſtuſoſa vulnera effecerint.

308. Quare futura, ligaturaque his propiciendum: in cæteris curatio communis vulnerum ſufficit.

309. At

309. At eadem in cauitatem abdominis ire liquet. 1. stylo, & situ, 2. iniectu, 3. causa vulnerante cognita, & natura vulneris. 4. egressu contentorum.

310. Si tum omnia symptomata leuia, dolor, febris, inflammatio absunt, posito in vulnus ægro cruor non exit, iniectus liquor immutatus redit, interiora illæsa scimus.

311. Ilico arcendus aer, ingressus suctu & exspirationis nixu excludendus; gastroraphia consuenda integumenta, turundæ auferendæ: balsami illitu, decubitu in vulnus, quiete corporis, victu leni, humido, parco, rara deligatione percurabitur.

312. Si acutus dolor, febris, inflammationis signa, cruor, ichor, potus, cibus, chylus; bilis, pus, vrina, stercus, fœtor, ex vulnere exeuntia, causa vulnerans, situs & natura vulneris, pallor, fudor frigidus, inquietudo, animi deliquia, pulsus defectus, præsentia considerantur, docebunt, læsa vasa vel viscera abdominalia, & quæ.

313. Tum infinita mala sequuntur, partim 1. a natura viscerum, tenui vasculosa, non musculosa, difficillimæ circulationis,

I

nec

nec nisi clauso abdomine absoluendæ. 2. a functione læsa visceris. 3. ab effusi cruoris copia, corruptione. 4. ab aëris ingressi, rarefacti, prementis, actione.

314. Vnde lethalia sæpe sunt. At intestina læsa, & pertractationi oblata, confluenda, si magnis; sibi relinquenda, si paruis vulneribus læsa sunt, & reliqua peragenda, vt (311.) dictum est.

315. Si per latum vulnus illæsum intestinum exit, fouetur animalibus viuis dissectis applicatis, vel fomento idoneo; reponatur; fiant reliqua, vt (311.)

316. Si per paruum exuens foramen, tumens flatu, inflammatu, fœce, reduci non possit; fotu, punctu, dilatatu vulneris, reponitur.

317. Si vulnere, suppuratione, gangræna, fistulæ intestinalis pars ablata est, pars superior se offerens, vel prudenter adducta, assuenda foramini vulneris.

318. Si omentum exierit, & humidum calidum, rutilo sanguine rubescens adhuc est, reponendum, vt (316.)

319. Si siccum, frigidum, liuidum, ligatura, sectione, fotu, curatum reponendum est.

320. Mis-

320. Missio sanguinis largior, clysmata in initio iniecta si crassa illæsa, diæta, blanda respiratio, quies, situs, palmaria hic remedia.

CONTRA VVLNERA ABDOMINIS.

SECT. 315.

Fomentum idoneum hic.

Rec. Intestin. pur. animalis iunioris q. s.

Coq. in aq. q. s. spatio $\frac{1}{12}$ horæ; dein adde

Flor. chamæmel.

lauend.

centaur. ana. m. ss.

Fol. menth. m. j.

Stent deinde in infusione, per $\frac{1}{12}$ horæ.

Tum decoctum inferuiat pro fomento, cum pannis applicando.

Extemporaneum.

Sit lac recens tepidum.

SECT. 319.

Fotus.

Vid. 315.

SECT. 320.

Clyfma.

Rec. Mell. commun. vnc. iij.

Sal. maris drach. j.

Aq. decoct. bord. vnc. viij.

M. F. clyster.

Mane & vespere, primis tribus a vulneris igitur diebus, iniiciendus.

Diata sit ex solo iure carniū, cum pauxillo salis.

CONTUSA.

321. **S**i durum, obtusum, corpus motu, resistentia, morfu vel pressu, multa vascula simul confregit, læsio hæc contusio vocatur.

322. Cuius idea, accumulatio vulnusculorum cum attritu solidorum, & vasculorum.

323. Effectus ergo, solutio continui lacerans, destructio plurium conterens, effusio liquoris in inania vicina, vel facta, & infinita mala, quæ ex his sequi possunt. Contusis, fractisque costis emphysema lethale! mem. ac. r. sc. 1713. 119.

324. Pessimum vero ex his (323.), si, integumentis cohærentibus, interiora sic affecta (321. 322. 323.), vt liquida stagnent, coeant, putrescant, vnde ecchymosis, aneurisma spurium, fugillatio, vlcus, gangræna, caries, in glandulis scirrhus, cancer.

325. Lædit sæpe ossa, tumque sequuntur descripta (249. 250. 251. 256. 257.); & medullæ

dullæ læsio; vnde vlcera, fistulæ, caries, putredines; habet se enim medulla in ossibus, vt cerebrum in cranio (273. 274.)

326. Tum aliquando musculos, vnde validæ suppurationes, gangrænæ, paralyfes, contracturæ. Si autem magnos nervos, qui multos emittunt ramos, corrumpit contusio; tum paralyfis, atrophia, insensibilitas, atque certa fiet, nec curabilis vlla arte, gangræna inferiorum, quæ imprimis vera de spina dorsi, eiusque contenta medulla.

327. Imo sæpe ipsa viscera corrumpit; tumque horum inflammatio, suppuratio, gangræna, scirrhus, functio læsa.

328. Ex quibus (322. 323. 324. 325. 326. 327.) facilis est explicatio tot mirabilium & miserabilium malorum, quæ ex contusione (321.) sequi solent, prædici possunt, tam acuta, quam chronica, certe infinita.

329. Cognoscitur præsens, simulque detegitur affecta pars 1. conspectu, tactuque. 2. Effectu doloris, stuporis, grauitatis, coloris mutati in rubrum, fuscum, plumbeum, nigrum, flauum, viridem, hæmorrhagiæ, gangrænæ, (323. 324. 325. 326.

I 3

327.)

327.) 3. Comparatione causæ motæ, figuratæ, cum parte læsa.

330. Et bene scitur 1. internam, magnam nobilium viscerum contusionem curatu impossibilem, morborum causam & mortis esse. 2. ossium valde periculosam, curatu difficilem, imprimis circa iuncturas, & medullam. 3. Cranii pessimam, vt historia præmissa docuit, ob viciniam cerebri. 4. Glandularum maiorum, ad aures, axillas, mammas, pancreas, inguina, vterum, minitari scirrhos, canculos; & mala inde sequentia.

331. In curatione contusi semper tentanda resolutio, cauenda suppuratio, magis vero gangræna.

332. Resolutio fit, dum extrauasatum aufertur sine vltiori vasorum læsione.

333. Id autem contingit 1. id reddendo fluidum. 2. laxando vasa vicina. 3. agendo fluidum in vasa, ea euacuando, vel fricando.

334. Hinc larga missio sanguinis; mox data purgatio fortis, nec inflammans; fomentum penetrans, laxans, resoluens parti impositum; frictio calida ad partem; interna resoluentia, sudorifera, diuretica, profunt.

335.

335. Quorum ordo, repetendi necessitas, magnitudo requisita noscuntur ex (334.), & summo periculo.

336. Simul victus tenuissimus, minimeque putrescens, requiritur.

337. Si vero ob magnitudinem resolui non potest, & manibus accessus datur, scarificatio, apertura, suppuratio succedunt, simul actis, quæ dicta (334.) Si magnitudine mali pars iam mortua integre, aut & talis, vt inde certo præuideantur dolores intolerabiles, inflammationes, suppurationes, atrophix, febres, mors, extirpanda, si fieri potest (464. ad 475.)

338. Plura tamen methodus dicta (331. 332. 333. 334. 335.) præstat, quam credi fere possit, quum natura egregie separet sponte, attenuet, resoluat, dissipet, & expellat.

AD CONTVSA.

SECT. 334.

Purgatio fortis nec inflammans.

Rec. *Agarici* drach. ijs.

Sal. polychrest. scrup. j. M. F. P.

Rec. *Ebuli, vel sambuci, corticis medii, recent.* vnc. j.

Conterendo cum aq. pluui. deinde parum coquendo, tandem exprimendo, F. haustus vnc. iv.



- Rec. *Ialapp. pp. vt scēt.* 279.
 Rec. *Ialappæ radic. pulu.* drach. iſs.
 Rec. *Mechoacann. rad. pulu.* drach. ij.
 Rec. *Soldanellæ recentis fol.* vnc. j.
 Rec. *Agarici* drach. ij.
 Fol. ſennæ, drach. iij.
 Rad. Mechoacan. drach. j.
 Tamarind. vnc. ij.

Conſciſſa & contuſa macera in aq. pluuiæ ſpatio $\frac{1}{2}$ horæ,
 dein ebulliant, leniter, ſpatio $\frac{1}{8}$ horæ, tum decocti
 percolati vnc. ix. admiſce

Sal. prunel. drach. ſs.

Syrup. roſ. ſolut. cum ſenna, drach. ix.

Capiat. vnc. j. *omni ſemibora, donec purgetur ſatis for-*
titer.

Minori forma idem efficere.

- Rec. *Scamman. Syriac.* gr. xiiij.
 Srib. diaphoret. gr. xx.
 Syrup. roſar. ſolut. cum ſenna drach. vj.
 Exacte contritis admiſce
 Aq. ſtillat. cichorei vnc. ſs. F. hauſtus.

Fomentum ad Contuſa.

- Rec. *Rad. Bryon. alb.* vnc. ij.
 Ariſtoloeb. rotund. vnc. j.
 Fol. Rutæ recent.
 Sabinæ ana m. j.
 Flor. Tanacet.
 Chamæmel.
 Matricar. ana vnc. j.
 Cepar. recent. vnc. vj.

Cum aqua, vaſe clauſo, in gradu caloris fere ebullien-
 tis digere, per horæ dimidium, dein vno momento ebul-
 liant; tum ſucci per pannum fortiter expreſſi vnc. xxv. ad-
 miſce

Farin.



Farin. lini. vnc. fs.

Ebulliant denuo parum: tum toti decocto frigefacto
admisce

Sp. vini theriacal. vnc. ij.

Sal. ammon. vnc. j.

Applicetur pannis laneis.

Cataplasma ad Contusa.

Rec. Ingredientia eadem.

Præpara in cataplasma; sub finem admisce

Farin. lini q. s.

Galban. in vitello oui soluti, vnc. j.

Ol. chamæmel. vnc. fs.

Emplastrum ad eadem.

Rec. Rad. Bryon. in farinam redact. vnc. ij.

Flor. sulphur. vnc. j.

Mercur. nigr. drach. iij.

Galbani puri & s. a. soluti, vnc. iv.

Emplastr. de melilot. vnc. ix.

Ol. chamæmel. q. s. Vt F. Emplastrum.

Bona hic

Emplastra de galbano, seu ceratum matricale. vid. Anti-
dotar. correctius Gandauense.

- - - - *Baccis lauri Mesue.*

- - - - *Betonica,*

- - - - *Cumino.*

- - - - *Cephalicum.*

- - - - *Diachyl. cum gumm.*

- - - - *Diaphoreticum.*

- - - - *Ischiadicum.*

- - - - *de Meliloto.*

- - - - *Mucilaginis.*

- - - - *Oxycroceum.*

- - - - *de Ranis.*

- - - - *cum Mercurio.*

Resoluentia interna.

Vid. in §. 54. N. 4.

Sudorifera sunt.

1. Diluentia calida epota; §. 54. N. 4.
2. Resoluentia interna; §. 54. N. 4.
3. Stimulantia; §. 75. N. 5.
4. Laxantia; §. 35. N. 3.
5. Calor externus humidus ad cutim determinatus.

Diuretica sunt.

1. Diluentia frigida & tepida epota; §. 54. N. 4.
2. Resoluentia interna; §. 54. N. 4.
3. Stimulantia in primis salina, saponacea; §. 75. N. 5.
4. Laxantia; §. 35. N. 3. in primis fotu, clysinatè, renibus applicata.
5. Calor renibus, hypogastrio, perinæo, applicatus, frigore vero reliquo corpori simul dato, paulo magis solito.

SECT. 336.

Vid. 88. N. I. & 35. N. I.

OSSA FRACTA.

339. Si vnus Ossis partes vi a cohæsione soluuntur in magna fragmenta, fractura dicitur.

340. Quæ si sola, & vna, simplex; vbi multiplex, composita; si stipata vulnere, contusione, inflammatione, vlcere, pluribus fracturis, complicata vocatur.

341. Quin etiam pro vario situ fracturæ

ræ

ræ transuerfa, obliqua, longitudinalis audit; & ratione fragmentorum sibi innitentium, aut iuxta latera sibi mutuo applicatorum, vel eminente spina emergentium, varia nomina, naturam, medelam accipit.

342. Effectus eius varii, pro varia indole ossis fracti, pro modo fracturæ vario; pro varietate fragmentorum quoad situm, figuram, numerum, magnitudinem, pro varietate denique loci, in quo, vicinorum, circa quæ, fit.

343. Primarii ergo sunt destructio muneris fulciendi, sustinendi musculos & dirigendi eosdem; musculorum contractio, membri accurtatio, musculorum ex debito loco deturbatio, membri intorsio, eiusdem deformatio; periosteï externi, vasculorum cellulas occupantium, periosteï interni, membranæ medullofæ, medullæ ipsius laceratio, contusio, corruptio; luxuries vasculorum osseorum, vnde calli inæqualitas, tumor, membrique deformatio; membranarum, tendinum, neruorum distractio, laceratio, irritatio, compressio, conuulsio; Vasorum vicinorum mutatio, destructio, obstructio,

Etio, inflammatio, dolor, ecchymosis, marcor, suppuratio, gangræna, mors partis & sæpe totius; contusio fere semper.

344. Quæ expensâ (342. 343.) præsens malum, eiusque statum docent, si tactus fragmenta; auris crepitationem; oculus læsam figuram, immobilitatem; intellectus causam, eius impetum, modum impulsus, senii decrepiti, temperiei morbosæ, hybernique frigoris efficaciam simul considerauerit, clarior est diagnosi.

345. Verum oblongæ fracturæ difficilior detectio, nisi sero: dolor, tumor, crassities partis, inæqualitas, pus fœdum, causa fortis cognita, aliquid luminis dabunt.

346. Facilem, difficilem, tardam, celere, integram, vel deficientem fore curationem prædicit figura, simplicitas, compositio, duratio fracturæ, numerus, figura, magnitudo fragmentorum; locus ossis læsi; vicina læsa; tempus anni; ætas ægri & temperies.

347. Sanatio requirit:

1. Restitutionem in situm naturalem, extendendo, reponendo.
2. Retentionem in eo situ per fascias & machinas.
3. Vni-

3. Vnitorum, retentorumque consolidationem, enato callo.

348. Si fracta situm proprium retinent prima indicatio cessat.

Si parum diuergunt in latera, requiritur extensio parua.

Si omnino iuxta mutua latera pertracta sunt, requiritur ingens extensio, vt intercepta remoueantur, & vt debita longitudo & adaptatio fiant.

349. Extensio fit 1. apprehenso osse prope fracturam manu, vel laqueis. 2. firmato ægro. 3. disposita parte in situ naturali. 4. distractione lenta, recta, partium fractarum ea vi, eousque, prout vis contractorum muscutorum requirit. 5. vi & applicatu instrumentorum mechanico-
rum, si robur manus deficit.

350. Quæ (348. 349.) quum sine vi & dolore sæpe vix fieri queant, vbi partes iam inflammatae, sæpe omitti debent, donec sedata inflammatio. Aliter conuulsi moriuntur, vel gangræna correpti.

351. Si fragmenta libera, eximenda, si facile fieri queat. Si acumina eminentia extensionem plane prohibent, & patent, excindenda; si latent, incisione detegenda

genda prius. Si fractura composita valde & complicata, imprimis cum ingenti simul contusione, ossium contritu, vasorum magnorum destructione, requiritur illico, si nihil vetat, exstirpatio.

352. Restitutio fit partem rite extensam (349.), & paratam (351.), caute, lente, leniter ita intorquendo, donec os ossi debito in loco occurrat, musculi vero reuulsi suo in situ sint repositi, nihilque intercipiatur.

353. Id notescit ex anatomicis, compactione partis sanæ, dolore sublato, longitudine & figura naturali reddita.

354. Retentio in situ fit fasciis, spleniis, ferulis, canalibus quietem conciliando, tum impediendo & dirigendo actionem musculorum.

355. Fasciæ adstrictæ tumorem, suffocationem, gangrænam producant; unde infinita mala: ergo leuiter attrahendæ, vt firmare, & vascula leniter compescere, queant.

356. Si vulnera adsunt, curanda ex arte, (185. ad 239.) sed rara deligatione. idem de inflammatione, dolore, tumore, & reliquis symptomatibus intelligendum.

357. Tum

357. Tum fit concretio, callusque, citior, tardior pro ætate, ossis crassitie, pondere incubituro, vario tempore, intra 20 & 70 dies.

LVXATA.

358. **L**uxatio est recessus extremi ossis mobilis ex cauo, in quo naturaliter mouetur, cum motus impedimento.

359. Qui integer, vel pro parte: unde luxatio, & distortio.

360. Pessima, quæ epiphyssi ab corpore ossis soluta accidit.

361. Causa vis externa extendens, intorquens, expellens.

362. Aut interna, cauo innata, extrudens.

363. Hæ causæ (361. 362.) iuuantur extensis, laxatis, ruptis ligamentis, siue id ab externa, siue ab interna causa.

364. Hinc figuræ in parte mutatio, tumor, cavititas, elongatio, accurtatio membri, immobilitas, distractio musculorum, torpor subiacentium, paralyxis, vasorum vicinorum compressio, dolor, peruigilium, inflammatio, œdema, ancylosis, conuulsio, marcor, mors partis, vel & totius.

365.

365. Ex quibus notis signa euidentia habentur luxationis.

366. Et expensis magnitudine, figura, situ, parte pressa & intercepta, tempore durationis, concretione luxatorum, dolore, inflammatione, conuulsione, & reliquis symptomatibus, partibus ambientibus tenuioribus, crassioribus, ligamentis destructis, vel modo elongatis, musculis, annexis, & similibus, prognosis habetur, quæ doceat, an integra, an deficiens, celer, tarda, facilis, vel difficilis futura sit sanatio.

367. Ad quam requiritur 1. luxatorum redaptatio. 2. repositorum in suo loco ad sanationis finem retentio.

368. Repositio fit 1. firmando corpus ægri. 2. mouendo partem, vt directe respondeat suæ cavitati. 3. introducendo per intorsionem, trusionem, pulsationem.

369. Reposita in quiete retinentur quiete, fasciis, situ partis naturali.

INFLAMMATIO.

370. **I**nflammatiō, ignis, phlegmone, ob causæ, & effectum similitudinem, ab igne nomen habet.

371. Est-

371. Estque sanguinis rubri arteriosi in minimis canalibus stagnantis pressio & attritus a motu reliqui sanguinis moti, & per febrim fortius acti.

372. Quod ergo fieri potest vel in finibus arteriosis, vel in vasis serosis lymphaticis aliisque minoribus, arteriosis, dilatatis osculis admissos globos rubros, aut alia fluidi elementa crassa, per fines transmittere non potentibus. Si sanguis transfunditur in eas venas, quæ spiritibus accommodatæ, inflammationem excitat. Cels. 5.

373. Ergo eius sedes omnis pars corporis, in qua reticulares arteriarum distributiones, vel lymphaticorum arteriosorum ortus.

374. Hinc arteriæ ipsæ, venæ, nervi, membranæ, musculi, glandulæ, ossa, cartilagine, tendines, viscera omnia, adeoque totum fere corpus, sed nusquam frequentius & tenacius, quam in adipe.

375. Hanc stagnationem (371.) efficit in arteriis minimis i. quidquid premendo, distrahendo, intorquendo, rumpendo, contundendo, vrendo, erodendo, crispando, vasorum fines ita arctat in con-

K

cis,

cis, cylindricisue, vt diameter aperturæ fiat diametro sphæræ sanguinis minor. Calor, motus vehemens, infixa, ligaturæ, pondera incumbentia, acria ingesta vel applicata, frigus acre, frictio nimia, omnes causæ vulnerum, contusionum, erosionum, fracturarum, luxationum, obstructionum, huc pertinent.

376. Eandem producit 2. quidquid meatus obturat, acriaque applicat simul, siue intus, siue extus; vt oleosa salina, acria.

377. 3. Omnia, quæ sanguinem cogunt, vt coeat; motus nimius, deriuatio tenuioris partis ex sanguine per sudores, vrinas, saliuas, diarrhoeas; coagulantia.

378. Efficiunt eam in vasis lymphaticis arteriosis 1. omnes causæ, quæ initia horum latiora ampliant, ita vt in ea intrent partes sanguinis crassiores, quæ propulsæ vltcrius occurrunt angustis conuenientibus, vbi tum patiuntur eadem, quæ exposta (377.); talis est laxitas vasculi in suo principio, motus violentus liquidi arteriosi. 2. omnes causæ alteri inflammationi communes (375. 376.)

379. Vnde & similis morbus in omni vase

vase conico, vbi fluit ex lato in angusta liquor, obtinere potest; vt enim in sanguine rubra, sic in lymphā alia est forte pars crassior reliquis.

380. Ex quibus vera diuersitas phlegmones, erysipelatis, œdematis, scirrhi, cum inflammatione liquet.

381. Quoties autem causæ hæ (375. 376. 377. 378. 379.) produxere stagnationem hanc (371. 372. 379.) in vasis (372. 373. 374. 378. 379.), tum vis acti sanguinis a vita superstitie producit effectus quosdam, qui simul signa inflammationis.

382. 1. Arteriæ minutæ vixque visibiles obstructæ iam a sanguine distendente augentur: inde tumor ruber. 2. vasa lymphatica arteriosa, ante pellucida, & inuisibilia, eadem patiuntur; inde augmentum rubedinis præcipue, dum vasa tenerima, & vesiculæ, in panniculo adiposo, plena sanguine intruso, crasso, liquidiore parte orbato. 3. distenta vascula rupturæ propinquant in fibris minimis; inde dolor punctorius. 4. compinguntur valde liquida & solida; hinc durities, renixusque partis. 5. a rubro accumulato, & valido impulsu, rubedo splendens. 6. a re-

K 2

nixu,

nixu, pulsu, compactu, vasorumque adhuc meabilium angustatione a tumore obstructorum, attritus fit ingens partium liquidi inter se, in solidum, solidi in illas; inde calor, & æstus. 7. & quia pulsi a corde sanguinis impetus exceptus finibus vasis obstructi latera dilatat, fit pulsatio, 8. a fibris irritatis, & sanguine celerius per aperta acto, quia venis reuehitur, sed arteriis in multis prohibetur, acceleratur pulsus; fit febris, fitis, calor, vigiliæ, debilitas, molestia.

383. Hæc species (382.) est morbi nondum adulti.

384. Tum cruor emissus pleno saltu ex vena late aperta pelui exceptus, frigescentis format albam, duram, crassam, rigidam pellem, instar corii fere porcini.

385. Increcente malo, eadem adhuc (382. 383. 384.), sed aucta; separatur expressa lymp̃ha, densatur sanguis ruber.

386. Si humôr fluens blandus, motus eius sedatus, causâ obstruens non nimis solidata, obstructio parua, eaque inprimis in arteriis, vel in initiis lymphaticorum, canales mobiles, diluens vehiculum, reducto

ducto fluore concreti, motu stagnantis, soluitur inflammatio *resolviendo*.

387. Si humor fluens blandus, motus citatus, obstructio magna, nec resolui (386.) potens, actus symptomatibus (382. 384. 385.), vascula distenta rupta cum dolore, calore, pulsu, tumore, liquores suos effundunt, soluunt, putrefaciunt leuiter, solida tenera atterunt, soluunt, fluidis miscent in vnum similem album, spissum, glutinosum, pinguem humorem, pus dictum; hæc *suppuratio*, alter modus, quo terminatur inflammatio.

388. Si humor acer, valde motus, obstructio magna, vasa rigida, omnia symptomata (382. 386. 387.) magna, tum vascula subito rumpuntur, liquida putrescunt; ichor effusus sub epidermide in bullas colligitur instar loturæ carnis, vel saniei flauæ, cineritius, pallidus, fuscus, ater fit color; rubor, dolor, calor, pulsatio, tumor in loco affecto desinit, in vicinis obtinet; fit mors partis affectæ; vocatur *gangræna*; tertius modus, quo exit inflammatio.

389. Vbi sic affecto (388.) loco compressio externa accidit, vel calor ingens

humida dissipat, pars mortua instar arefacti corii durescit, inferiora suffocat, & corrumpit.

390. Frigida actu vel potentia, adstringentia, coagulantia, repellentia, pinguis acria, emplastica, narcotica, ligaturæ fortes, compressio externa, hanc mutationem inflammationis in gangrænam (388.) cito promouent.

391. Tumque in sphacelum augent.

392. Si pars inflammata glandulosa, calor internus externusue magnus, materies impacta inertior, crassior, emunctoria obstructa glandularum, folliculi verorum harum & latera distenta, fit tumor durus, indolens, glandulæ: vocatur *scirrhus*; quartus finis abeuntis inflammationis.

393. Causa, pars affecta, magnitudo, profunditas, velocitas, natura ægri, symptomata inflammationis, collata cum signis, effectibusque, prognosin absoluunt.

394. Perspicuum quoque pro vario statu mali varias esse curaturo indicationes.

395. Si enim aliqua causarum (375. 376. 377. 378. 379.) in parte quacunque (372. 373. 374. 379.) inflammationem (371.) pro-

produxit, vt adfint fymptomata (383. 384.) & conditiones primæ (386.), oriuntur hæ indicationes:

1. Impedire vlteriore vafculorum læfionem.
2. Eam, quæ iam facta, tollere.
3. Materiæ obftruenti fluiditatem, lenitatemque conciliare, conferuare.
4. Vel, fi id obtineri non poteft, retro-pulfum in vafa maiora agere.

396. Læfio vlterior impeditur:

1. Cauſas (375. 376. 377. 378. 379.) notas tollendo, corrigendo.
2. Impetum arterioſi ſanguinis minuendo, per eductionem ſanguinis, purgationem alui.
3. Copiam liquorum minuendo per eadem.
4. Reuellendo impetum ſanguinis in partes alias, ſuctu, frictu, epifpaſticis, veſicantibus, fomentis, balneis, fonticulis, ſeraceis, forti alui ſubductione.
5. Aëre ſubfrigido, ſicco; affectibus animi nullis, vel ſedatis; quiete naturali, vel artificiali, victu tenui, liquido, anti-phlogiſtico, potu ſimili, medicamentis diluentibus & refrigerantibus, ſimul.

6. Sedando impetum in ipso loco, applicatis refrigerantibus, repellentibus, adstringentibus externe, admistis anodynis, tum aperientibus, varia, pro re nata, mistura.

397. Læſio facta tollitur vſu eorundem (396.): nam diſtractione nimia laxata, propriâ fibræ viſ priſcam formam reſtituet, & nutritio vires reddet.

398. Materiæ obſtruenti conciliatur fluiditas, ſi illa attenuatur, ſi diluitur:

1. Vasis oſcillationes elastiſcas reſtituendo per imminutionem diſtendentis liquidi, miſſo ſanguine, purgatione multa; per ſtimulum additum fibris ope liquidi tenuis, aromatici, calide epoti; fomentis, friktionibus, cucurbitis, ſcarificationibus.
2. Noua liquida tenuia, aquoſa, calida potando, impacta diluendo.
3. Utendo attenuantibus, reſoluentibus, & oppoſitis genio obſtruentis, interne, externe, forma decocti, balnei, fotus, vaporis, cataplaſmatis, emplaſtri, vnguenti ſpecie.

399. Lenitas procuratur potu aquoſo, victu blando, medicina blanda diluente,
&

& obtundente, vel singularem dote acri specifico opposita.

400. Retropulsus fit:

1. Euacuatione magna liquidi arteriosi, venosique, missione sanguinis.
2. Laxatione fibrarum.
3. Frictione fibrarum.

401. Hinc intelligitur, quænam sit in omni morbo inflammatorio, interno, externo, illa, semper quærenda, resolutio; quæ sanatio perfecta; quæ sine crisi. (386.)



IN INFLAMMATIONE.

SECT. 396. N. 2.

Purgatio Antiphlogistica.

Cremor tartari. drach. vj.

CrySTALL. tart. drach. vj.

IpsE tartarus. drach. vj.

Sal. polychrest scrup. v.

Pulp. tamarind. vnc. iij.

Tamarindi. vnc. iv.

Rob. sambuc. vnc. iv.

Rhabarbari drach. ijs.

Rec. Rhei electi drach. j.

Sal. polychrest. scrup. ijs.

Syrup. cichor. cum rheo, vnc. j.

S. A. accurate contrita simul dilue in

Aq. stillarit. flor. Sambuc. vnc. ij.

Cinnamom. drach. ij. F. Haustus.

K 5

Rec.



Rec. *Tamarind. elect. pulp. vnc. ij.*

Crysell. tart. minutim puluerif. drach. iij. M.

Capiat omni $\frac{1}{8}$ horæ drach. j. donec commode purgetur.

Rec. *Fol. Senn. sue stipit. elect. drach. ij.*

Agarici optim. drach. j.

Tamarind. elect. vnc. ij.

Cum *aq. still. fl. samb. vase clauso decoque spatio $\frac{1}{4}$ horæ*, tum decocti per pannum expressi *vnc. v. admisce*

Nitri puri drach. j.

Syrup. rosar. solut. cum senna drach. vj. F. Haustus.

Rec. *Fol. sennæ drach. iij.*

Tamarind. vnc. ij.

Agarici drach. iij.

Cum *aq. decoct. spatio $\frac{1}{4}$ horæ, pint. i. admisce*

Syrup. cichor. cum rheo vnc. j.

Capiat vnc. j. omni semihora, donec purgetur.

Reliqua vid. §. 334.

SECT. 396. N. 4.

Epispastica.

Constant attrahentibus ad locum: §. 135. N. 4.

Deriuantibus eo: §. 135. N. 4.

Propellentibus ab illo: §. 135. N. 4. & §. 75. N. 5.

Vesicantia.

Vid. §. 75. N. 6.

SECT. 396. N. 5.

*Medicamentum diluens & refrigerans
simul, in hoc casu.*

Rec. *Rad. Acetosæ vnc. ij.*

Gramin.

Scorzoner. ana vnc. iij.

Fol.



Fol. Beccabung.
Acetosellæ,
Agrimôn. ana m. j.

Cum aq. decoct. spatio $\frac{1}{8}$ horæ, adde

Flor. Borragin.
Bugloss.
Rosar.
Violar. ana pug. j.

Stent in digestionē, vase clauso, spatio $\frac{1}{8}$ horæ, tum depu-
rati pint. iij. admisce

Nitri puri drach. ij.
Rob samb. vnc. iij.

Capiat vnc. iij. omni hora diei.

Rec. Aq. still. flor. sambuci vnc. xv.

Rob sambuci vnc. ij.
Nitri puri drach. j. M.

Capiat vnc. j. omni hora.

Rec. Semin. contus. Bardan. drach. iv.
Petroselinii drach. vj.
Cichorei vnc. j.

Cum Aq. stillat. petroselinii

F. Emulsio, cujus vnc. xij. admisce

Nitri puri drach. j.
Syrup. s. radic. aperient. vnc. j.

Capiat. vnc. j. omni hora.

Rec. Stibii diaphoret. non ablut. drach. j.

Lapid. prunell. drach. ss.
Rad. zedoar. scrup. j.

M. F. P. diuidendus in vj. dos.

Capiat vnam omni triberio ex prisana.

SECT. 398. N. 1.

*Liquidum tenue aromaticum, calide
potandum.*

Rec. *Ligni Santali albi,*
citrini,
rubr.

Rad. *Carolinæ ana vnc. j.*
Petroselin,
Fœniculi, ana vnc. iij.
Ononidis vnc. ij.

Cum aq. decoct. spatio $\frac{1}{2}$ horæ, adde

Ligni Sassafras rasæ vnc. ij.

Fol. *Betonie,*

Rutæ,

Scabiosæ,

Tussilaginis, ana m. j.

Stent in digestionem feruida, spatio $\frac{1}{2}$ horæ, clauso vase,
tum puri liquoris lib. v. exhibe.

Sorbeat omni hora vnc. ij. feruidas.

SECT. 398. N. 1. 2. 3.

Vid. §. 107. ad 144.

ABSCESSVS.

402. **S**i, his (395. 396. 397. 398. 399. 400.)
frustra, non, aut sero, paratis, in-
flammatio in suppurationem (387.) ver-
git, idque per signa, ibi (387.) posita, no-
tescit, indicationes erunt:

1. **Crudum** ocyus maturare in vnum hu-
morem.

2. **Idem,**

2. Idem, vt & vicina, emollire.
 3. Ad exteriora ducere.
 4. Puri cocto exitum conciliare.
 5. Mundare locum.
 6. Reliquum instar vulneris percurare.
403. Maturatio fit applicatione horum,

quæ

1. Motum in parte augment, fouendo, stimulando, calefaciendo per ea, quæ re ipsa, vel & virtute calefaciunt; in toto similia præstant, excitata febricula.
2. Excitatum motum, & calorem ad eum locum coercent, impediendo nimiam exhalationem & dissipationem per obturantia glutinosa, lenimen acrimoniæ nimæ.
3. Moderando motum totius fluidi vitalis, eiusque temperiem ita, vt nec torpeat, nec exciterur, nimis.
4. Relinquendo locum clausum, donec omne inflammatum irresolubile suppuratum sit. His enim causis bonum fiet pus in parte.

404. Nisi materies inflammata sic mutata, cum periculo, & sine profectu, aperitur abscessus.

405. Mollities partis, fluctuatio pressitumo-

tumoris, albitudo, remissio doloris, caloris, ruboris, tensionis, pulsus, febris, vertex mucronatus tumoris, grauitas dolori succedens, docent pus iam factum, atque exitui aptum esse.

406. Si tum relinquitur diu in loco clauso, attenuatur, acre fit, putrescit, auge-
tur, vicina consumit, erodit, mole, pon-
dere, & motu sinus, fistulasque creat, variis
locis varias, pessimas in intestino recto.
Aut dissipata parte tenuiori, reliquum du-
rescens tumores duros, maxime circa
glandulas, creat. Vel denique venis lym-
phaticis, aut sanguiferis per erosa oscula
impressum absorbetur, sanguini miscetur,
hunc inquinat, & collectum in visceribus
pessimis collectionibus ea corrumpit, ho-
rum functiones turbat, atque ita infinitos,
eosque grauiissimos, morbos efficit.

407. Iisdem auxiliis (403.) integu-
menta loci suppurati inferne & superne
emolliuntur, attenuantur, laxantur, vt &
vicina.


408. Quin & hac ope (407.) minuta
resistentia horum, per auxilia maturantia
(403.) pus factum extra pellitur, vel attra-
hitur foras.

409. Tum modice acria, emollientia, subpinguia mista simul applicentur, vt & mortua tegumenta facilius, & sine dolore aperiri queant.

410. Dein, pressò rite pure in assurgentem tumorem, parti albissimæ, molliissimæ, eminentiori, inferiori, intrudatur scalpellum, donec exiens pus fatis penetratum doceat, dein eleuetur æquabili sectione fursum lata plaga, aut per oppositam plagam cuspide acta, media integumenta dissecentur, vitatis fibris, vasisque: leniter mox exprimatur, & successiue, pus abundans; nec aëre, nec turundis, vexetur.

411. Denique curetur mundantibus, suppurantibus, digestiuis, balsamicis, detergiuis, exsiccantibus pro re nata, variatis, iuxta doctrinam vulnerum (192. ad 220.)

412. Si inanis metus ferrum repudiat, applicetur causticum parti (410.); eschara butyro separetur mollita; curatio fiat vt prius (410. 411.)



AD ABSCESSVS.

SECT. 403. N. 1. 2.

Maturantia in Pus.

- I. Gumm. aromatica simplicia.
Ammoniacum.

Bdel-



Bdellium.

Elemi.

Galbanum.

Opopanax.

Sagapenum,

2. Etmollientia, laxantia, humectantia, §. 54. N. 4.

Formula.

Rec. *Farin. fecalin.* vnc. iv.

Aceri drach. ij.

Gumm. galban. in vitello oui solut. vnc. j.

Cum aq. decoct. in cataplasma, adde sub finem

Ol. lil. alb. vnc. j. F. Cataplasma.

Rec. *Fol. Acerosf. recent.* m. iv.

Butyri insulsi vnc. j.

Ad ignem leniter decoctis parum, adde

Fermenti panis vnc. ij.

Gumm. sagapen. in vitello oui solut. drach. iv.

F. S. A. cataplasma.

Rec. *Mellis, ad spissitudinem paulo maiorem cocti,* vnc. iv.

Ceparum sub cineribus assatar. vnc. iij.

Ficum pinguium vnc. iv.

Cum pauxillo aq. S. A. decoct. in cataplasma, adde

Farin. lini vnc. iss. F. cataplasma.

Rec. *Auenæ excorticat.* vnc. j.

Farin. lini recentis vnc. ij.

Bulbor. lil. albor. vnc. iij.

Flor. althææ vnc. j.

Cum lacte recenti decoctis S. A. adde

Butyri insulsi vnc. ij. F. cataplasma.

SECT. 403. N. 3.

Vfus decocti §. 398. N. i. huic proposito
Morum excitat sufficientem.

SECT.



SECT. 409.

Rec. *Fermenti panis acris* vnc. ij.

Sapon. Vener. rasi drach. ij.

Mellis vnc. ss.

Ol. chamæmel. infus. drach. ij.

M. F. S. A. cataplasma.

Profunt & præscripta §. 403. N. 1. 2.

SECT. 412.

Rec. *Cinerum clauellar.* vnc. iv.

Calcis viua Leodiensis vnc. vj.

Contusa misce: dein in loco humido liquecant; filtra, inspissa; fusa, ad ignem validum in crucibulo, effunde in lapillos, caute in vase sicco bene obturato asseruandos.

Horum pauxillum abrasum, plumaceolo exceptum, applicetur spatio duarum horarum, dein applica, deverso priori, butyrum.

Butyri Antimonii pauxillum imponatur apici protuberantis apostematis.

Aut teneatur lapis infernalis eidem apici aliquamdiu applicatus.

FISTVLAE.

413. **H**inc sinuum, fistularumque origo, causa, natura, locus, effectus, intelliguntur (406.)

414. Aperti (413.) facile cognoscuntur; clausi cauitatis mollis tactu deteguntur.

415. Curantur dissecta parte inferiori,

L

im-

impletione caui per liquefacta digestiua pro re nata, iniectu deterfiuorum, ligatura sensim premente a fonte ad aperturam: sed citissime integumentis artificiose supra cannulam fossatam, filum argenteum, vel per syringotomon, dissectis.

416. Bubo, parotis, furunculus, anthrax, carbunculus, phyma, erysipelas, morbilli, variolæ, maculæ rubræ, hinc quoad cognitionem, prædictionem, curationem, sciuntur.

417. Nec difficulter hinc scitur euentus suppurationis internæ, ad quam artificis manui accessus non datur, magna quippe & multa mala (406.413.), & collectiones puris in caua corporis.

418. Si tum necessitas partis affectæ ad vitam, sanitatemue scitur, facile prævidentur futura, & curationis difficultas.

IN FISTVLIS CVRANDIS.

SECT. 415.

Digestiua liquefacta.

Rec. *Terebinth. narin.* vnc. ij.

Vitell. ouorum vnc. j.

S. A. subactis, admisce

Mellis commun. vnc. ij.

Sp.

Sp. Vini commun. drach. iv.

Aq. commun. vnc. iv.

Calefactum & probe mistum iniice.

Vel.

Rec. Balsami Arcaei.

Vitell. ouorum ana vnc. j.

Mista dilue in

Sp. vin. commun. vnc. viij.

Vsus, ut prioris.

Detersiva.

Rec. Mellis rosar. vnc. ij.

Elixir. propr. cum sale tartari pp. vnc. ss.

Lixiuii barbitonfor. vnc. viij. M.

Vel.

Rec. Rad. aristoloch. maior. vnc. ij.

Fol. sic. scordii vnc. j.

Baccar. iunip. contus. vnc. j.

*Cum sp. vini debili decoct. in phiala alta, spatio 1. horæ.
vnc. xx. admisce*

Sapon. Venet. vnc. j. Vsus, ut prioris.

Vbi pura fistula, hanc consolidat sequens

Iniectum.

Rec. Ol. infusi hyperici vnc. iv.

Aloes,

Myrrhæ,

Olibani, ana drach. ij.

Coquendo leniter, mista subige cum

Vitelli ouorum vnc. ij.

Dein, calefacta parum, in fistulam puram iniice.

GANGRÆNA.

419. Si inflammationi (371. 372.) gangræna (388.) succedit, alia curatio requiritur: vocatur autem gangræna ea partis mollis affectio, quæ, abolito influxu vitalis humoris in arterias, effluxu per venas, in mortem tendit; sed sphacelus ea, quæ iam in tota parte omnem vitalem actionem perfecta morte destruit, superstitæ vita in reliquis.

420. Gangræna ergo ut plurimum paniculum adiposum, sphacelus cuncta ad ossa usque inficit; illa præcedit, hic ut plurimum sequitur; nisi ab ossis corruptione, medullæ, vel periosteï originem duxerit: unde & apparet, singularis gangrænæ species, quæ sine febre, inflammatione, aut iactura caloris natiui, fit in partibus sub contusa medulla dorsi positis. (326.)

421. Ergo gangrænæ & sphaceli causa eadem, sed vi, duratione, loco diuersa.

422. Ideo 1°. omnia quæ inflammationem faciunt (375. 376. 377. 378. 379.), si liquida stægnent, & nifus in ea viui sanguinis magnus: eo pertinent æ. ligatura venarum,

narum, *ε*. compressio earum ab causa quacunque, ut tumore, &c. *γ*. frigus ingens, *δ*. prohibita perspiratio in phlegmone per adstringentia, emplastica, frigida, repercutientia, stupefacientia, maxime si interna acria, vel acria simul externis applicatis permista, *ε*. inflammatio interna, externa *ζ*. vulnerata, contusa, luxata, fracta, maxime si arcte constricta, *η*. oleosa acria sanis applicata, vel ægris, *θ*. decubitus, *ι*. herniæ suffocatae, & clausæ.

423. 2°. Quæ liquida acuunt, ut vascula exedant, destruantque, ut *α*. stagnatio clausi & calidi humoris diuturna, unde acrimonia (80.), corrosio, hinc cruor in aneurismate, pus in abscessu, aqua in cranio, thorace, abdomine, scroto &c. contusa & effusa in læsis. *ε*. mala, morbosa, acris temperies in toto peccans, & locum alluens; ut lymphæ diu fluens circa loca tendinosa, ichor canceri, fluor dysentericus, fluor hydropicus, materiæ febrilis, pestilentis, variolosæ, scorbuticæ fluxus ad carnem, imprimis ad gingivas.

424. 3°. Quæ mortem extremorum creant defectu vitalis influentiæ, ut quies senilis, debilitas summa, contusiones in-

gentes magnorum neruorum, spinæ dorsi, medullæ spinalis, magnorum gangliorum. (326. 421.)

425. 4°. Venena mirabilia.

426. Gangrænæ futuræ signa sunt causæ eius (422. 423. 424. 425.) præcognitæ.

427. At vero præsentis hæc: 1. phænomena inflammationis subito ablata sine correctione causæ, (confer. 382. 383. 385. cum 422. 423. 424. 425.) 2. sensus hebes. 3. color pallidior, cinereus, fuscus, liuidus, niger. 4. mollities, flacciditas, ad tactus vestigia non resurgens. 5. pustulæ ichore lymphatico subflauo, vel rubello plenæ in loco inflammato. 6. vbi a frigore, pruritus & punctura ingens, vna cum rubore intenso, quem breui nigritudo mortifera sequitur.

428. Sphacelus futurus scitur ex signis gangrænæ præsentis (427.) affiduo auctis.

429. Præsentis autem signa sunt. 1. gangræna exquisita prægressa. 2. sensus, motusque integre sublatis, vt pars scissa, puncta, vsta, vsque ad ipsa ossa, nihil sentiat, sed grauis modo sit. 3. color liuidus, fuscus, niger. 4. mollities, flacciditas, frigus, cutis separabilis, tandem siccitas, durities.

rities. 5. fœtor cadauerosus. 6. corruptio mortifera, profunda, omnia vicina depascens in ossa vsque.

430. Ingens in hoc morbo & velox discrimen præsentia vera exigit.

431. Quam veritatem dabit. 1. iusta consideratio ætatis, temperiei, morbi, virium, 2. velocitas mali, 3. causa interna vel externa cognita, 4. anni tempestas, 5. locus affectus, vt vitæ magis, minusve necessarius, vel prout humida, sinuosa, aut sicca temperie donatur.

432. Hinc regulæ:

A gangræna sphacelus.

A sphacelo mors partis, & vicinorum cito infectio.

Gangrænæ ilico succurrendum.

Sphacelus ilico extirpandus.

Gangræna cerebri, viscerum, vesicæ, lethalis, & in acutis cito mortis, partibus maioribus vix apparentibus læsis, causa.

Gangræna oris interni, labiorum, narium, genitalium, curatu difficilis.

Sphacelus extremorum, tendinosorum, lethalis in senio.

Gangræna hydropicis, phthificis, scorbuticis pessima, mortis nuncia.

L 4

Spha-

Sphacelus superiora petens, vigilias, deliria, syncopen, ructus, singultus, spasmos, dolores, sudorem frigidum, soporem creans, prænunciat mortem.

Liuiditas, nigritudo, ariditas circa vlcera, gangrænam, sphacelum, mortem, adesse nunciant.

433. Indicatio in gangræna curatione: 1. vires firmare. 2. putridi ingressum in venas impedire, 3. putredinem conceptam arcere, coercere.

434. Firmantur vires dando: 1. quæ causæ internæ (422. 423. 424. 425.) debellandæ profint, spiritus excitent, liquidis motum circularem conferuent, habita simul ratione ætatis, sexus, temperiei, tempestatis. Illa ergo ex classe refrigerantium, vel calefacientium petuntur pro re nata, 3. cibos potusque analepticos, 4. epithemata ex pane tosto cum præscriptis (Nº. 1. huius) applicata venis, vel circa nares.

435. Impeditur putrefacti in venas introitus, 1. firmando vires (434.), adeoque augendo motum ad exteriora, 2. curando exitum ad exteriora; fomenta, cataplasmata ex diaphoreticis, emollientibus,

bus, laxantibus, facta, scarificationes, cucurbitæ, hirudines id agunt, cum calore externo,

436. Putredo incipiens, corrigitur
1. tollendo eius causas sensibiles (422. 423.
424. 425.)

437. 2. Corrigendo eius causam proximam, stagnationem & calorem, α . con-
diendo stagnantia contra putredinem,
 ϵ . muniendo solida contra eandem, γ . sta-
gnantibus correctis per vasa munita con-
ciliando motum.

438. Condiuntur liquida applicatione
salis, aceti, vini, spirituum vini, aroma-
tum.

439. Iisdem (438.) seruantur solida in-
tacta.

440. Stagnantia deducuntur in mo-
tum: α . diluendo, aquosis affatim haustis
& applicatis; ϵ . stimulando arterias per
ea, quæ malo opposita; γ . mouendo li-
quida calore, frictione, cardiacis, δ . subla-
ta copia nimis distendente per missionem
sanguinis.

441. His (434. 435. 436. 437. 438. 439.
440.) cito applicatis, sæpe renouatis,
multoties incipiens gangræna felici cor-

rectione & diaphoresi benigne tollitur.

442. Si autem liquida iam putrefacta, horumque mobilissimæ partes exhalaerint, tum & canales destructi fuerint, malum non cedit his remediis, neque reddetur corruptæ parti sanitas, sed vicina multum destruentur motis, neque tamen exhalare potentibus, viuis.

443. Ideo totus scopus hoc casu (442.) separare mortuum a viuo.

444. Separatio hæc fit semper vi vitalis liquidi ruentis ad fines gangrænosa escharæ, ibidem suffocati, sicque in suppurationem (387.), acti, vnde soluuntur fibræ nectentes gangrænam parti sanæ.

445. Adeoque patet, in eo hædere artem, vt 1^o. fiant ea, quæ dicta (433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440.)

2^o. Vt acceleretur suppuratio.

3^o. Vt emolliatur eschara.

446. Vt suppuratio acceleretur, conducit scarificatio putrefacti vsque ad viuorum initia: sic enim, suffocatione nimia imminuta, loco serpentis gangrænæ fit abscessus, quo cutis & adeps gangrænosa plerumque a subiectis adhuc viuis separantur.

447.

447. Quo autem sanguis plus in hosce fines ruat, hirudines, cucurbitæ, & similia attrahentia sæpe applicata profunt.

448. Incisa (446.) pars calidis liquoribus, corruptioni resistentibus (438.), & duritiem escharæ (389.) emollientibus (403.), fouenda.

449. Partes pendulæ, emortuæ, solutæ, emollitæ escharæ tollendæ tenaculis, forfice.

450. Toti parti affectæ assiduo applicanda cataplasmata calida, & cum calore continuo sustentato agentia; quæ ex emollientibus, diaphoreticis, anodynis, consistunt.

451. Huc etiam plurimum facit rarior partis detectio, quam vulgo fieri solet.

452. Vbi, his (446. 447. 448. 449. 450. 451.) factis, eschara contrahi, scarificata humescere, margo sana tumere, rubere, suppurari, mortuum vacillare incipit, signum est, separationem fieri, subsistere serpens malum, breui purum futurum locum.


453. Tum lenia, anodyna, balsamica, digestiua applicanda sunt, raro detegendum vlcus est; omnia, quæ fibris rigiditatem

tatem dant, vitanda: quies parti danda; & porro instar vlceris malum pertractandum erit (411.)

454. Si ab impacto acri gelu gangræna (427. N^o. 6.), pars, niue imposita, vel impositis linteis aqua gelida humectatis, operienda erit, donec, spiculis frigoris in niuem vel aquam receptis, iterum solui incipiat, redeunte vita.

455. Aliter enim caloris applicatu pars putrescit, actis, nec eductis spiculis.

456. Eo autem peracto (454.), calidis refocillandus cardiacis, & in sudorem vsque calefaciendus æger est.



IN GANGRÆNA.

SECT. 434. N. I.

*Spiritus excitans in gangræna a causa calida,
temperie alcalina.*

Rec. Succ. rec. expressi citrei vnc. ij.

aurantior. vnc. j.

Syrup. recent. moror. vnc. ij.

Aq. stillat. citrei rarij vnc. iv.

melissæ vnc. ij.

cinnamomi vnc. j.

Vini Rhenani vnc. vj.

Addito, si opus, saccharo. M.

Bibat vnc. j. omni hora vel q̄ semi hora.

Vel.



Vel.

Rec. *Rob. ribesferum*,
berberis, ana vnc. ij.
Sp. salis drach. fs.
Aq. stillat. melissæ vnc. vj.
Vini Rhenani vnc. x. M

Capiat vnc. j. *omni bora.*

Si frigida laborat gangræna, temperies phlegmatica vel
 acida.

Rec. *Sal. vol. oleofi* drach. iij.
Elixir. propr. cum sale tartari pp. drach. ij.
Aq. stillat. vitæ Matthioli vnc. iij.
corticis citrei vnc. vj.
Syrup. s. rad. aperienz.
artemisiæ Fernellii ana vnc. j.
Confect. alkermes completæ drach. ij.
 M. *in usum eundem.*

SECT. 434. N. 2.

In temperie acida, §. 66. N. 1.2.
 alcalina, §. 88. N. 5.6.

SECT. 434. N. 3.

In casu alcalescente calido.

Rec. *Vini Rhenani* lib. j.
Cinnamom.
Caryophyllorum,
Fol. maceris,
Nucis myristicæ, ana drach. ij.

Coq. in phiala alta vitrea, in arena,
Hoc decocto imbue panem tostum.

In casu acido, frigido.

Rec. *Sal. vol. oleof.* vnc. fs.
Sp. cortic. citrei vnc. ij.

Sp. La-



Sp. Lauendulae,
Menthae, ana vnc. j.
Tberiacal. vnc. ij.

M. Arque hoc tostum panem imbue.

SECT. 435. N. 2.

Fomentum ad gangrenam.

Rec. Fol. recent. ruta m. iv.

Malua m. ij.

Alliaria m. j.

Farin. lini vnc. j.

Cum aq. decoct. vase clauso, lib. iv. admisce

Sapon. Vener. drach. ij.

F. Fomentum. Laneis pannis applicandum.

Rec. Aceti sambuci vnc. ij.

Aq. flor. sambuci vnc. x.

Salis Ammoniac. drach. ij.

Vini albi Gallici vnc. vj.

M. pro Fomento.

Cataplasma.

Rec. Flor. Sambuci,

Melilori,

Althæa,

Chamamel.

Calend. ana vnc. iij.

Cum aq. decoct. in cataplasma, adde sub finem,

Farinae lini vnc. j.

Ol. lini vnc. iis.

SECT. 438.

Condimentis talibus materiam præbent

Sal. Ammoniacus.

Borax.

Gem-



Gemmæ.

Nitri.

Maris.

Regeneratus residuus a destillatione Sp. sal. Ammon.

Acetum destillatum.

Calendulæ.

Dracunculi hortensis.

Lauendulæ.

Rosaceum.

Rutaceum.

Sambucinum.

Scilliticum.

Theriacale.

Sp. Nitri.

Salis.

Sulphuris per Campanam.

Vitrioli.

} simplex, vel, cum triplo alcoholis, dulcis.

Vina Rhenana inprimis.

Aromata hic fere propria.

Abrotanum.

Absinthium.

Alliaria.

Angelica.

Balsamita.

Carduus benedictus.

Centaureum minus.

Chamædrys.

Dictamnus Creticus.

Geranium Robertianum.

Lauendula.

Maiorana.

Marrubium album.

Myrtus.

Origanum.

Polium.

Pulegium.

Rosmarinus.

Ruta.

Sabina.

Salvia.

Scordium.

Tanacetum.

Thuya.

Rec.



Rec. *Fol. Ruta*,
Scordii,
Absinthii, ana vnc. iv.

Mentha vnc. j.

Cum *Aq. & aceti*. ana q. s. decoct. vase clauso, lib. iv.
 admisce

Sal. Gemma drach. iv.

Sp. vini theriac. vnc. ij. F. Fomentum.

Rec. *Eadem*.

Coq. in Cataplasma: sub finem addendo

Sal. Ammon. drach. iv.

Farin. lini vnc. ij.

Ol. infusi ruta vnc. iis.

F. cataplasma, tempore vsus irrorandum.

Sp. vini theriac. vel sp. vini campb. ranzillo.

SECT. 448.

Liquor talis.

Rec. *Aceti dra. unculi hortens.* vnc. vi.

rosac. vnc. ij.

Sp. vini theriacal. vnc. iv.

Sal. marini vnc. j.

Aq. decoct. scordii vnc. xij.

Eschara gangrenosa emollienda optima hec.

Rec. *Fol. Scord.* m. ij.

Mahua m. j.

Fl. Lauend.

Althæa ana vnc. j.

Cum *aceto decoct.* in cataplasma, admisce

Farin. lini vnc. iij.

Ol. lini vnc. j.

Sal. Ammon. drach. j.

Vnguentum Aureum. Basilicon.

SECT.

SECT. 450.

Cataplasmata tale.

Rec. Fol. rec. *Abrotan. mar.*

Absinth. Pontici,

Rutæ hortens.

Scordii,

Alliariæ,

Eupator. cannab.

Marrub. alb.

Nicotianæ, ana m. ss.

Hyoscyami m. j.

Flor. *Calthæ terrestr.*

Centaur. min.

Melilori,

Matricariæ,

Tanacet. ana vnc. ij.

Althææ,

Papau. errat. ana vnc. j.

Cum aq. decoct. vase clauso, spatio $\frac{1}{4}$ horæ, admisce

Farin. lini vnc. iv.

Ol. infus. rutæ. vnc. ij.

Aceri theriac.

Sp. vini theriac. ana vnc. j.

Sal. Ammon. drach. j.

SECT. 456.

Rec. *Aq. stillat. theriac. vnc. j.*

Prophylact. Syluii drach. vj.

Vita Matthiol. vnc. j.

Rutæ vnc. ix.

Syrup. Artemisi Fernelii,

Radic. s. aperient. ana vnc. iiss.

Elixir. propr. cum sale tartari pp. drach. ij. M.

*Capiat cochleare j. omni $\frac{1}{2}$ horæ: superbibendo vnc. unam
vel alteram sequentis.*

M

Rec

Rec. *Aq. decoct. bordei* pint. ij.
Vini Gallici pint. j.
Zingiber. puluerif. drach. ij.
Syrup. borryos vnc. iij. M.

SPHACELVS.

457. Si gangræna iam in sphacelum conuerfa, infectum auferendum.

458. Quæ ablatio diuerfa, prout pars vel tota, vel pro parte affecta, vel prout tota tolli non potest ob situm; vt nates &c.

459. Si ergo pars non vsque in fundum corrupta, aut extirpari nequit, conamur: 1. progressum impedire, 2. corruptum auferre.

460. Progressus tollitur, si communicatio mortui cum viuo aufertur.

461. Id fit, si in vicinia sani & mali limbes ponitur secando, vrendo, rodendo; isque vndequeque satis profundus.

462. Infectum separatur, si, impedito progressu (461.) prius, vel simul dum id fit, tota pars vsque in fundum sanum vritur, secatur, dein acri lixiuio calide applicato eroditur, donec in escharas, assiduo emolliendas (403.), & tollendas, vsque ad
viua

viua consumatur, eximatur. Vitatis summa cum cura viuis.

463. Vbi dein sanitatis & vitæ indicia redeunt, curandum vt vlcus, vulnusue.

464. Si vero pars extrema in os vsque sphacelata tolli potest, salua vita, vna cum osse ipso extirpanda erit; quia nudum vasis nutriri nequit, neque viuere potest.

465. Illa extirpatio in digitis, metacarpo, vel metatarso, cuneo peragitur, & malleo.

466. In maioribus vero, vt femore, crure, humero, brachio, eget operosiore molimine, quod intelligitur ex sequentibus.

467. Definitur locus, vbi extirpatio instituenda ex hisce:

1. Sanum maxime conseruandum.
2. Corruptum accuratissime simul & semel tollendum.
3. Vfus commodissimus parti superstiti procurandus.

468. Ergo in cæteris sectio fiat in sano prope ægrum (ob 467. N°. 1. 2.); in crure autem sub genu semper (ob 467. N°. 3.)

469. Ad amputationis administratio-

M 2

nem,

nem, & felicem successum intelligendum, attenditur:

1. Ad præparationem.
2. Actionem ipsam.
3. Curationem symptomatum.
4. Consolationem.
5. Supplementum amissorum.

Præparatio fit:

1. Compressu vasorum magnorum sanguiferorum arteriosorum per splenia applicata pyramidalia, & ligaturam torquendo adigendam super his in parte sana prope ægram.
2. Tractu valido & æquabili partium incidendarum ope ligaturæ ex corio fibulatae cum loris.
3. Firmatione cauta ægri, & partis amputandæ.
4. Moderato inflexu partis, ne nimis extensa secetur.
5. Narcotico cardiaco ipsi ægro exhibito.

470. Actio fit in parte præparata (469.)

1. Cultro acuto, forti, curuo, in dorso obtuso, bene temperato, fortiter per omnia ad os vsque adacto, æquabiliter & fortissimo applicatu ad os in orbem
cir-

circumactō, vt vna celeri sectione totum periosteum accurate discissum sit.

2. Si duplex in amputanda parte os, interstitia similiter minori, vtrunque acuto, cultello quam exactissime dissecando.
3. Dissecta (1. 2. huius) per ministros fortiter distrahendo, vt hiatus sit inter margines sectionis.
4. Serra acuta, subtili, forti, tensa, os secando, quæ agenda perpendiculari, forti, æquabili motu; incipiendo ab tenuioris dissectione, desinendo in crassissimum, si os duplex; ne vi ferræ in festucas fissum diffiliat debilius.
5. Ossa inter secandum per ministros artificiose flectendo, vt liber sit ferræ meatus.

471. Symptomatum, extirpationem frequentium, primarium hæmorrhagia semper ilico sistenda:

1. Vasis, iactu sanguinis deprehensis, apprehensis per tenacula elatere compressa, eductis, filo traiecto & circumducto arcte constrictis, si maiora sunt. Aut vas constringendo per filum acus

bus binis incuruis vtrimque ad latera vasis infixum.

2. Cauteriis ignitis applicatis.
3. Plumaceolis vitriolo imbutis ad vasa, absorbentibus alia ad loca applicatis.
4. Partes viuas, retrotractas (469. N^o. 2.) laxatas reducendo.
5. Vesicam circumponendo trunco, puluere adstringente refertam.
6. Ligatura firmante.
7. Somno, quiete, victu sollicitè procuratis.

472. Consolidatio fit in ossè, si cito curetur exfoliatio, & caueatur caries, quod fit, si ilico ei applicetur spleniolum sp. vini mastichino madidum.

473. In carne vero, vt in historia vulnerum dictum fuit (ab 189. 192. ad 210.)

474. Si ægro, sic truncato magnam partem (466. ad 471.), viscera chylopœa & hæmatopœa valida sunt, plethoræ effectus sæpe sequuntur (106.), quibus vt auferatur causa, missio sanguinis aliquoties, pro re nata, instituenda, & victus moderatus.

475. Amissi damnum facit imitatio artificialis perditæ, per fabricatas machinulas.

nulas. Vid. Aquapendentem, Hildanum, Solingen, Paræum.



AD SPHACELVM.

SECT. 462.

Acre lixiuium.

Rec. Calc. viu. ex saxis exustis, p. r.

Hanc tege

Cinerum clauellat. p. iij.

In loco subterraneo liquefacta, filtrataque, serua.

Aut & ipsa calx viuā, tenuiter in pollinem acta, inspergi poterit.

Sed & pulcherrimæ separationes fiunt, si escharæ mortuæ applicatu putrefacientis remedii mollitæ, in tabum solutæ, diffuentes a sana parte recedunt; dum interea viuæ partes fotu viuifico animantur. Vid. 435. N. 2.

SECT. 469. N. 5.

Rec. Ol. stillat. Cinnamom. gutt. ij.

Caryophyll. gutt. j.

Cort. Citrei gutt. ij.

Sacchari puri drach. ij.

F. S. A. Elæosaccharum, cui admisce

Corall. rubr. drach. j.

Laud. puri gr. ij.

M. F. Pulu. diuid. in ij. dof.

Capiat unam hora una ante actionem, & si nihil sopiuit, alteram $\frac{1}{4}$ horæ ante eandem.

SECT. 471. N. 5.

Rec. Sang. draconis drach. j.

Sarcocoll. drach. ij.

M 4

Lapid.

Lapid. hæmatit. drach. ss.

Bol. Armen. drach. viij.

M. F. Pulu. tenuissimus.

Rec. Farin. volatit. in molendinis, vel pistrinis, collectæ vnc. iv.

Colcothar. vitrioli fortiter exusti & edulcorati drach. ss. M. exacte.

Rec. Fungi Lycoperdi dicti bene maturi, atque siccissimi, collectum puluerem, cum vulnere insperge, mox aperti interiorem superficiem applica.

DE COMBVSTIONE.

476. Si ignis ardens, vel in feruido corpore latens, corpori nostro applicatur, oritur destructio vasculorum, extrauasatio humorum, pro varietate causæ, durationis, partis affectæ, varia.

477. Huius (476.) varietatis gradus varii similes sunt his, qui decurrunt a prima & leuissima inflammatione, (370. ad 464.) vsque in sæuissimum sphacelum.

478. Hinc phænomena, diagnosis, prognosis eadem.

479. Quin curatio nihil differt: potus antiphlogisticus semper necessarius.

480. Vstio intra limites resoluendæ inflammationis subsistens, (386.) curanda his, quæ liquida condiant, moueant, vasa expediant, conseruent: id fit igne moderato,

rato, fotu, cataplasmate, (395. ad 402.)
butyro loto, spiritu vini cum pauco vi-
triolo.

481. Vstio itura in gangrænam, crispa-
ta iam & erosa cute, eleuatis bullis, cu-
randa vt inflammatio talis, fotu, cata-
plasmate, emollientibus, digestiuis (402.
ad 454.)

482. Vstio iam in crustas gangræno-
sas, vel sphacelatas acta, curanda vt illi
morbí (419. ad 476.)

483. Nusquam plus prospiciendum
pulchritudini cicatricis, quam hic: vid.
(217.)

IN COMBUSTIONE.

SECT. 480.

Fotus.

Rec. *Aceti Lithargyrii* vnc. ij.

Vini Gallici vnc. xij.

Aq. stillatiz. flor. sambuc. vnc. xiv. M.

Rec. *Flor. Sambuci,*

Meliloti,

Althææ, ana vnc. j.

Cum aq. decoct. & expressis, lib. iss. admisce

Sp. vini zheriac. vnc. ij.

Aceti sambuc. vnc. j.

Sal. maris drach. j.

Linteis calidis applicetur.

M 5

Cata-

*Cataplasma.*Rec. *Fol. Malu.**Bifmalu. ana m. ij.**Flor. Melilot. vnc. ij.*

Cum aq. decoct. sub finem admisce

*Farin. lini q.s.**Sp. vini theriac. vnc. j.**Ol. lini vnc. fs. F. Cataplasma.*

SCIRRHVS.

484. **S**cirrhus (392.) pro causa habet quidquid succum in glandulis coagulare, inspissare, ficcare potest. Eius ergo sedes omnis glandula; sed inprimis quæ liquorem facilius inspissandum habet, vel ratione loci stagnare plus cogit. Vnde in oculis, naribus, ore, mammis, axillis, inguinibus, pancreate, mesenterio, vtero, sæpius obtinet.

485. Hinc inflammatio (392.); lac stagnans, caseosum, durefcens, coagulum; contusio (322.); attritus validus; anthrax; bubo; vlcus præmature clausum; materies atrabiliaria sanguinis, bilisue, maxime cessante consueto menstruo, vel hæmorrhoidali fluxu; lapidescens, crassa, austerâ, gypseâ materies; vi-
ta

ta tristis; victus durus; hæreditaria labe,
scirrhum creare possunt.

486. Effectus scirrhi nati, occupare
aucta mole vicina, ea premere, compri-
mere; lædere functionem scirrhi, &
vicini; hinc inflammationes, suppurationes,
gangrænas, paralyfes, atrophias, spha-
celos, sterilitatem, partum difficilem, vol-
uulum, & multa similia mala producere,
quæ ex natura & officio læsi, & compri-
mentis, facile deduci queunt.

487. Præsentia scitur, causa (484. 485.),
effectu (486.), phænomenis (392.), loco
affecto (484.), temperie ægri, cognitis.

488. Ex iisdem (487.) euentus præsa-
gitur, considerando durationem mali, &
effectus (486.). Sunt per se innocui, eua-
dunt motu incitato maligni,

489. Qui sæpe vitari impos æternum
metum parit.

490. Vnde curaturus notet:

1. Scirrhum, si recens, benignus, loco
idoneo situs, nondum perfecte durus,
in homine euchymo, tentandum e-
molliente, resolvente medela; quo fu-
mi acidi, & vis mercurii inprimis spe-
ctant.

2. Si

2. Si non cedit his, si locus, situs, vicina, mobilitas, conditio mali, robur & valetudo ægri permittunt, ocyus ferro integre eximendus est.
 3. Si vetus, colore, duritie, scabritie, pruritu, inchoato dolore malignus, loco vel vicinia timendus, adhærescens, in corpore cacochoymo, extirpatu impossibilis; tum omnia vitanda, quæ motum augment, ne carcinoma fiat. Ideo emollientia, suppurantia, rodentia, caustica, dissipantia, mala sunt.
 4. Sed sola tum (490. 3.) anodyna, sedantia motum, saturnina, mercurialia blanda conueniunt.
491. Si simul temperies peccat, hæc corrigenda præ cæteris.



AD SCIRRHVVM.

SECT. 490. N. I.

Fotus ad scirrhum.

Rec. *Flor. Albæ.*

Chamæmel.

Melilot.

Sambuc. ana m. j.

Centaur. min. m. fs.

Fol. Absinth.

Marrub. alb.

Ruta,



Rutæ,

Sabinæ, ana m. j.

Rad. Bryon. alb. vnc. iv.

Angelic. sativ. vnc. ij.

Cum aq. decoct. vase clauso, & per pannum express. lib. iv.
admisce

Sp. vini theriac. vnc. iv.

Applicetur pannis laneis ad cutim nudam, superapponendo extrinsecus supra pannos vesicam suillam expansam, atque pauxillo olei prius inunctam.

Cataplasma.

Ex iisdem coque cum f. q. aq. cataplasma, sub finem addendo

Gumm. Galbani, in vitello oui subacti, vnc. iij.

Farin. lini vnc. ij.

Ol. lini vnc. iij.

Emplastrum ad Scirrhum.

Rec. Gumm. Ammon.

Galban.

Sagapen.

Opopanac. ana vnc. ij.

Leni igne in testa soluta depura, tum admisce accurate

Vitell. ouorum, bene concussor. N. iv.

Ceræ citrinæ vnc. ij.

Farin. rad. bryon. alb. vnc. iij.

Ol. infus. rutæ q. s. vt f. f. a. emplastrum.

SECT. 490. N. 4.

Victus esto ex lacte recenti, lacte ebutyrato, & sero lactis.

Ex iure carniū quarumcumque recentium de quadrupedibus & volatilibus.

Ex frumentaceis, auena, hordeo, milio, phalaride, secali, tritico, zea.

Ex



Ex oleribus, §. 35. N. 1.

Ex fructibus mitibus, maturis, horæis, acido dulcibus, in-
primis coctis.

Ex hordeatis, patnatellis &c.

*Porus esto decoctum ex rad. chinæ, farsaparillæ, lignorum
santalorum trium, &c.*

Anodyna.

Rec. *Semin. papaver. alb. contrus. vnc. ij.*

Rad. fœnicul. vnc. iv.

Flor. papau. errat. drach. vj.

Fol. malvæ m. j.

Cum aq. decoct. vase clauso, spatio $\frac{1}{4}$ horæ, pint. ij. ad-
misce

Syrup. papau. alb. vnc. ijs.

Bibat subinde vnc. iij. vel iv.

Rec. *Spermat. ceti,*

Corall. rubr.

Stibii diaphoret. non abluæ ana drach. j.

Laudani puri gr. ij.

M. F. pulu. tenuissim. diuidendus in iv. dos. æquales:

Quarum unam capiat mane & vesperi, urgente dolore.

Hæc pro internis.

Externe fomentum.

Rec. *Flor. Hyoscyami,*

Meliloti,

Papaver. rhœad.

Sambuci, ana pug. j.

Cum aq. decoct. vase clauso, pint. ijs. admisce

Aceti Sambuci,

Rosac. ana vnc. ij.

Sp. Vin. rectific. drach. vj.

Vnguen-

*Vnguentum ad litum.*

Rec. *Aceti lithargyrii* vnc. j.
 Ol. express. semin. hyoscyami,
 papau. alb.
 rosar. infus. ana drach. ij.
F. S. A. nutritum, cui sub finem admisce
 Opii puri gr. vj.

Emplastrum.

Emplastrum de minio.
Vnguentum diapompholygos.
Rec. *Succi recent. expressi & puri,*
 Fol. Hyoscyami,
 Papauer. hortenf.
 Pbellandrii, ana vnc. iv.
Leni igne coque, inspissa, sub finem admisce
 Ceræ albæ vnc. viij.
 Ol. infus. rosar. vnc. j.
F. S. A. emplastrum.

Vel.

Rec. *Sacchar. Saturni,*
 Cerussæ,
 Amalgam. Mercur. & Saturn. ana drach. ij.
 Ceræ albæ vnc. iv.
 Ol. infus. Rosar. drach. iij.
M. F. Emplastrum.

C A N C E R.

492. **S**cirrhus (392.), ætate, augmento,
 motu vicinorum, si mouetur ita,
vt vasa vicina ad margines scirrhi inflami
 mari

mari incipiant, euadit malignus, & vocatur iam cancer a similitudine, vel carcinoma.

493. In quo (492.) gradus inflammationis vicinæ; acrimoniæ putridæ excessus in loco affecto; dignitas partis; glandularum nexarum numerus & conditio; temperies totius, diuersos malignitatis primæ status docet.

494. Si suis continetur pellibus, occultus, his vlcere ruptis, manifestus vel vlcerosus dicitur; posterior primi soboles.

495. Causa est quidquid scirrhum facit (484. 485.), acre scirrhum mistum; mutatio in circulantibus, a menstruis, hæmorrhoidibus, hæmorrhagia qualibet, retentis; sterilitas, cœlibatus, effœta ætas a 45 ad 50 annos; victus austerus, acer, calidus; affectus animi tristes & biliosi, irritatio externa quælibet, motu, calore, acrimonia, emolliente, suppurante, caustica, vesicante medela externa, vel interna similia peragente.

496. Locus vt scirrhi (484.)

497. Cognoscitur occultus ex signis scirrhi (487.) prægressi, accedente titillatione,

tione, pruritu, calore, rubore, dolore lancinante, vrente, pungente, colore rubello, rubro, purpureo, cæruleo, liuido, atro; duritie summa, prærupta, scabra, cum eminente apice; tumoris augmento; vasis sanguiferis vicinis tumentibus, nodosis, varicosis, crassis, atris.

498. Ulceratus noscitur ex prægresso occulto prius cognito (497.), si aperitur: pellis tum quasi excoriando denudatur, & tenuis, acer, ichor; quasi transsudando exprimitur.

499. Eius hic progressus: vasa sana circa margines cancri duri vi fluentis vitalis liquidi attrita, & assurgente tumore distracta rumpuntur, hinc putredo, tum sanies subtilis, acris, foetida, cadauerosa, ambientia rodens, vicina exedens, progressus in ambitum, & in profundum ad partes vicinas emittendo vndique radices malignas, quibus tenet fortiter, labia tumida, retorrida, horrenda, dolor intolerabilis, vrens, pungens, rodens, color cineritius, liuidus, niger, cancri occulti ad glandulas communicantes, hæmorrhagiæ, conuulsiones, febris lenta, extenuatio totius, ἀναιμία, indolentes in aure calli,

N*

lipo-

lipothymiaë, inde peresis & consumptis mors.

500. In euchymis occulti cancri quiescentis facilis toleratio, moti rabies (499.) prædicitur.

501. Cancer paruus, incipiens, liber, loco apto situs, vasis magnis non adcretus, a causa externa ortus, in iuuenili, sanoque corpore, solus in toto corpore, ilico ferro extirpandus, vel abscindendus est.

502. Emollientia, emplastica, suppurantia, acria, excoriantia, vesicatoria, caustica, ei applicata conuertunt in cancrum vlceratum; ergo vitanda.

503. Cancer magnus, vetus, adhærens, locis extirpationi ineptis situs, vasis magnis adcretus vel incumbens, a causa interna ortus, in corpore senili, cacochymico, ad cancrum composito, aliis iam cancris in eodem corpore fociatus, nec ferro (501.), nec medicamentis (502.) tangendus est.

504. Ni enim cum radice & semine integre extirpari queat, asperabitur, ad interiora recurrit, alios generat, factos auget.

505. Causa cancri tollenda cum cancro, vel antequam tollatur ille.

Nisi

Nisi integre auferri queat, relinquendus est.

Vteri, faucium, palati, axillarum, inguinum insanabilis; labiorum curatu difficilis.

506. Ergo in statu (503.) adspiramus ad duo: 1. quietem mali. 2. lenimen symptomatum.

507. Quies impetratur: 1. locum defendendo ab omni externo per plumbata, & narcotica. 2. causam (495.) cognitam minuendo, corrigendo, auertendo: quo lenia purgantia ex blandis vegetabilibus, mercurialibusque faciunt, parua & sæpe geminata dosi data, 3. diluentibus, aperientibus blandis, subalcalicis, 4. vitando, quæ sumta, vel applicata vicem causæ gerunt.

508. Symptomata iisdem (507.) leniuntur; dolor opiata exigit.

509. Exulceratus (498. 499.), ni tolli queat, lenitur sæpe mundando, plumbata lenissima applicando, tum dicta (507. 508.) adhibendo.


510. Extirpatio fit: 1. Corpus victu, medicamentisque refocillantibus, & causæ aduersis præparando, 2. totum simul &

N 2

semel

semel cum omni radice filo traiecto, vel furcilla suffixa eleuatum exscindendo, vel detectum incisis integumentis, filo traiecto attollendo, & deinde prudenter separando, 3. vulnus rara, blandaque obligatione curando, vicino cruore prudenter prius euacuato.

511. His actis (510.), diu pergendum in victu & medela cancro adhuc præfenti propria, quin & patet, quæ mala a cancro in loco extirpationem renuente prodire queant.



IN CANCRO.

SECT. 507. N. 1.

Vid. *emplastrum*. §. 490. N. 4.

SECT. 507. N. 2.

Rec. *Resin. ialapp.* gr. vi.

Diagrydii gr. vij.

Stibii diaphoret. non ablut. gr. xxiv.

M. F. Pulv.

Rec. *Mercur. dulc.* gr. xv.

Diagryd. gr. xij. M. F. Pulv.

Capiat semel in septimana.

SECT. 507. N. 2.

Decocta ex bardana.

china.

feniculo.

petro-

petrofelino.
 farfaparilla.
 scorzonera.

Vel.

Rec. *Antimon. diaphoret. non ablut.* gr. viij.

Sperm. ceti drach. j.

M. F. pulv. diuid. in ij. dof.

Sumat vnā mane & vesp̄ri.

SECT. 509.

Fomenta & litus.

Rec. *Aq. stillat. Papauer. rhoead.*

Rosar.

Sambuci, ana vnc. ij.

Sacchar. Saturni drach. j.

Tinct. opii drach. j.

Sp. vini theriacal. drach. ij. M.

Rec. *Aceri lithargyrii* drach. vj.

Ol. Rosacei drach. iv. F. Nutritum.

DE MORBIS OSSIVM.

512. **I**psa ossa morbos patiuntur similes iis, quos hactenus in mollioribus partibus descripsimus.

513. Nam interstitia horum vestiuntur membranula eodem vasorum genere instructa, iisdem liquoribus perpetuo allatis humectata, ac illæ.

514. Et prout hæc spatiola (513.) maio-

N 3

ra,

ra, eo os ibi propius accedit structuræ partis mollis.

515. Ideoque aptius ibi (514.) pati eos morbos, qui aliter molles partes occupare dicuntur.

516. Talis est latior circa iuncturas pars, quum densior, minusque vasculosa sit in osse medio.

517. Hinc (514. 515. 516.) prima morborum in ossibus distinctio.

518. Ossa, præter vasa mollibus communia (513.) partibus, in suis cellulis latioribus (516.) habent vesiculas oleo subtili medullosa, ibi secreto, & in suos usus asseruato, plenas; hæ vesiculæ, maiores circa iuncturas, circa densitatem ossis sensim abolentur, & in canales pingue vehentes tenuissimos versæ, evanescunt fere.

519. Hinc (518.) altera morborum in ossibus classis.

520. Habent ossa periosteum externum conuexa ambiens, tegens, vasa arteriosa in cellulas, inque medullam ferens, venosa excipiens, magna, parua, numero infinita.

521. Hinc (520.) iterum morborum tertia series in ossibus.

522. Habent ossa perioſteum internum caua medullæ receptacula ambiens, tegens, vafa arterioſa in veſiculas medulloſas diſtribuens, venoſa excipiens, magna, parua, numero infinita.

523. Hinc (522.) quarta morborum in offibus diuiſio.

524. Habent ossa in ſuis cauis infinitas veſiculas oleo ſubtili medulloſo plenas, id aſſeruantes, diſtribuentes & inter ſe mutuo, & inter lamellarum interſtitia, & in caua iuncturarum, & per poros rectos. Hæ veſiculæ arterias, lymphæductus, adipoſos ductus, neruulos, membranulas, habent.

525. Hinc (524.) quinta & vltima, ex hac diuiſione, morborum in offibus differentia.

526. Si medulloſum (518. 524.) oleum in ſuis veſiculis, emiſſariis, vel in offium interſtitiis ſtagnat, calore & motu vitali acre, putridum ſanioſum fit; ſecretionem nouam impedit; vafa adferentia, ſecernentia obturabit; veſiculam ſuam inflammabit; dein ſuppurabit; vel gangrænosa putredine corrumpet liquida & vaſcula; hinc oſſea ipſa ſubſtantia vasis orba, liqui-

do vitali priuata, acribus erosa, in cineritiam quasi calcem vertitur, vbi tenuissima, id est in cellulis apophysium; sic dolor, calor, pulsatio, tumor, abscessus, caries contingit pessima. Stagnatio hæc ab omni obstructione oriri potest (vid. cap. de obstr.) Si autem ex interno malo, tum fere spina ventosa audit.

527. Liquet signa huius mali, & status (526.), esse signa inflammationis profundæ, nec ad tactum externum fæuientis.

528. Prognosis ex difficili separatione, abstersione, emundatione, mala multa, & difficillimam curationem præuidet.

529. Curatio optima tentatur: 1. omnia vasa largissime implendo decoctis ex his, quæ valide penetrant, multum abstergunt, putredini resistunt, 2. dein valide mouendo cuncta per methodum sudorem exprimendi vapore calido artificiose ad corpus applicato 3. simul tum, dum sudor fluit, motum determinando ad locum affectum per topica fomenta, & applicatione determinata vaporis calidi ad partem illam.

530. Hoc modo (529.) si diu continuetur, sæpe multum boni fit maxime si diæta

diæta simul tenuis, & putredini oleosæ aduersa, instituitur.

531. Si textura arteriosa, vel venosa, vt & lymphatica, (513. 516. 520. 522.) obstructa fuerit, defectu noui, vel stagnatione allati liquidi, iterum in iis partibus oriuntur similes omnino morbi ordine tantum mutato (526.)

532. Quorum (531.) ergo diagnosi, prognosis, curatio, eadem (529. 530.)

533. Patetque, maximum periculi discrimen hæere in diuersitate loci (518. 524. 520. 522.), vbi prima mali causa ortum sedemque habet. Quibus primo præmissis clarior doctrina.

534. 1. Inflammatio ossis benignior a periosteo externo inflammato oritur, cuius infinitæ causæ, (vid. totam histor. Inflammat.) notique effectus.

2. Cognoscitur per signa inflammationis profundæ ad tactum aucta.

3. Prævidentur plurima mala (531. 526.), ni ocyus sanetur.

4. Curatur vt inflammatio, maxime id agendo, vt totum auertatur ab osse extrorsum; quod fomentis, & aliquando facta incisione fit.

535. Talem inflammationem vergere in abscessum docent: 1. signa valida inflammationis prægressæ, (534. 2.) 2. pulsatio, febris, horripilatio vaga. 3. absentia signorum resolutionis (386.)

536. Re autem ipsa adesse docent signa suppurati profunda (387. 405.)

537. Tum pus, exeso periosteo, os nudabit, vasis priuabit, corrumpet (531.) breui, confer (406.)

538. Quare ilico abscessus aperiendus, pus eliciendum, vlcus mundandum, (403. 404. 409. 410. 411.); dein simul os tractandum iisdem cautelis, ac in vulneribus capitis cum cranio detecto dictum. (252. 253. 259. 260. 262. 266.)

539. Vergere autem illam inflammationem (534.) in gangrænam partis, docent: 1. signa summæ inflammationis (388. 422.) 2. indolentia partis sine bona causa. 3. Tumor densus, lentus, nec multum dolens incumbentium.

540. Adesse iam, scimus ex iisdem (539.), tum ex colore incumbentium pallido, cineritio, liuido.

541. Tum os nudum, vasis, succoque vitali orbum, acri putrefacta materie gangræno-

grænosa exeditur in cariem (526.); serpit cito contagio crescente.

542. Ergo statim locus affectus ad os vsque incidendus, mundandus, os vero curandum vt supra dictum (248. 249. 252. 258. 259. 260. 261. 262. 266.)

543. Si periosteum internum (522.) inflammatur, causas agnoscit easdem (534.); effectusque habet, quoad os internum, eosdem; exitum in abscessum, aut gangrænam eundem (535. 539.); sed ob denegatam exhalationem, peiorem; vnde medulla tota, totum inde os, fœtidissima putredine, & carie pereunt.

544. Vnde etiam liquet, siue membrana hæc (522.) primo ipsa inflammetur, siue a corrupta prius medulla contagio suscepto læsa sit, eundem breui oriri morbum ossis cariosi a medulla putrefacta, vix vnquam curabilem.

545. Cognoscitur id malum, quando in inflammatione subsistit hætenus: 1. a signis inflammationis generalibus (382.), 2. a loco profundo. 3. a dolore obtuso, fixo, diuturno, nulli remedio externo cedente, nec ad attactum aucto, 4. sed post motus musculares increcente.

546.

546. Sanatur tum: 1. curatione ad inflammationem generali (a 395. ad 401.), deinde, simulac apparuerint resolutionis incipientis signa (386.), 2. methodo proposita (529.), stricte satis observata.

547. Si vero suppuratio hic, vel gangræna acciderit, & per prægressæ inflammationis internæ signa (545.) valida, tum ex dolore fixo, profundo, obtuso noscitur, vel methodus (529.), vel nihil, sanat.

548. Tum enim putrefacta tota mole ossis interna, tumefacto, inflammato, carioso interno osse, periosteum externum inflammatur, distrahitur a tumore, eroditur ab acri, incumbencia, lento contagio corrupta, spongiosa fiunt, tument, dolent, totum membrum perit: sola extirpatio sanat.

549. Qualitas venerea, scorbutica, rachitica, est causa frequens: inde intelligitur, quid sit gummi, tophus, nodus, exostosis, abscessus, caries, spina ventosa in osse?

550. Hinc nouimus, cur os cariosum colorem suum tam varie mutet ex subcæruleo candido in album pinguem, flavum, cineritium, liuidum, nigrum? & quem

quem corruptelæ gradum singuli denotent?

551. Ex iisdem liquet, cur os cariosum inæquale, asperum, spongiosum, friabile, molle, fragile euadat? arteriæ externæ, & internæ, lamellas ossis non plus comprimunt.

552. Item, cur fœtorem singularem rancidi lardi exhalet?

553. Nec non cur in loco vlceroso a subiecta carie caro superincumbens mollis, flaccida, fungosa, inflata, tumens; labia vlceris inuersa; sanies clara, subtilis, vix glutinosa, fœtida, paruis squamulis nigris referta; recrudescencia sine causa: pertinax rebellio contra medicamenta optima ad alia omnia vlcera?

554. Ut &, cur caries a causa externa facile; ab interna difficulter; a lue Gallica difficilius; a spina ventosa difficillime sanetur?

555. Denique, cur in parte solidiore ossis mala; in spongiosa peior; in iuncturis pessima, prima lenta, altera velox, vltima velocissima sit; cur in pueris velox, & curatu difficilis; cur spina ventosa plerumque pluribus locis simul, vel successive?

556.

556. Qui his (ab 512. ad 556.) dicta de contusione (249. 250. 251. 254. 256. 257. 325.); luxatione (ab 358. ad 370.), fracturisque (ab 339. ad 358.) ossium adiunxerit, tum ea, quæ de vulneribus capitis ossa lædentibus (ab 249. ad 297.), habebit historiam, & curationem morborum præcipuorum in ossibus. Inprimis si ἀγκύλωσις additur. Qui immobilitas articulationis cum tumore duriori. Callo fracti ad articulum ossis, inspissato linimento Haueriano, ligamenti rigescentibus, exostosi ad iuncturas, inprimis originem debet. Difficillima curatio petenda ex diuersitate causæ.

557. Qui vero omnes morbos, hucusque descriptos, oculisque subiectos intellexit ita, vt horum enarratas causas, naturam, effectus, curationem cum cura expenderit; dein autem internis tectisque corporis partibus eadem omnia applicauerit; cum actione integrarum comparauerit; atque deinde cum ipsis interiorum morborum phænomenis composuerit; videbit interna externis reapse congruere; externos chirurgicos primo pertractandos; nec aliter ordinati quid,
vel

vel veri, in praxi medica fieri posse, aut doceri.

IN MORBIS OSSIVM.

SECT. 529. N. 1.

Rec. *Ligni guaiaci virid. ponderos. rasi.* vnc. x.
Sal. tartari drach. is.

Cum aq. comm. lib. vj. spatio xxiv. horar. digestum in diplomate, decoque spatio 2. horar. sub finem admiscendo

Sp. vini rectific. vnc. iv.

Ebulliant iterum parumper, tum exhibe.

Super residuo decocti nouæ aq. lib. iij. affusæ ebulliant, per iv. horas.

Prioris decocti vnc. iv. *sumat, quater de die, vacuo stomacho: mane hora septima, dein hora undecima, iterum quarta pomeridiana & ultimo hora septima vespertina.*

Altero decocto utatur pro potu quotidiano.

Sic ex ligno iuniperino, sassafra, buxi, quercino, &c. decoctum fieri potest.

Lintea his decoctis madida fomenta sunt.

DE MORBIS INTERNIS ET DE FEBRIBVS IN GENERE.

558. **F**ebbris, frequentissimus morbus, inflammationi indiuiduus comes, plurium morborum, mortis, & sæpe sana-

fanationis, optima causa, nunc explicanda.

559. Cuius quia abdita habetur natura, summa ope cauendum ab omni errore, in illa indaganda.

560. Errori tamen facilem hic occasionem præbet ingens numerus symptomatum, quo plerumque stipatur, & sine quibus tamen febris esse potest.

561. Ut ille vitetur, opus erit ex infinitis (560.) illa phænomena sola eligere, quæ omni feбри semper adsunt; quorumque cognita præsentia omnes medicos docet, febrim adesse, quorum absentia iudicant hominem a febre immunem esse.

562. Dein ex his detectis (561.), riteque expensis, natura febris indiuidua inuenienda erit.

563. In omni febre a causis internis orta horripilatio, pulsus velox, calor, vario febris tempore vario gradu, adsunt.

564. In qua febre hæc tria (563.) velociter, & cum periculo decurrunt, *acuta* dicitur.

565. Vbi tarde, idque cum periculo, vel sine eo, *lenta* vocatur.

566. Vtraque (564. 565.) *communis* siue *epidemica*, vel huic illiue homini *singularis*.

567. Acuti febriles morbi vocantur, quos dicta febris (564.) comitatur, chronici febriles autem, in quibus adest febris (565.)

568. Hinc illorum omnium (567.) explanatio pendet a cognita prius febris natura.

569. Quæ petenda ex consideratione trium communium symptomatum (563.)

570. Quæ (563.) quidem in omni febre adsunt, sed sola velocitas pulsus adest ex his omni febris tempore, ab initio ad finem, eaque sola medicus præsentem febrim iudicat.

571. Adeoque quidquid de febre sic nouit medicus, id vero omne velocitate pulsuum sola cognoscitur, a morte cessat omnis febris.

572. Causa ergo velocitatis huius (571.) proxima est pariter causa febris, sic cognita, proxima.

573. Ergo velocior cordis contractio. Igitur affectio vitæ conantis mortem auertere, tam in frigore, quam in calore.

574. Ergo velocior reciprocus influxus liquidi neruosi, & cerebellofi in musculos, & sanguinis in vasa, & caua cordis.

575. Omnis fere febris, hætenus obseruata, quæ a causa interna oritur, incipit primo cum sensu frigoris, concussionis, horripilationis, maiori, minori, breui, diuturno, interno, externo, pro varietate subiecti, causæ, febris ipsius.

576. Quo tempore (575.) velox, paruus, sæpe intermittens pulsus, pallor sæpe extremorum, frigus, rigor, tremor, insensibilitas.

577. Vnde liquet, stagnare tum humores sanguineos in extremis vasculis, & simul tamen causam cor irritantem (574.) adesse.

578. Ex quibus (577.) causa omnium phænomenon (575. 576.), tum apparentium, intelligitur.

579. In omni febre, his (575. 576. 577.) prægressis, oritur calor, maior, minor, brevis, diuturnus, internus, externus, vniuersalis, vel loci, pro varietate febris.

580. Qui (579.) quum sequatur febrim iam natam, patet magis eius effectum, quam causam, vel naturam esse.

581. Adeoque velocior cordis contractio, cum aucta resistantia ad capillaria, febris omnis acutæ ideam absoluit.

582. Horum vero (581.) vtrumque in animali viuo produci potest ab causis numero & varietate infinitis; tumque vel simul, vel seorsum fieri; vnoque nato, facile alterum sequetur.

583. Quare febris causâ proxima (581.) infinitas causas pro suis proximis agnoscit.

584. Quæ tamen diuiduntur, quod vel singulares sint cuique; vel vniuersales, pluribusque communes, quæ plerumque aëri, victui, vitæ eidem debentur.

585. Ergo febris causæ singulares sunt, vel epidemicæ.

586. Propiores singulares causæ (583.) referri possunt ad quædam capita: α. Ingesta acria, cibi, potus, condimenti, medicamenti, vel veneni titulo, eadem donata hac proprietate, vt digeri, moueri, excerni nequeant; aut ea copia assumpta, vt irritent, suffocent, obstruant, putrescant. β. Retenta intra corpus, quæ excerni solebant, ob frigus, vnctiones, animi affectus tristes, cibos, potus, medicamen-

ta, venena, aërem nebulosum pinguem, quietem, exercitia solita remissa, obstructions, compressiones a contentis, vel ambientibus. γ. Gesta, vt motus nimius animi, vel corporis, calor, æstus. δ. Applicata externa, acria, pungentia, rodentia, lacerantia, vrentia, inflammantia. ε. Quæ humores, horumque motus valde immutant, vt multa externa, vel interna, fames, euacuatio, pus, aqua, ichor, hydropicorum, empyicorum, serum acre alicubi collectum, bilis accensa, inflammatio, suppuratio, gangræna, cancer, vigiliæ nimix, acriora cuiuscunque rei studia, venus nimium culta. &c.

587. Febris effectus, celerior liquorum expulsio, propulsio, stagnantium agitatio, omnium permistio, resistentis subactio, coctio, secretio cocti, crisis eius, quod stimulo & coagulo febrim produxerat; sanorum mutatio in morbosam indolem; sanorum mutatio in indolem aptam ferre ea, quibus minus adfuetus erat æger; liquidissimi expressio; reliqui incrassatio; fitis, caloris, doloris, anxietatis, debilitatis, lassitudinis, grauitatis, *ανορεξίας* productio.

588. Quo lentor citius soluendus (577.), & irritatio breuius sopienda (574.), eo febris leuior, breuior, magis salutifera, & contra. Quin etiam pro vario vtriusque gradu, & concursu, varia erit.

589. Atque hinc febris sæpe medicamento virtutem exercet ratione aliorum morborum.

590. Hinc initia, incrementa, status, decrementum, crisis, mutatio, sanatio febris, varia sunt in ipsis acutis & singularibus.

591. Febris desinit in mortem, alium morbum, inque sanitatem.

592. In mortem, vitio destructi per nimiam vim solidi; aut peccato liquidi ita depratiati, ut vasa obstruat vitalia, aut ea, per quæ noua liquida in locum perditorum ingeri debent. Hinc inflammationes, suppurationes, gangrænæ febriles in visceribus vitalibus, corde, pulmonibus, cerebello; vel vlcera aphthosa in primis viis causa frequens mortis ex febre.

593. In alium morbum desinit, dum vel agitatione nimia vasa lædit, & liquidiora dissipans reliqua inspissat; vel nimis debili actione impar est resoluendo sua vi coa-

gulato; vel deponendo materiem criticam in vasa quædam obstructa, dilatata, vel rupta; hinc maculæ rubræ, pustulæ, erysipelas, morbilli, variolæ, phlegmonæ, bubones, parotides, abscessus, gangrænæ, sphaceli, scirrhi &c.

594. Terminatur in sanitatem, 1^o. quoties materialem febris causam sua vi subigit, soluit, mobilem reddit, insensibilis perspirati specie expellit, simulque impetum suum, æquabili circulatione reddita, sopit. Hæc est resolutionis via, similis fere in toto, vt prius dictum de parte (386.) Aut etiam 2^o., si materies mali eiusdem vi febris subacta, soluta, mobilis reddita, tamen aliquam retinet dotem, qua æquabili circulationi repugnat, vasa stimulat, hinc excitata sensibili quadam euacuatione expellitur; hinc sudor, salua, vomitus, diarrhœa, vrina, post coctionem, & statum, fere intra quatuordecim dies facta crisi.

595. Tandem si materies mali eiusdem vi febris subacta, soluta, mobilis reddita, sanis iterum assimilata humoribus, fluit sine vlla crisi, alioue morbo.

596. Genius, discrimen, duratio febris acutæ,

acutæ, si obseruantur ab initio, per adscensum, vsque ad statum, docent eius exitum, mutationem, finem.

597. Ideoque ex omnibus his (ab 558. ad 597.) enarratis generalia diagnosios & prognosios dogmata in febribus facile elici queunt.

598. Curatio optima febrium generalis obtinetur, si 1. Vitæ, eiusque viribus consulitur. 2. Acre irritans corrigitur, expellitur (574.) 3. Lentor dissoluitur, expellitur (577.) 4. Symptomata mitigantur (587.)

599. Vitæ & viribus consulitur, cibis & potibus fluidis, facile digerendis, putredini aduersis, siti contrariis, appetitui citando idoneis, causæ morbi cognitæ oppositis.

600. Cibus dandus eo tempore, quo abest febris, aut quo eius impetus saltem erit lenior.

601. Et quidem copia parca, sæpe repetita: ne nimis laborare cogantur viscera, mutanturue.

602. Copia determinatur, & vis cibi 1. ex præuisa duratione febris (588. 589. 590. 596. 597.) ad dies, 1, 4, 7, 9, 11, 14, 21, 30,

40, 60; debet enim tantum dari, quo vires sustineri queant, vt sufficiant coctioni, & crisi. Quo breuior morbus, eo minus & debilius offerendum, & contra. 2. Ex ætate ægri cognita; quo enim origini propiora, vel senectuti summæ, eo difficilius inediam ferunt animalia. 3. Status & vehementia morbi si cognoscuntur, varium copia & virtute cibum postulant: in ἀκμῇ tenuissima, & pauca; in adscensu & descensu eo plus, & meracius dandum, quo magis ab ea distat morbus, 4. a loco quem æger incolit, qui enim æquatori vicini tenuem victum facile, polis autem propiores difficulter eum ferunt, 5. ab anni tempestate, quum æstas tenuissima, hyems validiora petat, 6. a consuetudine ægri, & temperie eiusdem naturali; qui enim sanus lautissimis vsus ea facile diffat, æger pluribus eget, ob vasa & viscera his assueta, 7. a sensu leui, vel graui, assumpta sequente.

603. Acre irritans externe hærens, (vt vitri, metalli, ligni, lapidis, ossis, fragmenta acuta; aut stimulantium, rubefacientium, rodentium, vesicantium, causticorum, septicorum, venenatorum applicata),
cogni-

cognitum, quantocyus auferendum; dein ille locus, cui inhæserunt, & læsus inde est, fouendus erit lentis, mucòsis, oleosis blandis, anodynis, leniter aperientibus.

604. Acre irritans interne hærens, (vt inflammationis, suppurationis, gangrænæ, sphaceli, cancri, cariei ossis, ichoris, puris, lymphæ acris & stagnantis acrimonia) tolli, vel corrigi debet iuxta leges ante datas in historia horum morborum præmissa, si acre epidemicum, vel venenatum, corpore receptum, vitam irritat, id ex lege epidemicis præscripta tractari debet, (1407 ad 1412.)

605. Acre irritans in ipsa liquida indutum vsu sex rerum non naturalium tolli, vel corrigi potest, & debet, pro sua indole varia cognita, variis auxiliis.

1. A motu nimio; quiete corporis & animi, humectantibus, diluentibus, blandis lenientibus.
2. A nimio calore aëris; temperando illum exhalatione frigida, maxime plantis nonnullis, huic propriis negotio; potu aquæ subacidæ leuiter nitrosæ, cum vini subaciduli pauxillo; cibo sub-

acido, leuiter demulcente, parum salito; medicamentis vero similibus.

3. A nimis humido aëre; largo foco ex aromaticis resinosisque lignis; exhalatione aromatum.
4. Ab aëre acri putrefaciente; hunc emendando accenso nitro, puluere pyrio, vapore aceti, sale prunis insperfo.
5. Ab animi affectibus; hos sedando ratione, contrariis affectibus, varietate obiectorum, anodynis, opiatis.
6. A cibis acribus acidis; id acre diluendo, demulcendo, absorbendo, immutando in salem compositum; aquosa, gelatinosa animalium, oleosa, cretacea, ostracodermata, lapides animalium, terræ pingues, sales alcalini fixi, volatiles, simplices, compositi, id efficiunt. Vid. (60. ad 69.)
7. A cibis acribus salinis, eam acrimoniam diluendo per aquosa, tumque euacuando simul; demulcendo per lixiuiosa ex calce viuâ.
8. A cibis acribus aromaticis calefacientibus; diluendo per aquosa; corrigendo per acida; resoluendo & detergendo per saponacea acida; demulcendo
per

per blanda gelatinosa. Quum alcaliscentia acria huc spectent, & illa hinc intelliguntur.

9. A cibis animalium ex partibus alcaliscentibus; per ea, quæ descripta (76. ad 91.)

10. A cibis copia peccantibus, stomachum constringentibus; dilutione, inedia, vomitu, solutione alui.

11. A potu acri fermentato, vel fermentante, acido, oleoso, aromatico, destillato vel simplici inducta acrimonia tollitur iisdem remediis (Nº. 5. 6. 8. huius.)

12. A nimia vigilia; curatur iisdem, ac (Nº. 1. 2. 5. huius.)

13. Si a retentis intra corpus excrementis acrimonia alcalina, acida, oleosa, saponacea putrida; hæc reddenda fluxilia; viæ lubricandæ, emissaria aperienda; vires expellentes stimulantæ, augendæ; hæc facienda per externa, interna.

606. Emissaria aperiuntur soluendo impactum; laxando obstructum; id balneo, fotu, frictu, abrasione pilorum, mundatione cutis fit. Vid. (107. ad 144.)

607.

607. Id quod ad extrema vasorum conicorum stagnat ex nimia sanguinis copia, qua vasa comprimuntur, reducitur in fluorem imminuta sanguinis copia per sectionem venæ; id docent signa plethoræ. (106. ad 107.)

608. Quod ibi hæret, ad extrema capillaria, ob fibras horum spasmo contractas, & hinc arctatas, soluitur laxatis fibris (53. ad 55.); & acri contractionis causa ablata (35. 36. 54. 66. 67. 88. 102. 103. 104. 105. 127. 128.), vnde peti debet, quod hic requiritur.

609. Quod hæret ob visciditatem & lentorem proprium soluetur variis remediis, quorum primarium vis ipsius febris ita moderata, vt valeat coagulum hoc solvere (587. 589. 593. 594.); adeoque hucrequiritur, vt sic temperetur impetus, æ. ne inflammationes, suppurationes, gangrænas, sphacelosue queat producere (592.): cuius periculum imminere docet vehementia symptomatum, maxime caloris, comparata cum virtute vasculorum. 6. neue nimio motu dissipentur liquida: id vero denunciat ficcitas narium, oculorum, gutturis, linguæ, raucedo, arida cutis,

tis, vrina parcior, pulsus paruus, celer, inæqualis. γ. neque vt ante coctionem torpeat nimis, ita vt materiem morbi non valeat subigere, mouere, secernere, excernere: id cognoscitur, si languent actiones vitales omnino, necdum apparente signo pepasmi.

610. Si itaque exorbitare deprehenditur (101.), moderamen fit abstinentia, victu tenui, potu aquæ, aëre frigidiusculo, animi affectu leni, venæ sectione, clysmate refrigerante, medicamentis blandis, aquosis, glutinosis, refrigerantibus, anodynis, opiatís: confer (92. ad 106.)

611. Si segnior apparet, excitabitur ope cardiacorum desumtorum ex cibo, potuque meracioribus, aëre paululum calidiore, animi affectu magis excitato, medicamentis acrioribus, volatilibus, aromaticis, fermentatis, frictione, calore, motu musculari, balneis, fomentis.

612. Alterum post primum (609.) remedium, quo visciditas tollitur, est elateris in vasis restitutio, minuto liquido per missionem largam, citam, ex magno vulnere, sanguinis, aucto dein, vel simul, motu per stimulantia.

613.

613. Tertio idem viscidum fluidum redditur diluendo potu, balneo, fotu, clysmate, aquosis, tum simul fricando.

614. Agunt ea optime, si calida, aquosa salita, aromatica amara lactescentia frigida fumuntur.

615. Quæ (613. 614.) vt bene, cito, tuto, valide agant, missio sanguinis præmissa prodest, nam parat ingressum, miscellam, actionem.

616. Simulac viscidum his (609. 610. 611. 612. 613. 614. 615.) solutum, iisdem continuatis, vel auctis, pellitur, & expellitur: sed & sæpe iam emendatum expulsu non egebit (594. N^o. 1.)

617. Symptomata ex febre acuta singulari orta in primis hæc sunt: frigus, tremor, anxietas, sitis, nausea, ructus, vomitus, debilitas, calor, æstus, siccitas, delirium, coma, peruigilium, conuulsio, sudor, diarrhœa, pustulæ inflammatoriæ.

618. Quæ omnia (617.) orta ex febre (581. 587.), vt sua causa, hac ablata (594. 595. 598. ad 617.) cessabunt; adeoque, si ferri queunt tam diu sine periculo vitæ, singularem curationem vix requirunt.

619. Quin sæpe oriuntur ex conatu
vitæ

vitæ se disponentis ad crisin, vel ad materiæ criticæ excretionem, tum hanc præcedunt, comitantur, sequuntur, nec turbari debent.

620. Si vero intempestiua, nimis sæua, quam vt ferri a vita possint, aut ab ægri patientia, vel aliud grauius malum productura sunt, tum singula sunt lenienda suis remediis propriis, habita semper ratione causæ (586.), & status (590.) morbi ipsius.

IN CVRATIONE FEBRIVM IN GENERE.

SECT. 599.

Vid. 28. N. 1. 4.

SECT. 603.

Fomentum tale.

Rec. Semin. pomor. cotoneor. N. vj.

Cum aq. stillar. flor. rosar.

sambuc. ana vnc. iij.

F. S. A. Emulsio, cuius puro liquori admisce

Sp. vin. rectif. vnc. ss.

Tinct. opii drach. j.

Vnguentum Aureum.

Basilicum.

Diapompholyg.

Nutritum.

Populeum.

Rosatium.

SECT.



SECT. 605. N. 1.

Ptisanæ.

Decoctum laxans.

SECT. 605. N. 2.

Rec. *Aq. decoct. bord. vnc. xxv.**Nitri puri drach. j.**Vini Rhenani vnc. vj.**Rob. Ribesfor.**Sambuci, ana vnc. ij. M.**Capiat omni $\frac{1}{4}$ boræ. vnc. j. vel ij.*Rec. *Aq. stillat. Cichorei.**Fumar.**Melissæ, ana vnc. iij.**Sp. salis comm. drach. j.**Syrup. Moror. vnc. ij.**Nitri puri drach. fs. M.**Capiat. cochlear. j. omni semiborio.*Rec. *Crysell. tartari drach. ij.**Nitri puri drach. fs. M. F. Pulu.**Capiat Scrup. fs. omni trihorio ex ptisana.**Reliqua vide in Cap. de Putredine alcalina & de excessu circulationis.*

SECT. 605. N. 3.

Rec. *Herb. rec. Maioran.**Menth. crisp.**Origani,**Rorismar. ana m. ij.**Flor. Chamæmel. Roman.**Rosar. rubr.**Tanacet.**Lauend. ana m. j.**Mari Syriaci m. fs.*

Rad.



Rad. Irid. Florent.

Angelic. satiu.

Imperat. ana vnc. iij.

Rasur. lign. sassafr. vnc. ij.

Semin. contus. celeri vnc. iij.

Conscissorum F. Pulv.

Spargendus in loco, ubi æger est.

SECT. 605. N. 10.

Vomitoria lenia.

Rec. Aq. decoct. bord. levis vnc. xxxvj.

Oxymell. squillit. vnc. iij.

Tart. vitriolat. non acidi drach. ij. M.

Capiat vnc. ij. omni semiborio.

Vel.

Rec. Rob. Samb. vnc. iij.

Aceti squillit. vnc. j.

Aq. stillat. Meliss. vnc. vj. M.

Capiat vnc. fs. omni semiborio.

Rec. Tartar. emetici gr. v.

Pro una dosi.

Rec. Vini emetici vnc. lfs. Pro una dosi.

Rec. Rad. Ypecacuanb. alb. scrup. j.

F. Pulvis. Pro una dosi.

Rec. Rad. Ypecacuanb. pulueris scrup. iv.

Cum Vini albi vnc. iij. coque in phiala alta per hor. quatuor. Colaturam exhibe pro una dosi.

Vel.

Rec. Fol. recent. asari consciss. N. v.

Cum aq. feruida infusis spatio $\frac{1}{2}$ horæ absque ebullitione.

Succum expressum exhibe pro una dosi.

P

SECT.



SECT. 610.

Clyfma refrigerans.

Rec. Nitri puri drach. ij.
 Mell. rofar. vnc. i.
 Seri lactis recent. vnc. xij. M.

Vel.

Rec. Aceti comm. vnc. j.
 Nitri natiui drach. iij.
 Syrup. rofar. solutiu. cum fenna vnc. ij.
 Aq. decoct. bord. vnc. ix. M.

Vel.

Rec. Lact. ebutyрати vnc. x.
 Syrup. ros. pallid. vnc. ij. M.

Vel.

Rec. Decocti comm. emollient. vnc. xj.
 Nitri puri drach. iij.
 Mell. mercurial. vnc. ifs. M.

SECT. 611.

Medicamenta in languore febrili.

Rec. Oxymell. squillit. vnc. iij.
 Sp. vitæ Martiol. drach. iij.
 Aq. stillat. mentha vnc. iv.
 cinnam. vnc. j. M.

Capiat vnc. j. omni bora.

Rec. Diascord. Syluii scrup. ifs.
 Theriac. Androm. drach. ifs.
 Syrup. s. radic. aperient. vnc. ij.
 Aq. stillat. cardui bened. vnc. vj. M.

In eundem vsu.

Rec. Confect. Alkerm. drach. j.

Zingib.



Zingib. condit. drach. vj.

Rad. Contraieru.

Serpentar. Virgin. ana drach. j.

Syrup. s. radic. aperient. q. s.

Vt F. conditum.

Capiat drach. fs. omni quadriborio.

Rec. Pulu. Comitiffæ Kent. scrup. iſs.

Detur omni quadriborio.

Rec. Zing. alb.

Cortic. Winteran.

Rad. Zedoar.

Contraieru.

Serpent. Virgin. ana drach. j.

Trochisci de viperis. drach. ij.

M. F. Pulu. tenuis diuid. in doses scrup. ſs.

Capiat unam omni quadriborio.

Rec. Sal. Card. bened. drach. ſs.

C. C. alb. drach. j.

Corall. rubr. scrup. ij.

Ol. stillar. cinnam.

cortic. citrei ana gutt. iij.

M. F. Pulu. diuid. in x. dof. In eodem vsus.

SECT: 614.

Amara lactescentia frigida.

Chondrilla:

Cichorea:

Hieracia:

Intubi:

Lactuca:

Scorzonerâ:

Sonchi:

Taraxaca:

Tragopogona:

FRIGVS FEBRILE.

621. **F**rigus in febrium acutarum initiis ponit attritum liquorum in se mutuo, & in vasa, minorem; motum circulatorium imminutum; liquidum ad extrema stagnans, cor minus contractum; minus euacuatum: spiritus cerebelli minus influentes.

622. Efficit, si diu manet validum, polyposas in vasis maioribus, circa cor, concretiones; in minoribus vero, expresso suo liquido, euacuationes; hinc multa, & graua mala in vtrisque.

623. Hinc patet, quid designet, quid præfagiat? & cur, quo maius initio frigus, eo periculosior febris? in peste incipiente frigus summum, progressa calor maximus?

624. Id frigus omni eo, quod valide stimulat, quocunque demum titulo, tentatum dedit sæpe insanabilem postea inflammationem. Hinc salina acria, aromatica, oleosa, vesicantia, & similia, damnosa sunt.

625. Optime autem curatur potu aquæ calidæ nitrosæ cum pauxillo mellis

lis & vini; balneo, vapore, fotu, lotionne per similem liquorem; frictione blanda.

626. Quibus (625.) statim applicatis sæpe maxima mala ilico curantur (622.)



IN FRIGORE FEBRILI.

SECT. 625.

Potus in frigore febris sumendus.

Rec. Aq. decoct. bord. vnc. xxx.

Nitri puri drach ij.

Oxymell. simpl. vnc. iiij.

Aq. stillat. caryophyll. arom. vnc. ij. M.

Capiat vnc. ij. omni $\frac{1}{4}$ horæ, calide valde sorbendas.

Rec. Quatuor Sem. frigid. mai.

min. ana drach. ij.

Cum aq. F. emulsio, cuius lib. iiij. admisce

Aq. stillatit. feniculi vnc. iv.

Sal. prunell. scrup. ij.

Syrup. s. Rad. aper. vnc. ij.

Violarum vnc. ss.

Vfus idem.

Rec. Aq. stillatit. borragin. lib. j.

flor. rosar. vnc. j.

sambuc. vnc. viij.

cinnam. vnc. jss.

Sp. vitæ Matth. vnc. ss.

Syrup. artemis. Fernel. vnc. ij.

P 3

M. Vfus

M. *Vfus ut supra.*

Decoctum Coffe.

- - - Ligni Sassafras.

- - - Santali.

& similia hic valent, inprimis si pauxillum aromatis circa finem addis.

Rec. *Ligni Santali albi.*

citrin.

rubr. ana vnc. j.

F. cum aq. decoct. spatio $\frac{1}{4}$ horæ, tum adde

Radic. Fœnic. vnc. iv.

Rasur. Sassafr. vnc. ij.

Glycyrrhizæ vnc. ss.

Ebulliant iterum vno momento; dein decocti lib. iv. exhibe

In eundem usum.

TREMOR FEBRILIS.

627. Tremor ponit musculorum vacillationem, causas tendentes & laxantes breui, & inuoluntarie, sibi mutuo succedentes; influxus arteriosos & nervos nunc contingentes, nunc absentes; adeoque initio morbi quietem utriusque liquidi; in fine sæpe nimiam horum absentiam, post dispendia nimis magna.

628. Efficit diu perseverans impedimenta circulationi humorum, & vitia inde pendentia.

629.

629. Inde diagnosis, & prognosis eius habetur: & liquet cur tremor cum frigore (621.)? cur ingens tremor adeo malus? cur in animi affectibus maioribus tremor? cur circa mortem? cur ab euacuatione omni nimis magna? cur a nimio potu quocunque?

630. Curatur restituto æquabili fluore & pressione liquidi arteriosi in arterias, cerebrosi & cerebellosi in fibras motrices: id obtinet in morbi initio usu eorum, quæ lentorem solvunt, vires reddunt (606. ad 617.); in fine autem per ea, quæ liquida perdita subito restituant, fibras roborant, & viscera (46. 47. 48. 49.).

ANXIETAS FEBRILIS.

631. **A**nxieta pro causa habet sanguinis ex corde egressum impeditum; adeoque per fines pulmonales, aut aortæ impossibilem transitum; hinc spasmus vasculorum contractorum, aut materiem inflammata transire ineptam; similia orta vidimus ex impedito traiectu cruoris per venam portarum ex iisdem causis; vnde, quum omnis sanguis venosus,

fus, a cœliacis & mesentericis arteriis allatus, redire non possit, stagnet, vasa extendat, arterioso fluxui resistat, & omnia hinc nata & nascitura mala producat, liquet ambas has anxietatis causas in omni acuto morbo quam seuerissime obseruandas, & curandas esse.

632. Si anxietas ergo talis (631.) diu perstat, circa vitalia producet polyposas concretiones, inflammationes, gangrænas subitaneas, cum intolerabili angustia, & morte cito subsequente; si autem hæsit in hypochondriis, tum maximum sensum ægritudinis circa stomachum pariet, reliquis visceribus minus acute sentientibus; dein putrefactiones subitaneas sanguinis in vasis his amplis, minusque validis; vnde gangrænæ, hepatis putredo, dysenteria a putrefacto lethalis.

633. Inde optime nouit medicus, quid anxietas talis (631. 632.) pro sua causa, & natura ponit, quidque inde præsagendum sit, simulque distinguet inter anxietatem ab vno affecto genere neruoso, absente febre antegressa, & inter eam, quæ ab inflammatione acuta, quæ tum per sua signa prius se prodidit; inde comparans hæc

hæc cum vehementia, duratione, loco huius mali, cuncta prudenter detegere poterit: Cur in omni fere morbo circa mortis articulum anxietas ultimo tragediam claudit? Cur spasmodica anxietas parum, inflammatoria maxime, periculosa? Cur inquietas, iactatio, suspiria, anhelatio, peruigilium in morbis inflammatoriis, suppuratoriisque, mortis prænuncia.

634. Inde etiam patet, quam varia requiratur medela ad sæuitiem huius mali leniendam; quæ tamen omnis cognoscitur, & applicatur, cognita prius indole ipsius symptomatis. Vbi ergo aduertitur affectio spasmodica causa esse, hæc tollitur leniendo acre irritans (603. 604. 605.); id expellendo per vomitoria, purgantia, sudorifera, diuretica, abstersiva; diluendo aquosis calidis; sedando animi affectum; laxando fibras, vasa, viscera (35. 36. 54. 55.); compescendo vim liquidi nervosi per anodyna, & narcotica. Si ab inflammatorio viscido, id solvendo, diluendo, eiusque vasa laxando, impetum denique liquidi vitalis refrænando; huc maxime faciunt potus largus,

calidus, aquæ mulsæ farinosæ nitrosæ subacidæ leuissime aromaticæ; fots, cataplasma, epithema, emplastra applicata locis affectis, quæ fiant ex diluentibus, laxantibus, emollientibus, anodynis; clysmatibus sæpe, parua copia simul iniectis, diu, si fieri queat, retentis, quæ facta sint ex iisdem; vapore aquæ calidæ, emollientibus mistæ, per nares, osque, in pulmones assidue ducto.

635. Si vero vsquam, hic profecto mali atrocitas citam, tutamque medelam efflagitat.



IN ANXIETATE FEBRILI.

SECT. 634.

Vomitoria in febre commoda.

Rec. Oxymell. scillit. vnc. ij.

Aq. stillat. ciccorei vnc. v. M. pro haustu.

Rec. Fol. Asari recent. N. viij.

Cum aq. stillat. card. bened.

F. infusio, spatio quatuor horarum; dein,

Expressæ tincturæ vnc. v. Exhibe pro haustu.

Rec. Vitrioli alb. gr. xxv. F. pulv.

Ex pauxillo cereuisiæ hauriendus.

Purgantia in febribus.

Rec. Crystall. tart. drach. v.

Ex



Ex fero lactis repesfacto.

Rec. *CrySTALL. tart. drach. ij.*

Sal. prunell. gr. xij.

polychrest. gr. xvj. M. F. Pulu.

Rec. *Scammon. gr. vij.*

Cum *Aq. stillat. cichor. vnc. fs.*

F. S. A. emulsio, cui adde

Syr. ros. sol. cum senna drach. xij. F. haustus.

Rec. *Tamarind. vnc. iij.*

Agaric. trochisc. drach. iij.

Fol. Senna drach. j.

Scrophular. mai. aquat. vnc. fs.

Cum *aq. decoct. & express. vnc. viij. adde*

Sal. prunell. drach. fs.

Syrup. ros. solutiu. cum senna, vnc. jfs.

Capiat vnc. ij. omni $\frac{1}{2}$ hora, donec purgari incipiat.

Rec. *Prunor. acido-dulc. vnc. iv.*

Tamarind. vnc. j.

Fol. senn. drach. ij.

Scrophular. aquat. drach. vj.

Cum *aq. decoct. spatio $\frac{1}{2}$ horæ, deinde per pannum express. vnc. xij. admisce.*

Syrup. Cichor. cum Rheo vnc. ij.

Capiat vnc. iij. omni $\frac{1}{2}$ hora, donec purgari incipiat.

Rec. *Electuar. diaprun. Syluii drach. jfs.*

Fol. Senn. pulu. scrup. j. M. F. bolus.

Electuarium diaprun. seu cholagogum Syluii. vnc. fs.

Confectio Hamech. drach. iv.

Hiera picra Galeni. drach. jfs.

Electuarium lenitium. vnc. j.

- - - succi rosarum. vnc. fs.

Sudorifera in Febris.

Sunt semper diluentia & aperientia.

Rec.



Rec. Rad. Apii vnc. ss.

Bardan.

China, ana vnc. j.

Cichor.

Graminis.

Napor.

Petroselin.

Rapar.

Rusci, ana vnc. ss.

Sarsaparill. vnc. j.

Scorzon. vnc. ss.

Fol. Acerof.

Cichor.

Endiu.

Taraxaci, ana m. j.

Flor. Sambuc. vnc. ij.

Sem. contus. Apii,

Petroselini, ana vnc. j.

Cum aq. decoct. pint. iij. exhibe.

Hauriat vnc. iij. calidas omni quadrante horæ, donec leuiter
sudet.

Ex hac Formula infinitæ aliæ concinnari possunt.

Diuretica.

Hydrogala ex lactis recens. p. j. aquæ p. iij.

Serum lactis.

Lac ebutyratum.

Lachryma betulæ.

Succi maturi rec. horæi, aqua diluti.

Sal nitrum.

Nitrum antimoniatum.

Sal polychrestum.

Decocta præcedentia sudorifera cum regimine ad diu-
resin.

Abstersiva.

Sunt eadem.

SITIS

SITIS FEBRILIS.

636. **S**itis ficcitatem, liquorum immed-
bilitatem, acrimoniam falsam,
alcalinam, biliosam oleosam, putrida
excrementa viæ primæ, pro causa sua
habet.

637. Hinc semper fere præsentiam ali-
cuius horum (636.) indicat.

638. Adeoque signat, illa denunciari
mala futura, quæ produci possunt ex iis
causis, quas præsentis esse significat (636.
637.)

639. Quare ei semper, maxime in acu-
tis, succurrendum ilico est.

640. Quod fit: 1. bibendo aquosa,
subacida, nitrosa, demulcentia, calida,
sæpe, parua copia simul. 2. nares, os, fau-
ces, simili potu fouendo, colluendo, gar-
garisando. 3. fofus, epithemata, & cata-
plasmata ex similibus, hypochondriis cir-
cumuoluendo. 4. Clysmatibus similibus
iniectis, & retentis.

641. Si vero valida fitis vna comite-
tur summam debilitatem, tum vinosam,
imo & sæpe spiritibus ditiora, priori-
bus



bus (640.) miscenda, propinanda, tuto
erunt.



IN SITI FEBRILI.

SECT. 640.

Potus commodissimi in febris.

Rec. *Aq. bord. comm. simpl.* vnc. xl.

Rob. Ribesior. vnc. iv.

Sp. Salis tot guttas, quot sufficiunt ad gratum ac-
rem.

Aq. stillat. Cinnam. vnc. j. M.

Pro Potu assiduo.

Rec. *Gelatinae,*

Rob.

Syrupi,

Ribesiorum.

Pomorum cydonior.

Cerasorum nigr.

Berberis.

Mororum.

Baccarum rubi Idæi.

Pomorum granator.

limonior.

citreorum.

aurantior.

chinensium.

Florum cuiuslibet, vnc. iv.

Præpara ut prius; v. g.

Rec. *Gelatinae cydonior.* vnc. j.

Dianthi Nicolai vnc. ij.

Syrup. Acetos. Citrei vnc. j.

Aq. stillatit. Borræg.

Melissæ, ana vnc. iv.

simplicis vnc. xxiv.

Vini Rhenani vnc. iij. M.

Hydro-



Hydrogala.

Serum lactis.

Lac ebutyratum.

Cereuisia tenuissima.

Porus Coffe.

Vini p. l. Aq. puræ p. xij. succi Citrei parum.

SECT. 641.

Rec. *Pomorum elect. rec. citrei, expurgatis seminibus,*
N. ij.

Cum cortice conscissa, abiecta alba, fungosæque carne,
contusæque immitte

Aq. decocti bordei simpl. vnc. xxxij.

Adde *Syrup. mororum vnc. jss.*

Vini Rhenani vnc. viij.

Patris rosti vnc. ij.

In vase fictili clauso seruentur, pro potu assiduus

Vel.

Rec. *Syrup. de limon. vnc. iij.*

Sp. vini puri vnc. jss.

Vini Rhenani vnc. iv.

Aq. comm. puræ vnc. xiv. M.

NAVSEA FEBRILIS.

642. **N**ausea irritum conatum vomendi significat cum idea horro-
ris; causam ergo habet proximam fibrarum muscularium faucium, œsophagi, ventriculi, intestinorum, muscutorum abdominalium leuiorem conuulsionem; hæc fit 1^o. ab acri, putri, bilioso, in vacuo

cuum stomachum pulso, in fauces ascendente, vtraque vellicante, & irritante, vnde reliqua eosdem sequuntur motus; cognoscitur ex inedia, halitu putri, ore, lingua, faucibus fordidis; vel 2°. oritur a lenta, viscida, fluctuante materie, quæ in iisdem locis natando vellicat; cognoscitur ex signis glutinosi prægressi (69. ad 75.); aut 3°. a ventriculo, œsophago, intestinis, & visceribus vicinis leuiter inflammatis; quod scitur ex signis horum propriis 4°. tandem etiam a memoria rei, quæ olim assumpta similes nauseas creauerat; 5°. denique & ab inordinato liquidi nervosi motu, vndecunque excitato; cognoscitur delirio, spasmo, vertigine, tremore.

643. Si diu manet, producit inediam, abstinentiam a potu, & a medicamentis, dein vomitus, & quæ hinc produci possunt mala quam plurima, quorum prædipua debilitas, acrimonia alcalina putrida, siccitas.

644. Sistitur ex prima causa orta (642. N°. 1.) vsu acidi, falsi, aquosi potus, cibi, medicamenti; tum simili leni purgante exhibito; & acido-austeris roborantibus
fibras;

fibras; aut, si his non cesserit, vomitorio dato. Quæ vero ex secunda causa (642. N. 2.) fit, illa tollitur, diluendo, attenuando, purgando, vomitum excitando. At, si ex tertia ortum duxerit (642. N. 3.), tum non cedit, nisi illis morbis curatis, iuxta descriptionem postea in his secuturam. Quarta species obliuione; & vitatione similia abolitur. Quinta autem per austeram, quietem, narcotica, aquam frigidam.

645. Hinc intelligitur, cur in acutis, ubi nausea, purgatio initio data, ut & emeticum, adeo profit, & in quo acutorum genere? Cur ægri acutis cum febribus conflictati adeo horreant pingua, carnosæ, ova, pisces, & contra appetant aquam, acida, fructus horæos, frigida? Cur, nisi nausea superetur, nihil ægro profint medicamina? Cur sæpe hoc symptoma incurabile fit? Cur tales morbi tandem fere cum subito, insolito, mirabili appetitu, secedant?

AD NAVSEAM FEBRILEM.

SECT. 644.

Potus ad primum.

Vid. §. 640. 641.

Q

Potus



Potus ad secundum, & medicamina.

Vid. §. 634.

Ad quintam speciem.

Rec. *Miua cydonior.* vnc. iv.

Syrup. limon. vnc. ij.

Aq. still. vitæ Matthioli. vnc. j.

cinnam. drach. vj.

cort. citrei vnc. vj.

Tinct. opii. gutt. lx. M. accurate.

Capiat vnc. j. *donec nausea sedetur.*

Rec. *Aq. stillatit. menthæ fortis.* q. f.

Bibat vnc. j. *omni $\frac{1}{4}$ horæ frigidam.*

Rec. *Miua cydonior.* q. f.

Assumat drach. j. *omni semibora.*

Rec. *Succi recentis citrei* vnc. fs.

Vini Rhenani vnc. j.

Bene mistis adde

Salis absinthii drach. j.

In ipso actu effervescentiæ potentur.

Rec. *Taleolas tenues citrei, saccharo respersas, impositas lingua ore detineat.*

In omnibus interim iuuant fere epithemata, fomenta, cerata, stomachica, in prius vbi inflammatio abest.

Rec. *Pulu. aromatic. rosar.*

diagalang.

diarrhod. Abb. ana vnc. j.

M. *Insuta sindoni applica epigastrio.*

Rec. *Cerati stomachici Galeni.* q. f.

Vt extensum ad alutam F. emplastr. stomach.

Valet quamdiu adhærescit.

Rec. *Aq. vitæ Matthiol.* vnc. j.

Sp. Rad. angelic.

Carmin. Sylu.

Menthae, ana vnc. ij.

Taleola panis triticei tosti, bene irrorata his, applicetur calide epigastrio, superapplicetur vesica fuilla, oleo bumeetata, & dein supra hanc ligatura, renouetur post xij. horas.

RVCTVS ET FLATVS.

646. **R**uctus pro causa habet elasticam, calore, efferuescentia, fermentatione, dilatabilem materiem, quæ vno momento coercetur, altero, laxato claustro coercente, exploditur cum sono, & impetu.

647. Hinc aër, sales oppositi, fructus horæi, humores putrescentes, vegetabilia fermentantia dant ructui, & flatibus materiem; cuius impetus, fœtorque pro varietate eius indolis varius est.

648. Nec tamen omnia hæc (647.), si libere exhalare queant, vllum dabunt impetum; vnde liquet, spasmos sphincteris œsophagei, œsophagi, oris superioris & inferioris ventriculi, atque intestinorum semper concurrere simul, iterumque laxari; inde ructus, flatus, crepitus, borborygmi clausi.

649. Si concurrunt hæ duæ causæ simul (647. 648.), valide agunt, & diu perstant; tum elastica materies calore, motu, propria vi, excitata in dilatationem, constricta in cauo, cuius fibræ conuulsione constrictæ, membranas claudentes dilatat, tendit, dolere facit, vicina comprimit, vnde dolores, anxietatesque oriuntur intolerabiles, mox ad emissos flatus cessantes. Vid. (220. ad 227. & 631. 634.) Ad hæc autem vis febris accedens inexplicabilia certe tormenta facit.

650. Curatio huius mali fit 1. auferendo materiem (647.) per diluentia; calida aquosa leuiter aromatica dissipantia; salium æquilibrium tollentia in requisitum præpondium; putredinem corrigentia; fermentationem sedantia. 2. Conuulsiones sedantia; lenientia acrium, compescentia spiritus, huc reuocanda. Quorum princeps opium, & lenia antihysterica. 3. Clysmatibus, fomentis, epithematibus, calidis laxantibus, anodynis, leniter aromaticis, vt & cucurbitis, sine scarificatu abdomini impositis.

651. Ex his ipsis (646. ad 651.) respondetur ad hæc, aliter obscura, quæsitæ:
qui

qui cibi, potus, venena, medicamenta flatulenta sint? Cur vacuis visceribus primis accidunt? Cur vulneratis? Cur arte constricto abdomine? Cur hypochondriacis, hystericis, conuulsis, colicisque accidunt?

VOMITVS FEBRILIS.

652. **V**omitum, expulsio violenta contentorum ventriculo primo, dein etiam intestinis, tandem visceribus eo se euacuantibus, agnoscit conuulsionem fibrarum muscularium faucium, œsophagi, stomachi, intestinorum, diaphragmatis, musculorum abdominalium, pro causa proxima; pro remota omne id, quod irritando fibras descriptas, vel facile conuellenda viscera, stimulat.

653. Ergo vitio stomachi conuulsi, inflammati, suppurantis, scirrhusi, cartilaginosi, accedente febre acuta, aliquando accidit, pertinax est, ex idea eius mali cognoscitur, eoque sublato demum tollitur: de quibus postea.

654. Vitio viscerum, & partium circumiacentium, similiter affectorum, distento per ingesta stomacho irritatorum

Q 3

idem

idem toties incognita causa pertinacissimus accidit, accedente febre.

655. Vitio omnis causæ maioris nausæ (642.); vnde cognoscitur, dirigitur, curatur.

656. Si permanet, producit atrophiam, ileum, conuulsiones, & effecta nausæ maioris, & pertinacis (643.)

657. Si vitio causæ (653. 655.) acciderit, curatio ex historia illorum morborum petenda.

658. Si a causa (642. 655.) oritur, remedia eadem (644.) huc in vsum reuocanda diligenter, maxime opiata, & epithemata corroborantia, attrahentia, dissipantia.

659. Hinc liquet ratio difficultatis sistendi vomitus in multis febribus acutis: tum falsitas & periculum regulæ, *vomitum vomitu curatur*: Cur sæpe sudorifera vomitum tollant, vt in peste; cur sæpe sistatur ille facta crisi, vt in variolis? Cur sæpe missu sanguinis, vt in acutis inflammatoriis? Cur, quibus initio febris acutæ vomitus perpetuus sine causa inflammatoria, diarrhœa pro crisi, quæ caueatur dato in principio morbi emetico? Cur
vomi-

vomitus omnis ingesti, statim ac receptum est, pessimus in acutis fit? ex iisdem singultus nasci, & sanari potest.

DEBILITAS FEBRILIS.

660. **D**ebilitas ingens sequitur impeditum influxum & pressionem liquidi neruosi in musculos.

661. Quod impedimentum ab inanitate vasorum, exhausto liquido, ab immeabilitate liquidi, obstructione canalıs, compressione huius, maxime circa originem suam in cerebro & cerebello, debilitate cordis.

662. Priorem causam demonstrant symptomata magnarum euacuationum prægressa, & præsentia, vt est diurnitas morbi; hæmorrhagiæ morbosæ, artificialesque; sudor; diabetes, saliuatio, diarrhœa; defectus cibi assumti, retenti, digesti, intropulsi; pallor; macies; pulsus paruus; vasa collapsa; musculi flaccidi.

663. Immeabilitas liquidi glutinosi, vel inflammati, cognoscitur ex signis datis (69. 70. 71. 72. 73. 74.)

Q 4

664.

664. Canalis autem obstructio ex (107. ad 144.)

665. Cerebri & cerebelli compressio causa debilitatis perspicitur ex obseruatis iis functionibus simul læsis, quas ab iis integris pendere certo nouimus; vt si deliria, sopor, tremor, vertigo, tinnitus simul adsint.

666. Sed a debilitate cordis scimus ex signis deficientis circulationis (106.)

667. Cibi liquidi, sanguini similes, arte digesti, gelatinosi, blandi, ex animalibus, vegetabilibusque, vinosi, & aromaticis, secundum artem misti, sæpe, parua dosi dati, cum leni frictione externorum, repletionem efficiunt commodam; inprimis si sumuntur ex idonea, contra morbi ingenium, materie.

668. Si ex immeabilitate liquidi (663.) remedia adhibenda (75.) & (132. ad 137.), aliter enim nil contra hanc speciem prodest.

669. Vt & (664.) curatio petenda ex (124. ad 144.)

670. Illa autem, quæ ex (665.) oritur, vt plurimum tollitur his, quæ illi loco applicata, deobstruere possint impactum

(124.)

(124. ad 144.), & impetum auertere in alia loca. Id fit humectando nares, caput, faciem, os, collum, fomentis blandis; applicando pedibus epispastica.

671. Debile cor raro, nisi lente, iuuatur; generalia vero dicta (667. ad 671.) prodesse possunt.

672. Inde (660. ad 672.) nobis constat, quam rarus sit cardiacorum in acutis intellectus; quam sit debilitas in febribus malum sæpe insuperabile.

IN DEBILITATE FEBRILI.

SECT. 667.

*Fus ex carne bubula,
vitulina,
ouilla.
gallinacea, ana.*

Decocta in aq. resperge pauco sale & succo citrei.

Lac recens.

Decocta §. 28. N. 1.

CALOR FEBRILIS.

673. **C**alor febrilis thermoscopio externus, sensu ægri, & rubore urinæ internus cognoscitur.

674. Semper requirit maiorem ignis copiam in illo loco, quem plus calefacit.

Q 5

675.

675. Quæ ortum debet violentiori partium fluidarum in se mutuo, in vasa, horum in illas attritui.

676. Illa violentia a magno motu partium ex corde, & magna resistantia vasorum contra cor, oritur.

677. Magnus motus ex corde pulsus sanguinis æstimatur a densitate liquidi pulsus, & velocitate eius per vasa.

678. Densitas scitur ipso conspectu extrauasi, dissipatione prægressa rarioris, duritie pulsus.

679. Velocitas supputatur ex ictuum cordis numero, collato cum magnitudine pulsuum.

680. Magna resistantia cognoscitur ex mole mouendorum inertium, & paucitate, vel angustia, vel immobilitate canalium transmissurorum.

681. Moles mouendorum ingens percipitur ex signis plethoræ (106.), caco-chymia, vel solutorum iam cito liquidorum, quæ antea stagnabant; vt in obesitas: maxime inflatus venarum cum arteria veloce & magna simul eius præsentiam docet.

682. Vasorum paucitas ex historia ob-
structio-

structionis (107. ad 124.), vel vulnerum (145. ad 331.), colligitur.

683. Angustia vasorum intelligitur conspectu, tactu, cognita temperie sicca, ad parua motus augmenta magno augmento caloris.

684. Immobilitas canalium, qua suæ dilatationi valde resistunt, cognoscitur omni signo rigidarum fibrarum, vasorum, viscerum (32. 33. 34. 50. 51. 52. 53.)

685. A tot causis proximis (674. ad 685.) pendet origo caloris febrilis; quarum iterum infinitæ numero & varietate aliæ remotiores esse possunt.

686. Potest vero increescere ex incremento vnius harum causarum solitario, tumque se habet augmentum caloris, vt augmentum causæ.

687. Si rursus duæ causæ increescunt simul, habebit se auctus calor, vt productum incrementorum causarum, si multiplicentur per se mutuo.

688. Qui idem calculus in cæteris obtineri potest.

689. Calor auctus liquidissima dissipat ex nostro cruore, id est aquam, spiritus, sales, olea subtilissima; reliquam massam
 fccat,

ficcat, densat, concrefcere cogit in immeabilem, irrefolubilem materiem; fales, oleaque expedit, attenuat, acriora reddit, exhalat, mouet: hinc minima vafa atterit, rumpit; fibras ficcat, rigidas, contractasque reddit; hinc fubito multos, celeres, periculofos, lethales morbos producit; qui a priori facile deduci poffunt.

690. Ex his demum intelligi bene potest, quid requiratur ad mitigandum calorem, & quam varia eo remedia fpectent.

691. Si fola velocitas aucta calorem facit, remedio erit quidquid eam minuit. Quies muscularis, & animi, miffio fanguinis; leuis brevisque compreffio venarum in artubus, frigidorum lenta & blanda applicatio interna atque externa, diacodiata prudenter affumta, primaria.

692. Si a denfitate (678.), curatur iis, quæ velocitatem minuunt 691.); tum aquæ potu; & oxymelle; iisque, quæ vafa laxant.

693. Moles mouendorum in plethora facile fuperatur (106. §.); in cacochymia lente, & per vices euacuando, corrigendo; in folutis pinguibus, prius ftagnantibus, maxima difficultas: tum aquofa, acida,

acida, mellita, vitelli ouorum, saccharina summi vsus sunt, vna cum euacuantibus assiduo vsurpatis.

694. Obstructio calorem pariens (682.) ex curatione obstructionis (125. ad 144.), & ablatis vasis in vulnere superuenientium malorum sanatione, intelligitur.

695. Ab angustia vasorum si pendet (683.), requiritur horum dilatatio per laxantia (54.)

696. Quibus iisdem (54.) tollitur calor ex nimia vasorum rigiditate ortus.

697. Quoties autem excessus caloris ex combinatis oritur causis, toties remedia, hucusque descripta, (690. ad 697.) combinata inter se valebunt.

698. Ex tota hac doctrina caloris (673. ad 698.) intelligi potest, cur febris calidissima sit acuta, celeris, putrida; & in calore summo pestifera? Cur lecti, aëris clausi, victus, medicamentorum calor adeo his noceant? Cur æstus circa cor, & hypochondria, tam malus? Calor putrefacit, putredo facta ex se non calefacit.

699. Quin ex eadem perspicitur origo, natura, efficacia siccitatis; & curatio inde dirigitur, quæ potu, fotu, balneo, clysm-

clysmate, gargarismate, ex aquosis, subacidis, mellitis, laxantibus fit.

DELIRIVM FEBRILE.

700. **D**elirium est idearum ortus non respondens externis causis, sed internæ cerebri dispositioni, vna cum iudicio ex his sequente, & animi affectu, motuque corporis inde sequente: atque his quidem per gradus auctis, solitariis, vel combinatis, varia deliriorum genera fiunt.

701. Ponit ergo semper cerebri medullosi affectionem morbosam; quæ ab obstructione quacunque; impedito influxu, transfluxu, effluxu per cerebrum; violentiori velocitate; stagnatione; & plurimis sane causis oriri potest; ad quas inuestigandas serio incumbendum, vt fiat curatio.

702. Nam pro varietate illarum (701.) diuersa remedia, & medendi methodus debent eligi: pediluua, epispastica pedum & poplitum; frictiones harum partium; clysmata diluentia sæpe applicata, victus tenuis; potus sedans, deobstruens, dilu-

diluens; medicamenta ad caput emollientia; emetica quandoque; purgantia; leuia anodyna; cruoris ex pede emissio; hæmorrhoidum solutio; menstruum laxatio, primaria habentur.

COMA FEBRILE.

703. **C**oma est in febre assidua somnolentia cum effectu, vel sine eo; ponit vbiq; eum in cerebro statum, vnde impeditur sensuum, motuumque animalium exercitatio; qui oriri potest a defectu appellendi liquidi arteriosi ad cerebrum; aut ab impedito eius circulo per cerebrum, aut ab impedita secretione spirituum a sanguine in neruos; aut ab denegato horum per neruos fluxu, & refluxu.

704. Hinc plurimæ, diuersæ, & sæpe contrariæ causæ hunc affectum in febre producant, quales sunt omnes vehementes euacuationes, aut repletiones; omnes causæ cerebrum ipsum comprimentes, qualescunque fuerint; quæ eadem in neruos, si agunt, eadem fere efficiunt.

705. Vnde iterum patet medico per signa prius indagandam causam illam singula-

gularem esse, antequam definire queat, quid applicandum sit, & quomodo: nam sæpe contraria exiguntur; & sæpe comā diu pertinax, irritō tentatis omnibus, sponte tandem cessat, pepasmo febris absoluto.

706. Illa autem, quæ delirio, hic apta (702.), inprimis fomenta capiti, colloque applicata.

707. Si autem magnæ inflammationis signa adsint, curandum ut morbus princeps, de quo postea.

PERVIGILIVM FEBRILE.

708. **C**ontrarium illi malo (703.) est pervigilium; unde intelligitur: & pro causa habet plerumque leuissimæ inflammationis cerebri prima initia, quibus auctis in coma mutatur sæpe.

709. Curatur quiete musculari corporis; pace mentis; absentia obiectorum sensuum; frigore modico: aëre humido; victu blando emolliente; potu farinoso, leni, emolliente; susurro leni, assiduo, grato, blande tinnulo; medicamentis farinosis, tuboleosis, humectantibus, demul-

demulcentibus; odore vegetabilium soporiferorum; usu anodynorum, paregoricorum, soporiferorum, narcoticorum; præmissis semper, quæ inflammationi curandæ, & compescendo eius incremento, valent.

CONVULSIO FEBRILIS.

710. **C**onuulsio prius descripta (230. ad 239.) hic semper a vitio cerebri, quod vel ab inferioribus per nervos. (627. 631. 632. 633. 642. 648. 649. 652. 653. 654.) cerebrum vellicantibus afficitur; vel ex inordinato appulsu, transfluxu, egressu liquidi cerebrosi, quod oriri potest ex omni illa causa, quæ deliria, comata, perurgilia creare potest (701. 702. 703. 704. 708.), quare iterum magna hic varietas in ætiologia, & curatione.

711. Si diu perseverat, commercio nervorum facile totum genus nervosum afficit, vnde tristia mala.

712. Si inflammationis cerebri signa prægressa subsequitur conuulsio, fere lethalis. Si post urinam crassam prius emissam mox aquosa, pellucida, exit, dein conuulsio fit, pessima est: si in febre post

R

ma-

magnas euacuationes oritur conuulsio, & hæc fere lethalis: vt & quæ cum delirio perpetuo.

713. In curationem prius peruestiganda est causa singularis (710.), & locus primario affectus, vnde conuulsio ortum habet (710.), dein ocysus medicamenta applicanda illa, quibus acre leniri, impactum resolui, contractum laxari possit. Vnde diluere, laxare, reuellere, lenire, fere sanare solent conuulsiones hæc; nec vnquam specioso antispasticorum titulo fides adhiberi debet.

714. Si autem caput primario affectumprehenditur, debet curatio fieri dicta (706.).

SVDOR FEBRILIS.

715. **S**udor in initio acutæ febris, cuius causa paulo pertinacior, pro causa habet vasorum extremorum laxam debilitatem, cruoris circulationem vehementem, facilem aquæ ex reliquis sanguinis principiis expeditionem.

716. Si perennat, orbat sanguinem liquido diluente, reliquum inspissat, obstructions facit lethales, sanguine postea
vix

vix diluentibus vel resoluentibus auscultante; vnde omne fere morborum acutorum genus produci potest.

717. Ergo initio semper cohibendus, nisi constet, materiem morbi adeo tenuem esse, vt cum primo sudore diffari possit.

718. Prohibetur surgendo ex lecto; sedendo; corpus a nimis integumentis liberando; calidis, calefacientibusque abstinendo; potu plurimo leni, blando, frigidiusculo sæpe vtendo, vt amissi damnum resarciatur cito, circulationem nimis velocem refrænando (102. ad 106.).

DIARRHOEA FEBRILIS.

719. **D**iarrhœa pro materie habet mucum, lympham, gluten, pus, faaniem, sanguinem, narium, oris, faucium, œsophagi, ventriculi, hepatis, vesiculæ fellis, pancreatis, intestinorum, mesenterii; pro causâ vires in intestina expellentes validas, dum in ipsis intestinis contrahentes vires debiles, vel in vasis intestinorum absorbentibus impedimenta, ne admittant.

720. Quare liquet, fluorem alui in febribus

R 2

bribus multiplicem esse quoad materiem; causam; effectus; euentum; adeoque sæpe omnino incurabilem esse; & raro colliquatium, eumque vix vnquam medicabilem.

721. Si continuatur diu, viscera abdominalia magis magisque in eundem morbum disponit; eadem labefactat; exco-riat; inflammat; reliqua autem vasa & viscera emungit, exhaurit; hinc atrophia, macies, debilitas, dysenteria, inspissatio fluidorum per totum habitum corporis; solidorum laxitas; fluidorum iactura; leucophlegmatia; hydrops; tabes.

722. Sanatio absoluitur acris irritantis lenimine; expulsu per emetica, purgantia, clysmata; corroboracione laxi; pacatione impetus per narcotica; determinatione aliorum per sudores, vrinasque; subductione materiæ morbosæ, correcto eius fonte primo.

EXANTHEMATA FEBRILIA.

723. **P**ustulæ inflammatoriæ habent vt plurimum pro materie aliquid, quod minima vascula cutanea transire non potest, sed ibidem hæret; pro causa autem

autem vim vitæ circulatoriam, secretoriam, excretoriam; vnde pro variis hisce causis valde multiplices sunt, vnde febres nomen dein accipiunt, erysipelatosæ, scarlatinæ, petechiales rubræ, petechiales purpureæ, morbillosæ, variolosæ.

724. De tribus posterioribus seorsum tractari solet: de tribus primis autem facile diagnosis & prognosis formari queunt.

725. Curatio difficilis non est, quum raro quidquam requirant, nisi vt satis larga levis liquidi copia mobilis seruetur materies, atque vis vitæ in iusto moderamine perseveret assiduo; tum enim breui cum desquamatione epidermidis abeunt.

726. Reliqua febris symptomata his similia & agnata, velut morbi ipsi curari postulant.

727. Hinc patet, quid sentiendum de febrium acutarum varietate; nam quæ motum febrilem semel excitatum vno impetu ad finem perducunt, *continuas* vocamus; quæ per vices impetum remittunt, & denuo excitant, vt semper duret febris, *continuas remittentes*; quæ per vices impetum remittunt, vt plena ἀπὸ τοῦ ἐξῆς, inter

duos quosque paroxysmus intercedat, vocantur *intermittentes*.

FEBRIS CONTINVA.

728. **C**ontinuarum simplicissima ephemera, seu diaria, spatio 24. horarum initia, incrementa, statum, declinationem absolvens. Causas agnoscit solum motum vehementiorem, peccato sex rerum non naturalium ortum; vix ullam materiam. Cognoscitur; a causa leui; corpore puro; symptomatibus leuibus; crisi cita; pulsu mox a febris exitu plane restituto. Curatio facilis, abstinentia, quiete, dilutione.

729. Si protrahitur dicta febris (728.) per plures dies, vocatur continua non putris; causæ, signa, medela eadem; maxime venæ sectione larga, & refrigerantibus, eget.

FEBRIS CONTINVA PVTRIDA.

730. **S**ynochus putris dicta fuit, quæ debetur causis inflammatione simplici maioribus, viscerum obstructioni, cutis oppilationi, & capillarium fere omnium, acrimoniæ vero acutiori, sæpe prorsus singulari.

731.

731. Cognoscitur calore digitum tangentem quasi pungente, pulsu febrili, sed & inæquali, & non ordinato, vrina crassa, rubra, turbida, cruda sine sedimento, temperie, ætate, habitu, calidis, sanguinolentisque.

732. Hæc *homotonos*, *epacmaſtica*, seu *anabatica*, vel *paracmaſtica*.

733. Ex quibus prior salutaris : pessima secunda: melior tertia.

734. Pulsus quo debilior, frequentior, inæqualior robore, inordinatio tempore, intermittentior ictu; respiratio quo difficilior, frequentior, anhelosior, cum narium pinnis magis motis, quo magis dolens circa vitalia, quo inordinatio; lassitudo quo vehementior, debilitas maior, iactatio corporis frequentior, decubitus in dorsum, extensis membris, frequentior; rationis, affectuum, quo usus perturbatio; appetitus magis prostratus, digestio molestior, vrina rubicundior, crassior, turbidior, cum sedimento minori, vel & tenuior, magisque aquosa, parcius, minus retinenda; motus quo magis tremuli, tactum refugientes, ludentes, carpentes; oculi, quo luctuosiores, inuolun-

tariis lachrymis humidiores, eo morbus hic (730.) peior, lethalior.

735. Sed ubi somnus difficilis & male cedens, pustulæ purpureæ, vel liuidæ corpus deturpant, hypochondria tensa & inflata, fere moritur.

736. Curatio ante tradita pro indicantium varietate, symptomatum vehementia, ægri conditione, statuque morbi variata nihil singularis requirit.

737. Has dixit συνέχης vetustas, continentes schola, quia nulla in his feruoris remissio : συνεχῆς vero, siue continuas (727.), quæ continuæ remittentes.

FEBRIS ARDENS.

738. **Q**uas inter causas, siue ardens dicta febris meretur singulatim discuti ob frequentiam, discrimen, sanandi laborem.

739. Huius symptomata primaria, calor ad tactum fere vrens, inæqualis diuersis locis, ad vitalia ardentissimus, (in extremis sæpe remissior, imo aliquando frigus), ipsum aërem exspiratum incendens; siccitas in cute tota, naribus, ore, lingua; respiratio densa, anhelosa, cita; lingua
ficca,

ficca, flaua, nigra, exusta, aspera; fitis in-
explebilis, sæpe subito sublata; fastidia
cibi, nausea, vomitus; anxietas, inquie-
tudo, lassitudo summa; tussicula, vox
clangosa; delirium, phrenitis, peruigi-
lium, coma, conuulsio, diebus imparibus
exacerbationes.

740. Causa labor nimius, iter lon-
gum, æstus solis, fitis diu tolerata, vsus ca-
lescentium, fermentatorum, aromati-
corum acrium, veneris nimiae, delassatio
immodica, maxime æstate &c.

741. Decursus talis, tertio & quarto
die sæpe lethalis, septimum raro transit si
perfecta; soluitur sæpe hæmorrhagia,
quæ si tertio vel quarto die parca, lethalis;
hæc prænunciatur ceruicis dolore, tem-
porum grauitate, tenebricosa caligine,
præcordiorum contentione sine doloris
sensu, inuitis lachrymis sine lethali signo
alio, rubore faciei, pruritu narium, opti-
ma fit die decretorio; soluitur & die de-
cretorio, vomitu, aluo, sudore, vrina, spu-
to crasso; accessio die pari pessima, si id
ante diem sextum; vrina nigra, pauca,
tenuis huic lethalis; lethale sanguis spu-
tum; lethalis sanguinis mictus; degluti-

R 5

tio

tio læsa mala; extremorum refrigeratio pessima; facies rubra & sudans mala; parotis non suppurans exitialis; aluus nimis fluxa lethalis; cum tremore abit in delirium, inde in mortem, transit in peripneumoniam sæpe cum delirio; post ingentia alui tormina quæ oritur pessima; soluitur critice cum rigore.

742. Quibus explanatis haud difficulter morbus præsens cognoscitur: neque de eius causa propiori, & proxima ambigetur; est enim a cruore orbato parte blandiore, liquidiore, inflammatione pervniuersum corpus, viribus validioribus. Quin præsagia haud infirma hinc deducuntur.

743. Curatio exigit aërem purum, frigidum, renouatum sæpius; integumenta minime suffocantia, vel aggrauantia corpus; situm corporis erectum sæpe; potus copiosos, blandos, demulcentes, subacidos, aqueos, calidos; cibos leues, farinaceos, hordeatos, auenaceos, ex fructibus subacidis confectos; venæ sectionem, si morbi initium, plethoræ indicia, inflammationis singularis signa, calor intolerabilis, rarefactio nimia, revulsio necessaria,

faria, symptomata vrgentia, neque alio remedio facile superanda, hanc exigunt; clysmatum blandorum, diluentium, laxantium, antiphlogisticorum, refrigerantium applicationem repetendam, prout vis ardoris, siccitas alui, reuulsio, requisita imperat: humectationem totius corporis, hauriendo aërem fumo calidæ blandum per nares, colluendo os, & guttur, lauando pedes, manusque tepida, fouendo spongiis calidis loca, vbi plurima vasa contactui magis exposita; medicamenta aquosa, blanda, nitrosa, grato acore sapida, aluum lenissime laxantia, vrinæ materiem suppeditantia, supplentia, sudori vehiculum copia præbentia, non acrimonia, omnem contractionem fibrarum, crassitiam liquorum, acrimoniam eorundem soluentia, diluentia, temperantia.

744. Quibus qui adiunxerit dicta in regulis vniuersalibus de cura acutarum, harumque symptomatum, & secutura de acutis in perniciem viscerum singularium tendentibus, liquido perspecta habebit ardentis febris cuiuslibet remedia.

745. Quin & reliquæ febres acutæ singulares ex dictis intelliguntur, vel ad sympto-

ptomata singularia pertinent, vel sunt alius morbi acuti effectus.

FEBRIS INTERMITTENS.

746. **F**ebbris intermittentis definitio iam data (727. 737.) huius diagnosis sponte patet, distinctio in varias classes facilis, utpote soli temporis differentiae innixa. Septenaria exquisita quandoque accidit, ut vidi.

747. Tamen scire est, hanc in genere esse *vernalem*, quæ a Februario in Augustum, & *autumnalem*, quæ ab Augusto in Februarium dominatur. Distinctione necessaria ob varios mores, symptomata, exitus, durationem, curationemque febris; quin una aliam fugat.

748. Quin & sæpe initio autumnæ æmulantur exacte indolem continuarum, ob longiores & duplicatos paroxysmos, dum tamen indoles & curatio plane diversæ sunt.

749. Incipiunt cum oscitatione, pandiculatione, lassitudine, debilitate, frigore, horrore, rigore, tremore, pallore extremorum, respiratione difficillima, anxietate, nausea, vomitu, pulsu citato, debili,

bili, paruo, siti maxima. Hæc prout maiora, pluraque simul, eo febris peior, atque in subsequente tempore calor, & cætera symptomata peiora: & hic gradus febris primus, incremento respondens continuarum, & reliquorum maxime periculosus; vrina tum vt plurimum est cruda, & tenuis. Incidens cadauera mortuorum in primo hoc stadio febris intermittens, post anhelitus, suspiria, ignauiam, inueni sanguinem crassum, impactum pulmonibus, semper tum fuerant pulsus parui, frequentes, inordinati. Haru. exercit. anat. Cap. 16.

750. Hunc statum (749.) excipit alter, incipiens cum calore, rubore, respiratione forti, magna, liberiore, anxietate minori, pulsu maiori, robustiorique, siti magna, dolore artuum & capitis magno, vrina plerumque rubra respondet ἀκμῇ febrium continuarum.

751. Tum vltimo ingens plerumque sudor, remissio omnium symptomatum, vrina crassa, sedimentum lateri contuso simile, somnus, ἀπυρεξία, lassitudo, debilitas.

752. Sæpe abeunt in acutas, periculosas;

fas; quod calori nimio, & motui excitato nimis, vt plurimum debetur.

753. Febris intermittens sua tria tempora (749. 750. 751.) percurrentes, fibris minimis vasculorum & viscerum magnam infert vim, stagnando, obstruendo, coagulando, pellendo, resoluendo, attenuando; hinc debilitantur vasa, morbofa fiunt liquida, eo in primis genere mali, quo partes minus assimilatas, nec æqualiter mistas habent; ex quibus simul acrimonia exoritur; vnde ab omnibus simul facillima in sudorem procliuitas multum debilitans, ipso viscido sanguinis transsudante; tum vrina mire crassa, turbida, iumentosa, pinguis; similis saliuæ; inde debilis, solutus, vix cohærens cruor optima parte spoliatus, residua acer & crassus simul; adeoque ex laxis vasis, & crassis acribusque liquidis hæ febres diuturnæ dein terminantur aliquando in chronicos, scorbutum, hydropem, icterum, leucophlegmatiam, tumores scirrhosos abdominis, & quæ hinc sequuntur mala.

754. Cæterum, nisi malignæ (753.), corpus ad longævitatē disponunt, & depurant ab inueteratis malis.

755. Vnde post accuratum examen totius hiftoriæ intermittentium (746. ad 755.), caufa proxima constituitur, viscofitas liquidi arteriosi, forte & neruosi tam cerebri quam cerebelli, cordi destinati inertia, superueniente dein caufa quacunque velocioris & fortioris contractionis cordis, atque resolutionis eius quod stagnauerat.

756. Adeoque, quum ordo hic (749. 750. 751.) semper in febre intermittente obtineat, videtur is, qui primum tempus (749.), & primam causam (755.), superare possit, etiam totum illum paroxysmum posse tollere.

757. Dein, quum infinitæ causæ, eæque satis exiguæ, possint primum statum (749.) febris perfecte intermittentis (727. 737.), eiusque causam (755.), producere; atque tales plurimæ in ipso corpore nasci, crescere, & dato tempore adulescere queant, vt in omnibus, in corpore natis, atque secretis, liquoribus fit; difficilior est ex infinitis possibilibus natam iam distinguere, quam vnam possibilem excogitare, qua posita ratio periodorum dari ex
legi-

legibus œconomix nostræ possit; id autem examinanti patefcit.

758. Curatio ergo exigit, vt aperientibus salinis, alcalicis, aromaticis, mineralibus, diluentibus, oleosis blandis, calore, motu, fotu, frictione vtamur tempore *ἀπυρεξίας*, vel & in statu descripto (749.).

759. Quin abundanti colluiei in primis viis, purgans, vomitoriumue sæpe prodest tollendæ; dando ante paroxysmum eo spatio, quo ante hunc effectum præstat. Id faciendum cognoscitur ex victu, morbis, symptomatibusque prægressis, nausea, vomitu, ructu, tumore, halitu, fordibus linguæ, gutturis, palati, *ἀπυρεξία* amarore oris, vertigine tenebricosa; & absoluta operatione dato opiato sedatus ante febrim tumultus sit.

760. Vt & prodest idem (759.), dum stimuli instar mouet vtrumque (759.).

761. Aliter nocet (759.), dum debilitat, liquidissima elicit, digestiones, hic in primis necessarias, turbat; sicque diuturnitatem morbi, vel & mortem producit. Frigus, & febris sudorifero hic tollitur sæpe, dum aliquot ante tempus cognitum futuri paroxysmi horis liquido aperiente, dilu-

diluente, leuiter narcotico, repletur corpus ægri, dein vna hora ante malum excitatur sudor, & continuatur, donec binæ ultra tempus initii paroxyfmi elapfæ fint horæ.

762. Hinc & venæ fectione nocet per fe femper, prodeft alias cafu, vt & tenuis exactaque diæta.

763. Dum febris in ftatu, (750.) indicantur aquofa, calida aëtu, fubacidis aperientibus nitrofisque permiftis, vel & cichoraceis, fimilibusque blandis aperientibus, quiete. Calore moderato tunc æger eget.

764. Vbi crifi paroxyfmius foluitur (751.) prodeft, ptifana vinofa, iufculis carniū, decoctis temperatis, fudori, vrinæque reddere materiem; ficque hæc non vi caloris, medelæ, ftragulorum, exprimere, fed copia aucta promouere quam blandiffime, & diu.

765. Porro fymptomati vrgenti occurratur iuxta regulas in acutis datas (617. ad 726.).

766. Sublata febri, viëtū analeptico, medicamentis corroborantibus æger re-

S

ficiun-

ficiendus, dein aucto robore purgandus per alium aliquoties.

767. Si autem febris autumnalis vehemens; corpus ex ægritudine debile; morbus iam aliquo tempore durauit; neque signa adsint internæ inflammationis; neque collecti alicubi puris, neque obstructi admodum huius illiusue visceris, cortice Peruuiano abigetur, pulueris, infusi, extracti, decocti, syrapi forma, cum propriis additis requisitis, tempore ἀπυρεξίας debito ordine, dosi, regimine, adhibito.

768. Quin & epithemata sæpe iuuant; & inunctiones spinæ dorsæ; & adstringentia epota.

769. Vt singularis fiat curatio singularum, notetur 1. intermittentes veras quo minori spatio quiescunt, eo finire citius, & contra. 2. eo itidem plus accedere ad acutarum genus, & in has mutari. 3. causam eo mobiliorem forte, & copiosiore habere. 4. hinc vernaes, superueniente calore, sponte solui. 5. autumnales, accedente frigore, increfcere. 6. inde liquere, quibus febribus medicina faciunda, & qualis.

IN



IN FEBRI INTERMITTENTE.

SECT. 758.

Medicamenta huc referenda.

Sales herbarum Tacheniani omnes, quorum præcipui ex

Abſinthio,

- - Carduo bened.

- - Stipitibus fabarum,

} parantur.

Nitrum.

- - - Stibiatum, &

Stibium diaphoreticum non ablutum.

Sal Ammoniacus.

Prunellæ.

Polychrestus.

Tartarus regeneratus.

- - - tartarifatus.

Sal tartari cum ol. terebinth. in ſaponaceam maſſam re-
ductus.

Herbæ omnes aromaticæ in omnibus ſuis partibus. *Vid.*
totum §. 75. N. 5. §. 54. N. 4. maxime ad titulum
reſoluentium.

SECT. 759.

Vomitorium.

Rec. *Tart. emetic.* gr. v.

F. Pulu. *Vna doſi ſumendus,*

Rec. *Tart. Emetic.* gr. v.

Micæ Panis q. ſ.

Vt F. Pil. N. v. *Pro vna doſi.*

Rec. *Vini emetici.* vnc. ij.

Oxymell. ſcilliz. drach. vj. M. F. *Haustus.*

Rec. *Tart. emetici* gr. v.

Gelatina ribeſior. vnc. ſc.

Ol. cinnam. gutt. j. M. F. *Bolus.*

*Purgans.*

Rec. Pulv. Cornachin. scrup. ij. Pro una dosi.

Potus.

Rec. Pil. Coch. mai. scrup. ij.

Syrup. Rosar. solut. vnc. fs.

Aq. still. flor. sambuci vnc. ij. F. haustus.

Pilula.

Rec. Aloes lotæ gr. xij.

Myrrhæ gr. x.

Opopanax. gr. v.

Sal. gemmæ gr. v. M. F. Pil. N. ix.

SECT. 761.

Sudoriferum antipyreticon raro fallens.

Rec. Sal polychrest. drach. ij.

Syrup. 5. rad. aperient. vnc. ij.

Opii puri gr. ij.

Aq. stillat. ferment. Card. bened.

Absinthii,

Rutæ,

Maioranæ,

Menthæ, ana vnc. j.

Extract. absinthii vnc. ij. M.

Capiat cochleare j. omni quadrante horæ : superbibendo vnc. iv. sequ. decocti post singula quæque.

Rec. Rad. Imperat. drach. vj.

Ligni Sassafr.

Santal. rubr. ana vnc. ij.

Fol. Virgæ aureæ m. ij.

Flor. Centaur. min. vnc. fs.

Semin. contus. Dauci Crezici drach. vj.

Infusa vase arête clauso per horas ij. absque ebullitione,
sed

sed fere feruida, dein parum ebulliant, tum decocti
pint. ij. exhibe.

SECT. 763.

Vid. 634. 640.

SECT. 767.

Rec. Cortic. Peruuiani boni vnc. j.

F. Pulu. diuidend. in xij. doses; exhibe.

Capiat omni biberio unam ex vino.

Rec. Cortic. Peruuiani vnc. iij.

Aq. comm. vnc. xii.

Infusa, spatio duarum horarum, dein per horam ebul-
liant: tum adde

Vini Gallici. vnc. iv.

Ebulliant rursum parum in vase alto; dein decoctum
purum exhibe.

Capiat. vnc. ijs. omni biberio.

Rec. Cortic. Peruuiani vnc. iij.

Vase clauso spatio 2. horar. in aq. comm. decoctæ, vnc.
xvj. exhibe.

Capiat ut præcedens.

Rec. Decoctum præced.

Exhala ad mellis spissitudinem,

Sumat diuisum in iv. doses.

Rec. Extractum præced.

Dilue in Syrupi 5. rad. aperient. vnc. j.

Erit Syrupus; Vsus ut extracti.

Rec. Extractum præced.

Admisce pulu. glycyrrh. q. s.

Vt F. Pil. gr. iv. Consumat omnes spatio ἀπογεῖλας.

SECT. 768.

Rec. Ol. Scorpionum,

S 3

Casto-



Castorei,
Baccar. iuniperi,
Camphoræ de radicibus cinnamomi,
Laurinum,
Tberebintb.

Balsam. sulphur. terebintb. ana vnc. ss.
M. Pro linimento descripto.

Rec. Plantagin. totius latifol. vnc. x.
Rad. Tormentill. rec. vnc. ij.

Decoct. in aq. pint. ij. exhibe.
Bibat vnc. iij. omni biborio.

Rec. Alumin. rup. drach. j.
Nucis myristic. drach. ij.
Pulu. boli Armen. gr. xij. M. F. Pulu.
Hora una ante paroxysmum hauriendus.

Epithemata.

Rec. Vuar. Corinthiac.
Summit. lupuli.
Sal. marin. ana vnc. ij.

Contusa in pultem,
Pulsuum locis applica ad arterias.

Rec. Summit. rutæ virid. vnc. ij.
Semin. sinapi. drach. ij.
Contusa exhibe ad epicarpia.

MORBI ACUTI FEBRILES.

770. **N**unc morbi acuti considerandi,
 qui febre stipati acuta, tamen
 singularem inflammationem inducunt
 huic illiue organo, vnde ab eius functio-
 ne læsa toti morbo imponitur nomen.
 Tales

Tales sunt phrenitis, coma, carus, angina, peripneumonia, hæmoptoe, pleuritis, inflammatio mammarum, diaphragmatis, ventriculi, hepatis, lienis, mesenterii, intestinorum, (dysenteria, ileus, voluulus, tenesmus, hæmorrhoides, colica bibliosa,) renum, vesicæ, vreterum, vteri, iuncturarum, exteriorum in morbillis, variolisque.

PHRENITIS.

771. **S**i ferox & perpetuum delirium a cerebro primario affecto cum febre acuta continua oritur, vocatur *phrenitis vera*.

Si a malo aliunde in cerebrum delato in febre, inflammatione, &c. *phrenitis symptomatica*, παραφροσύνη, desipientia, dicitur.

772. Antecedunt *veram*, calor, dolorque internus capitis ingens, & inflammatorius; sanguinis copia nimia; dispositio inflammatoria; rubor oculorum, faciei; somni turbulenti; desipientia levis; adolescentia; calidorum usus; insolatio; vigiliæ; ira; mœror; proteruita seu ferocitas; obliuio subitanea; ficci-

tas totius, maxime cerebri; collectio floccorum.

Alteram vero omnis fere morbus acutus cum febris; dolor lateris non pleuriticus cum leui perturbatione animi; inflammatio pleuræ, pulmonis, diaphragmatis, quæ pessima; hanc præfagit lingua nigra, alius suppressa, vrina retenta, fæces albæ (hæ lethales vbique), vrina pallida, decolor, tenuis, *αδρυσία*, ferocitas, rubor, vrina cum suspensio nigro, vigiliæ, signa instantis inflammationis in capite.

773. Vtraque (772.) vbi præsens est, hæc habet symptomata. 1. Idearum sensilium deprauationem, vt & sensuum internorum, & rationis, & affectuum. 2. ferocitatem auctam & efferam, inquietem, vel sæpe somnos turbulentos. 3. pulsum durum, respirationem raram, & magnam. 4. faciem plerumque rubram valde, vultuosam, adspectu horrendam, oculos protuberantes, trucesque, stillicidium narium.

774. Prognosis hisce fere describitur.

Phrenitis vera 3°, 4°, 7°que die necat, raro hunc transgreditur.

Tum-

Tumque, si sæua fuerit, sæpe in maniam abit.

Paulisper adscendens immanis fit.

Sæpe definit in lethargum, coma, catochen.

Vomitus æruginosus ratione inflammati cerebri; sputatio frequens & indecora in adstantes; tremor; scæx alui & vrina interceptæ, vel albæ; vrina cruda; conuulsio; venatus floccorum volitantium; oculi puluerulenti; dentium stridor; *αδυσία* plerumque conuulsionis prænuncia; permutatio symptomatum perpetua, vlceris tumentis subsidemia, frequentia sunt præsagia periculi summi, & mortis.

A peripneumonia lethalis. A variolis mala admodum; ab ileo lethalis.

Inflammatiō paulisper fixa, & asperitas faucium ad superiora vergens creat phrenitidem mortiferam, hi palpant, & laboriosi sunt.

Quæ versatur circa necessaria, pessima.

775. Cadauera defunctorum a phrenitide exhibuere meninges inflammatas, gangrænam, abscessum, sphacelum cerebri, aut acres rodentes ichores.

776. Ex quibus cunctis elicitur causa proxima phrenitidis veræ, inflammatio vera piæ matris, duræque primario orta. Symptomaticæ vero, inflammatio similis orta a raptu materiæ phlogisticæ in cerebri meninges.

777. Quidquid has producere potest, fungi poterit causæ propioris munere (772.).

778. Quin hinc vera diagnosi utriusque mali.

779. Curatio requirit attentionem ad sequentia.

Phreniticis varices, vel hæmorrhoides fluentes profunt. Alui fluor bonus.

Dolor ad pectus, pedesque, vel & vehemens tussis superueniens, sæpe soluit malum. Ut & hæmorrhagia.

780. Phrenitis vera requirit citissime validissima remedia, quibus tolli possit inflammatio ad cerebri arterias orta.

781. Quæ petenda maxime ex curatione inflammationis in genere, observatis hisce. Venæ sectio instituenda larga, per amplum vulnus, aut plures venas simul, in pede, iugulo, fronte. Diluentia ex decoctis antiphlogisticis, nitrosis, affa-
tim

tim exhibenda. Dein purgantia anti-phlogistica, cum multo potu diluente nitroso danda. Clysmata similia, additis laxantibus. Anus fouendus, hæmorrhoides fricandæ foliis ficus &c. vel euacuandæ hirudinibus. Collutoria, gargarismata leniæ reuocanda in crebrum vsum. Nares, oculi, aures, fouenda. Caput radendum. His præmissis, neque cedente malo, opiativum vtendum, pediluuvia, epispastica leuia, cucurbitæ, ad inferiora applicanda. Corpus moderato frigore reficiendum, & erectum tenendum.

782. Si vero phrenitis ab alio morbo inflammatorio iam facta oritur, ante omnia attendendum, an genius eius mali patiatur adhiberi modo dicta (781.), si non, tum curanda ex methodo illi morbo debita, semper additis deriuantibus, & topicis remediis.

ANGINA.

783. **I**mpedita valde, dolens admodum, vel & impedita & dolens simul deglutitio, atque respiratio, contingit a causa morboſa agente in partes binis his functionibus inferuientes, supra pulmones,
&

& supra stomachum positas, angina vocatur.

784. Cuius duplex observatur species; prima sine ullo signo tumoris externi, interniue apparet; altera vero cum aliquo tumore in aliqua parte organorum descriptorum (783.) deprehenditur semper.

785. Illa prior in fine morborum diuturnorum, maxime post ingentes & sæpe repetitas euacuationes, contingit; pallorem faucium, siccitatem harum, tenuitatem simul, comites habet; quare nervos & musculos resolutos plerumque habet; fere semper est signum imminentis mortis; raro curatur, & tum tantum remediis replentibus vasa vacua bono succo vitali, calefacientibus, corroborantibus.

786. Eadem prior species aliquando oritur subito sine signis manifestis prægressis ullius morbi; vix capit medelam; & fere semper, post mortem, suppuratum pulmonem demonstrat.

787. Quæ cum tumore accidit varia nomina accipit, vel a natura tumoris, vel a loco per tumorem occupato. Hinc est œdematosa, catarrhosa, cancrosa, conuulsiva, angina.

788.

788. Occupant hi tumores (787.) linguam, eius musculos; palatum, tonsillas; vuulam, huius musculos; caua ossium frontis, maxillæ superioris, ossis sphenoidis, enato & ibi radicato polypo incremente, nares obturante, palatum deprimente pendulum, fauces angustante, pharyngem, laryngemque occludente; musculos ossis hyoidis omnes, vel aliquos; musculos laryngis externos, internos, communes, proprios; aspere arteriæ membranam internam muscularem; pharyngis musculos superiores, & œsophageum; ipsum œsophagi musculus; glandulas asperæ arteriæ & œsophago ita vicinas, ut hæc fistulæ ab iis tumentibus comprimiqueant, ut sunt salivales omnes, tum vagæ circa hæc loca, ac tandem ipsæ thyreoideæ.

789. Ex qua historia (785. ad 789.) perspecta apparet ratio tam multiplicis, improvise, & funesti sæpe euentus, huius mali (783.).

790. Quum vero tam varius ille morbus sit, tam varium effectum producat; variaque adeo remedia & artem medendi postulet, quantum brevitatis hic necessa-

cessaria permittit, eum recenferi necesse est.

ANGINA AQVOSA.

791. **A**ngina aquosa, cedematosa, catarrhosa tenuis, est impedita, vel dolens respirandi, vel deglutiendi exercitatio, cum tumore lymphatico partium, quibus illa fit, vel vicinarum.

792. Habet ergo, ut cæteræ aquosæ colluuiæ, sedem in parte glandularum, ubi reconditur atque excernitur secreta arteriis lymphæ.

793. Ergo pro causa agnoscit quidquid exitum liberum lymphæ impedit: eorum vero est numerus ingens, & diuersitas. Compressio venarum quæcunque, in quas forte earum glandularum emissaria se euacuant: obstructio nata in ipso folliculo glandulæ a gypso, pituita, lapide, fungo, & similibus ibidem enatis; obstructio facta in ipsis emissariis a causis eisdem; compressio eorundem locorum; frigus finibus excretoriorum meatuum applicatum; debilior humorum circumactio.

794. Effectus talis mali sunt, tumor
aquo-

aquofus, albus, frigidus; vicinorum compressio; impedimentum functionum, quæ a non compressis pendebant.

795. Hinc signa diagnostica (791. 792. 793.), & prognostica (794.) facillime patescunt.

796. Curatio autem hic peragetur iis, quæ 1. causas obstruentes resolvunt, movent, aut rodendo, vel secando tollunt. Huc spectant emollientia, aperientia, laxantia, forma fofus, cataplasmatidis, gargarismatis, iniectionis, collutorii, vaporis, applicata; tum frictiones; caustica; scalpellum. 2. quæ copiam lymphæ, per opposita loca euacuando, minuunt: quod fit apophlegmatismis, vesicatoriis, sudoriferis ficcis externis, internis, diureticis similibus, hydragogis per aluum. 3. abstinentia ab liquidis, victu calefaciente, exsiccante. 4. augendo vim circulationis per remedia nota (98. 99.).

IN ANGINA AQVOSA.

SECT. 796.

Vid. ad [N. 1. §. 54. N. 4.
N. 2. §. 201.

AN-

799. Huius (798.) mali causa 1°. in genere est omnis ea, quæ inflammationem quamcunque potest producere (375. 376. 377. 378.) 2°. illa omnis, quæ inflammationis causas determinat inprimis ad loca descripta (388.), maxime ad laryngem, pharyngem, os hyoides, horumque musculos, tum ad fistulæ pulmonalis superiora: talia autem sunt, dispositio propria iuuenibus, sanguine diuitibus, rufis; exercitium frequens, validumque harum partium, oratoria exercitatio, cantus, clamor, fortis equitatio aduerso vento & frigido, tubarum & fistularum inflatus, labores validi in aëre frigido, calor æstuans magnum frigus excipiens tempore verno; aridæ fauces ob aëris recepti & expulsi feruorem in æstu solis, vel in febre inflammatoria.

800. Vbi ex his causis (799.) nata est, varia, & inter ea horrenda, symptomata creat, pro diuersitate partis ejus, quam occupat.

801. Si sola laborat pulmonalis fistula, illæsis aliis, in interna sua membrana musculosa, tum oritur ibi tumor, calor, dolor, febris acuta calida, cæterum externa signa
T nulla;

nulla; vox acuta, clangosa, sibilans; inspiratio acute dolens; respiratio parua, frequens, erecta, cum summo molimine; hinc circulatio sanguinis per pulmones difficilis; pulsus mire & cito vacillans; angustiae summæ; cita mors. Estque hæc vna ex iis, quæ funestissimæ, nec externa dant signa: quo vero propius glottidi & epiglottidi malum, eo sane magis lethale.

802. Si larynx inprimis acute inflammatur; & sedem habuerit malum in musculo albo glottidis, & simul in carnosis ei claudendæ inferuientibus, oritur dirissima, subito strangulans, angina. Signa ut priora (801.); dolor in eleuatione laryngis ad deglutitionem ingens, auctus inter loquendum atque vociferandum; vox acutissima, stridula; citissima, cum summis angustis, mors. Estque hæc, si e signis externis, omnium pessima.

803. Si soli musculi eleuando ossi hyoïdi, & laryngi seruiantes inflammantur valide, signa euidencia sunt hæc; respiratio satis libera; deglutitio in prima actione suæ exercitationis acutissime dolens; tum signa inflammationis in genere; & eadem
in

in iis musculis, qui apparere examinanti possunt.

804. Quando autem sola pharynx eodem infestatur malo, signa specifica sunt, inspectis faucibus apparentia; respiratio satis commoda; deglutitio dolens, impossibilis; materies deglutienda per nares redeuns; eadem in asperam arteriam pulsa & tussim violentam excitans; hinc defectus cibi, potusque ingerendi; exsiccatio & exasperatio omnium humorum in corpore; febris non adeo intensa; maior morbi duratio ante illatam mortem.

805. Si vero tonsillæ, vuula, velum membranosum pendulum; muscoli eius quatuor pterygostaphylini, inflamman-
tur valide, tum fiunt fere eadem ac in prior (804.); respiratio incommoda, difficili, per nares nulla, vel parua, per fauces angusta; materies deglutienda ob angustias & summos dolores per os redeuns; excreatio perpetua; pituitæ ad caua tonsillarum stillicidium perpetuum, copiosum; dolor acutus in aure interna, & via eo tendente a faucibus; crepitatio in aure dum deglutitio fit; surditas sæpe perfe-

Æta. Hoc mali genus hodie a lue gallica frequens, & valde metuendum.

806. Quod si omnes hæ inflammatoriæ species (801. 802. 803. 804. 805.), vario concursu, simul ægrum infestent, concluditur facile, eo sæuiorem fore morbum, quo plures in vnum conspirauerint: tumque simul eo plura, & sæuiora symptomata euentura esse.

807. Nam impedito tum cruoris in iugulares externas, vel per has ipsas compressas, reditu, fit tumor faucium, labiorum, linguæ, vultus; linguæ exsertio, intorsio, inflammatio; oculorum rubedo, protuberans tumor horrendus; cerebri, ob eadem suffocatio; hinc visus, auditus, tactus, hebetes; delirium; hiatus oris; stertor; decubitus impossibilis præ suffocatione; rubor, tumor, dolor, pulsatio, sæpe in collo, pectore, ceruice, conspiciui; vnde venæ iugulares, frontales, raninæ varicosæ tument.

808. Decurrit autem omnis angina consuetum inflammationis generalis iter, easdemque facit, ac patitur mutationes in resolutionem, pus, gangrænam, scirrhum.

809. Ergo si signa docuerint, anginam esse

esse (801. 802.), confestim examinandum, an pura hætenus inflammatio adsit (382. 383. 384.); tumque citissime per efficacissima remedia (395. ad 402.) tentanda resolutio est (386.). Itaque 1°. cita, magna, repetita missio sanguinis, eousque ut debilitas, pallor, refrigeratio, vasorum collapsus, doceant, vim superstitis non posse augere tumorem & rigiditatem vasculorum, exercenda erit. 2°. valida alui subductio per purgantia ore hausta, vel clysmatum instar injecta, repetita. 3°. victu, potuque tenuissimo, & lenissimo opus, 4°. nitrosis, subacidisque medicamentis 5°. vapore humido, molli, tepido assidue hausto: fomentis externis; derivantibus epispasticis, cucurbitis, sinapismis, collo, & pectori, appositis.

810. At species (803.), raro tam periculosa ac (801. 802.), eadem remedia (809.), sed leuiora, petit. Hic autem imprimis cataplasmata anodyna, laxantia, emollientia externa necessaria.

811. Dum denique angina (804. 805. 806.) adhuc inflammatoria, infestat; tum eadem remedia (809. 810.) requiruntur vnita, sed addendæ perpetuæ humectationes

290 ANGINA INFLAMMATORIA.

nes oris & faucium, per lenissima attenuantia nitrosa, diluentia aquosa calida, laxantia pingua, quæ ore quieto contineri, leniter gargarizando applicari, fistula iniici possunt: requiritur continua opera, ne arescant partes.

812. Si omnibus his non, sero, vel frustra tentatis (809. 810. 811.), morbus fit maxime recens & strangulans a causa superiori, quam erit locus sectionis, cum symptomatibus pessimis (807.), nec tamen adhuc gangrænosis, statim post acerbam prognosin instituenda erit *ερωγχοτομή*.

813. Quæ fiet, præparato corpore ægri, in aspera arteria infra laryngis inferiora ad pollicis distantiam, discissa cute, & integumentis; amotis musculis; secto interstitio inter annulos arteriæ asperæ; imposito canaliculo argenteo; dein ablata causa, quæ exegerat hanc operam, vulnus percurando; interim clysmata nutrientia applicando, si deglutitio impossibilis.



IN ANGINA INFLAMMATORIA.

SECT. 809. N. 2.

Rec. *Diagryd.* gr. xviii.

F. cum



F. cum Aq. emulsio, cuius *vnc.* fs. admisce
Syrup. *Sennæ* *vnc.* ifs. F. Haustus.

Rec. Fol. *sennæ* *vnc.* j.

Decoct. cum aq. *vnc.* viij. admisce

Nitri *vnc.* j.

Syrup. *sennæ* *vnc.* j. F. Clyfina.

SECT. 809. N. 5.

Rec. *Aceti Samb.*

Rosar.

Calendul. ana *vnc.* j.

Aq. still. samb. *vnc.* vj. M.

Vapor calidus hauriatur infundibuli ope in fauces.

SECT. 810.

Rec. *Lentis palustr.* *vnc.* vj.

Fol. *Nymphææ* *rec.* *vnc.* v.

Papauer. bortenf. *vnc.* viij.

Bismalhæ *vnc.* vj.

Flor. Sambuc.

Melilot. ana *vnc.* iv.

Cum aq. decoct. sub finem adde

Nid. hirundin. N. ij.

Semin. lini q. s.

Ol. Lilior. alb. *vnc.* iij. F. cataplasma.

Decoctum esto pro fomento.

SECT. 811.

Rec. Decoct. a cataplasma. *præced.* *vnc.* xij.

Aceti samb. *vnc.* ij.

Syrup. *althææ* *vnc.* ij.

Nitri puri drach. ij. M.

Rec. *Ficum pinguium* N. xxij.

Fol. *Althææ* *vnc.* ij.

Decoctis diu, *vnc.* xxx. expressis *utatur.*

292 ANGINA SVPPVRATORIA.

SECT. 813.

Clysmata nutritia.

Rec. Jus Carnium ad vnc. x.

Sal. Nitri gr. x.

Sp. Salis gutt. vj. M.

Iniiciatur octaua quaque hora, postquam primo clysmate purgante elota aluus fuit.

ANGINA SVPPVRATORIA.

814. **V**erum si malum iam eo processerit, ut suppuratio loci affecti iam incipiens cognoscatur, per signa (387.), erit tentanda via abscessus per artem, & remedia generalia (402. ad 412.); maxime autem molli, assiduo gargarismate, largo cataplasmate laxante; pertusione loci, sensibus deprehensi, bronchotome (812. 813.).

815. Illa autem anginae species, quæ prior descripta (801. 802.), raro eousque adolescere potest, sed vel prius resolvitur (809.), vel necat.

ANGINA GANGRÆNOSA.

816. **S**i tandem causæ anginae (799.) augentur, & in parte nobili magis (801. 802.) hærent, vel & in externis (804. 805.),

805.), sæpe in gangrænam abit lethalem; id vero nouimus 1°. ex signis huius generalibus (426. 427. 428. 429.) applicatis ad partes obsessas, quarumque functio læsa; 2°. ex signis propriis; si tumor, ruborque prius conspicui subito, sine bona causa, disparuerint: si dolor similiter sic abiuerit; fauces subito æquales, læuesque fiunt; siccae, glabræ, liuidæ fauces: tum nullam capit magnitudo nimis prouecti mali melam.

817. In scirrhum circa tonsillas, vuulam, palatum, abit angina eorum locorum, ex causis descriptis (392.), vnde cognoscitur facile, curatur difficulter: maxime vbi in cancrum iam abiit. Vid. (797.).

ANGINA CONVULSIVA.

818. Si nerui motores organorum deglutitionis, vel respirationis, impediuntur suas exercere functiones in illa organa, oritur paralytica angina; talis a luxatione dentis vertebræ dicitur contingere, aut alterius vertebræ ceruicis ad interiora. Si conuulsionum causa quæcunque musculos pharyngis, laryngisue occupauerit, oritur subita, suffocatiua angina;

na; talis in epilepticis, spasmodicis, hystericis, hypochondriacis sæpenumero fit, abit, redit: curatur in primis his, quæ iis morbis curandis propria sunt.

819. Ex hac historia data (783. ad 819.) intelligitur ratio observationum Hippocraticarum.

Angina sine vlllo signo conspicuo, solo strangulatu orthopnoico se prodens, cum febre acuta, dolore magno capitis, vel crurum, sine signis bonis, cito lethalis, primo scilicet, secundo, vel tertio die.

Angina ἐπιγενέσσει orta ex aliis inflammatoriis morbis, aut si species (801. 802.) nata ex (803. 804. 805.), lethalis.

Angina spumam oris excitans; serum tenue exprimens; fœces alui sine sensu dimittens; in febre valde acuta sine vlllo signo conspicuo occupans; cum recessu tumoris, ruboris, pulsationis in faucibus vel lingua tamen strangulans; vbi que lethalis, & præceps.

PERIPNEVMONIA VERA.

820. Si in vasis pulmonalibus, inflammationi suscipiendæ aptis, inflam-

inflammatio vera concipiatur, morbus vocatur peripneumonia.

821. Illa vasa autem sunt arteriæ bronchiales, pulmonicæ, & harum laterales lymphaticæ.

822. Vnde etiam duplex concipi peripneumonia potest; quarum vna ad fines arteriæ pulmonalis, altera in bronchialibus hæret.

823. Et statim liquet, priorem periculosissimam; posteriorem minus discriminis habere, sed illam ex hac nasci posse; & causas multas communes habere.

824. Quæ causæ plurimæ reuocari queunt 1. ad generales omnium inflammationum per totum corpus (375. ad 380.). 2. ad eas, quæ in primis pulmones afficiunt: vt sunt, aër humiditate, siccitate, calore, frigore, grauitate, leuitate, exhalationibus causticis, vel adstringentibus, aut coagulantibus constans, sicque peccans; chylus ex crassis, siccis, viscosis, cum acribus permixtis, vel sine iis; exercitia pulmonum violenta, cursu, lucta, nixu, cantu, clamore, equitatione forti in vento aduerso; venena coagulantia, caustica, constringentia, venis ad cor tendentibus im-

immissa; vehementes animi perturbationes; angina cum oppressione pectoris, & orthopnoea, pleuritis valida, paraphrenitis ingens.

825. Si hæ causæ (824.) morbum producerint, pro diuersitate sedis affectæ (822.) producet affectus varios; bronchialis enim omnia effecta inflammationis producens (382. ad 393.) ipsos fines arteriæ pulmonalis contiguos comprimendo, contagio efficiundo, inflammat.

826. Vbi autem fines ipsi arteriæ pulmonalis inflammati, stagnat cruor; extenditur vas; exprimitur transsudatione quasi pars liquidissima; coaceruatur crassior, inter cor dextrum, & fines pulmonalium arteriarum, omnis fere colligitur, circulum adhuc obire potens, sanguis; hinc pulmo grauis, explicari impos, liuescens; cor sinistrum sanguine orbatur; debilitas summa; pulsus exilis, mollis, omni modo inæqualis; respiratio parua, frequens, difficilis, erecta, tussiculosa, calida; sanguinis venosi ante auriculam & cor dextrum stagnatio; rubor faciei, oculorum, oris, faucium, linguæ, labiorum
info-

insolitus; tandem suffocans, inexplicabili cum anxietate & delirio, mors.

827. Si tale malum (826.) vtrumque pulmonem simul, & valide infecerit, erit cita, & insuperabilis mors; quum nullo remedio antiphlogistico iuuari natura queat: confer (386. & 395. ad 402.).

828. At si paruum in vno pulmone locum infestat, nec causas validas habet, aliqua, nec tamen certa, spes est curari bene posse.

829. Inde (824. ad 829.) signa diagnostica, & prognostica, vtrumque hauriri possunt; maxime si consideremus, exitus esse vt inflammationis (386. ad 393.); unde etiam status accipit vario durationis tempore varios, ita vt abeat in sanitatem, alium morbum, mortem.

830. Sanatur 1^o. resolutione benigna; si temperies laxa, humor blandus, viscositas non nimia, pars affecta bronchialis, vel pulmonalis, non magna. 2^o. spuito cito, libero, copioso, flauo cum paucis sanguine misto, satis crasso, dolorem sedante, respirationem emendante, pulsum ampliore & pleniore reddente, in album blandum cito mutato; id fit, si sedes mali in-

inprimis est bronchialis arteria, aut pulmonalis non valde magna. 3°. alui fluxu bilioso, leuante, & similia fere, ac sputa descripta, eiiciente. 4°. vrina copiosa, crassa, hypostatica, leuante cum sedimento primo rubro, sensim albescente, ante septimum diem emissa. Atque tum respiratio adest facilis, febris mitis & boni moris, *αδύψια*, calor, humiditas, laxitas, mollities, æquales toto corpore.

831. Abit in alium morbum, pendentem ex natura inflammationis, vel ipsius pulmonis, prout sua hinc propria actione destituitur.

832. Hinc primo in suppurationem, quæ fit, vbi materies inflammatoria (376. 377. 824.), ab ipsa natura resolui non potens (830.), nec arte emendata, tamen blandior (387.), stagnans, calens, pulsa, vascula tenuia rumpit, in pus resoluit, latera coercentia extendendo, vel rodendo abscessum vomicamue format intra quatuordecim dies.

833. Id futurum (832.) demonstratur his obseruationibus. 1°. si signa certa peripneumonix satis acris (825. 828.), nec tamen acerrimæ (826.), primo extiterint.

rint. 2°. si resolutio, eiusque signa (830.), non satis cito, nempe ante quartum diem, apparuerint 3°. si symptomata (825. 826.) nec sputo cocto, & criticis diebus, 4°, 5°, 7°, 9°, 11°, 14°, euacuato per ordinem, qui sanationem doceat mutatione successiva excreti; nec educatione cruoris; nec medicamentis, nec victu debito; superata sint. 4°. verum contra symptomata non pessima pertinacia, cum continuo delirio, pulsu vndoso, mollique permaneant.

834. Fieri autem iam re ipsa cognoscimus per hæc: 1. si signa sint (833.). 2. ubi leues, vagæ, sæpe repetentes, sine manifesta causa horripilationes contingunt; dolor remittit; dyspnœa manet; genæ & labia rubent; sitis adest; febricula vexat, inprimis vespertina; pulsus debilis, molliorque.

835. At iam factum declarant: 1. signa prægressa (833. 834.). 2. tussis pertinax, sicca, ad partum, motumue aucta; respiratio difficilis, parua, anhelosa, strepens, post partum, & motum aucta; decubitus in vnum modo, id est in affectum, latus tolerabilis; febricula continua, periodica, a cibo, potu, motu, exacerbata cum rubore

bore genarum & labiorum; appetitus prostratus; sitis magna; sudor nocturnus, maxime circa iugulum & frontem; vrina spumosa; pallor; macies; debilitas summa.

836. Id apostema iam factum (835.) exitus habet varios: 1. suffocat tumore occupante totum pulmonem, vel comprimendo impediendo ea, quæ adhuc in eo libera. 2. suffocat subita eruptione puris, vomica in asperam arteriam se exonerante vno cum impetu. 3. soluitur sputo purulento, liberante, consumente. 4. soluitur lapsu puris in caua thoracis, inue mediastini dilatata vacua. 5. inde tabes, phthisisque varia, empyema fere lethale.

837. Alter morbus a peripneumonia fit, si purulenta iam facta inflammatoria materies (832. 833. 834.) intra pulmonales venulas resorbetur, cruori miscetur, in loca quædam deponitur, vnde liberatur pulmo, oneratur pars alia; quæ si minus requisita ad vitam, est *μετάστροφis* bona; si vero in hepar, lienem, cerebrum, & similia loca fluxerit, pessima plerumque erit. Hinc fiunt abscessus peripneumonici ad aures, crura, hypochondria.

838.

838. Tales abscessus futuros esse declarat: 1. observatio signorum peripneumoniæ non pessimæ (833. 834. 835.), cum febre non vehementi, nec maligna, tamen continua; cum dolore thoracis, anxietate, grauitate, dyspnœa, non pessimis; sine signis resolutionis (830.). 2. si cum his pulsus multum vacillans, omni modo, assidue. 3. dolores, rubores, calores, tensiones, circa loca dicta (837.).

839. Illos vero futuros circa crura scimus, si 1°. signa futurorum abscessuum (138.) adsint. 2°. si simul cum iis signa sint leuioris inflammationis ad hypochondria.

840. Sed futuros circa aures scimus, si 1. signa adsint (838.) 2. mollia simul hypochondria.

841. Ad hepar verti nouimus, si 1. signa sint (838.) 2. dolor manens in hepate, cum vrina subictericea, colore subflauo cutis. Hinc sæpe, vomica hepatis nata, pessima mala.

842. Abscessus illi (839. 840.) si leuant pulmonem, si tollunt febrim, si purulenti, manantes, fistulosi manent, si satis cito, ante nonum diem, contingunt, tum sem-

V

per

per salutare: verum, si sputo iam purulento, nec magis flavo, sine leuamine dicto, nascuntur, mali: at; si iam nati evanescent, crudo morbo, peripneumonia redeunte, omnia lethales sunt.

843. Desinit iterum morbus hic in tumorem callosum, scirrhumque pulmonis; si materies, & conditiones (392.) concurrunt: inde tota vita difficilis, erecta, tussiculosa respiratio, post pastum motumque aucta, sine signis latentis vomitæ descriptis (835.); inde adhæsiō pulmonis ad pleuram.

844. Tandem, si bronchialis arteria, vel & pulmonalis vehementissima inflammatione (388.) corripitur a causa interna, vel externa (824.), breui nascitur gangræna, & inde cito sphacelus ob copiam, motumque cruoris, & ob motum assiduum visceris tenuissimi. Id futurum docent: 1. signa violentissimæ peripneumonix (826.), nullo casu, nec arte sedata. 2. debilitas summa, cita, pulsu se imprimis manifestans. 3. frigus extremorum. At iam natam scimus, si hæc prægressa, sputa ichorosa, tenuia, cinericea, livida, atra, fetida. Inde autem cita mors.

845. Has peripneumonix mutationes (830. 832. 836. 837. 843. 844.) docet observatio historix morbi, cadauerumque inde defunctorum incisio.

846. Vnde evidens est, illum morbum, quem vetustas hoc nomine descripsit, esse veram inflammationem pulmonum.

847. Eritque prognosis clara, qua asseritur, morbum hunc semper valde periculosum ob necessitatem summam functionis pulmonalis ad vitam, & ad sanandam materiem inflammatoriam, ob sanguinis perpetuo allati copiam, impetum, ob motum perpetuum visceris, ob situm, qui applicationem remediorum renuit, teneritudinem summam vasculorum facile destruendam, impossibilitatem reuulsionis adeo requisitam in cura inflammationis.

848. Ex quibus (847.) liquet, quando, cur, & cum quibus symptomatibus in mortem abeat: sc. si totus pulmo, vna cum corde inflammatur, cor in latus procidit, æger paraplegia resoluitur, frigidus, & sensus expers est, tum secundo, vel tertio die moritur. Si vrina initio morbi

bona & cocta, post quartum tenuis. Si in vigore morbi erectus sedere cogitur. Si puris est per inferiora secessus: si sicca cum feruore strepente pleni pulmonis in gutture: si vehemens in corpore valde sicco, duro, calloso, exercitato: si mala est cum prærubro valde stillicidio sanguinis: si sicca est cum maculis rubris pectori adpersis: si coryza aut sternutatio multa præcedit, sequiturue: si ex ardente febre ortum duxit: si sputum biliosum cum pure post sextum diem statim inceperit: si sputum ab initio valde cruentum, flavum sincerum, album rotundum, spumosum valde, dolorem non sedans, si fuscum; cænosum, amurcosum, nigrum, liuescens, inæquale, æruginosum: si neque febris, neque respirationis difficultas remisit, moritur die septimo, vel nono. Mors vero iis contingit dum pulsus deficit, omnia frigent, solum pectus, caput, collum æstuant, genæ rubent, liuentque.

849. Curatio huius mali varianda est pro diuerso statu morbi & symptomatum, adeo ut quod vno tempore prodest, in eodem tamen morbo alio tempore datum obsit.

850. Si ergo in peripneumonia omnia signa adsint descripta (830. N°. 1.) vtendum quiete corporis & animi; aëre tepido humido; balneo vaporis aquæ dulcis ad pulmones, nares, os, pedes, crura; victu tenui, potu leui; medicamentis aquosis, nitrosis, farinosis, mellitis.

851. Si vero status adest (830. N°. 2.), vtendum iisdem (850.), & medicamentis emollientibus, depurantibus, excretionem promouentibus, leniter reficientibus, vaporibus: vitanda tum venæ sectio, purgatio, sudoris expulsio, aliaue omnia, dictam excretionem perturbantia.

852. Si (830. N°. 3.) adest, lenia clysmata emollientia, fomenta lenia abdomini imponenda, decocta emollientia, & leuissimo gradu laxantia, profunt, simul reliquis peractis (850. 851.)

853. In statu altero (830. N°. 4.) fiant eadem, ac (850. 851. 852.), sed addantur balnea pedum, fomenta renum per clysmata emollientia interna, & externa linimenta, bibantur decocta leuissime abstergendo diuretica.

854. Si inflammatio recens, magna, sicca, in corpore robusto, paulo ante sano,

exercitato, deprehenditur per signa (825. 826.), statim recurrendum, 1°. ad citam, largam, pro gradu mali moderandam aut repetendam missionem sanguinis, ut moles crassi minuatur, diluentibus spatium concedatur. 2°. ad balnea vaporis emollientis pulmonibus assiduo, reliquo corpori sæpe applicanda. 3°. ad decocta diluentia, resoluentia, emollientia, laxantia, antiphlogistica, nitrosa, anodyna, parua copia, continenter repetenda, calidissima forbenda. 4°. ad clysmata blandissima antiphlogistica. 5°. ad victum tenuissimum ex succis antiphlogisticis.

855. Si inflammatio magna, cum febre, & reliquis symptomatibus validioribus duravit ultra triduum, & signa adsint inflammationis iam in suppurationem tendentis (833. 834. 835.), semper multum discriminis adest, quamvis diutius iam excurret morbus, & spatium dabit curationi: tum 1°. venæ sectione nulla, vel, si aliquid vrget, parca utendum. 2°. victu leni, sed paululum incrassante, & exmaturantibus confecto, utendum. 3°. balneis pulmonicis, emollientibus, maturantibusque utendum ad quintum ab inchoato

choato malo diem. 4°. die quinto, & sexto iisdem vtendum, additis forbitionibus tussim mouentibus leniter, simulque replentibus, vt septimo forte die locus leuari queat pure cocto, vasis attenuatis, vita sustentata.

856. Si signa docent, factum esse in pulmone abscessum (835.) acceleranda eius disruptio in asperam arteriam, eaque facta, depuratio subita & tuta vlcerosi loci.

857. Disruptio tentatur si, post multa alimenta mollia, subpinguia, cum vino molli, pulmo, suppuratus (836.) & præparatus (855.) vapore calido, clamore, tussi, excretoriis, concussione in naui, vel rheda, agitur.

858. Simul ac dein signa edocuerint, apostema ruptum esse, vtendum victu lacteo, vegetabili lenissimo, nec facile putrescente, tum de die aperientibus, deterfiuis, vesperi leuibus opiatiss; vaporibus emollientibus; equitatione, vel unctione in rheda, aut naui.

859. Si autem signa (838.) docent, statum (837.) iam obtinere, nulla tamen hactenus certa prognosi quoniam materies verget, tum leui, fluido, blande aromati-

co, paululum vinoso vtendum victu; quietum sit corpus; medicamenta vero sint emollientia, & ex genere leuissimo aperientium, pulmone prospiciatur vsu emollientium: sic vel determinabitur, vel vltius dissoluta excernetur mali materies.

860. Sed si cum signis (838.) simul illa adsunt (839. 840.), quibus determinatio significatur, fiant modo dicta (859.), simulque locus præuisus (839. 840.) suctu, laxatione, stimulo, aperientibus ita tractandus, vt minus resistat, plus trahât.

861. Si (841.) obtinet, fiant eadem (859. 860.), sed simul aperientia paulo fortiora, saponacea, hepatica addantur, tum clysmata, & fomenta his constantia.

862. Malum vero, quod descriptum (843.) raro medelam capit, nisi forte emollientibus externis, internis, atque motu equitationis, vel vectionis in rheda cedat parum.

863. Quando in ipsam iam gangrænam abiit (844.), incurabilis est.

864. Si autem peripneumonia per sputum iam expurgari cœpta, incipit suppressum id habere, statim summa ope nitendum, vt iterum id prodeat. Tales
causæ

causæ impediētes sunt sæpe, magnum frigus subito admissum; ingens exsiccatio vndecunque nata; febris calida superueniens; medicamenta calefacientia; alius liquida, nec critica; sudor ingens; animi affectus vehementior.

865. Tum statim ad vicinitatem partium a suppressa, & aggestu increſcente materie, inflammatio noua exoritur; vnde ilico eadem symptomata, quæ a peripneumonia primaria (825. 826.); illa autem tum debilitato iam corpori accidentia, vt plurimum cito lethalia euadunt.

866. Illi autem vicio (864.) eiusque sequelis (865.) occurritur vapore assiduo calidi, humidi, emollientis naribus, ore attracti, pulmonibus recepti; toto aëre simili huic vaporis per artem reddito; vsus etiam largus potuum similium, cum melle in primis & aceto, multum prodest; medicamenta leniter resoluendo antipyretica, vt est stibium diaphoreticum cum nitro fixante; leniter opiata; sudoris euitatio; maxime tandem placida animi quiete.

* * * * *

IN PERIPNEUMONIA VERA.

SECT. 850.

V 5

Rec.



Rec. *Aq. decoct. bordei* vnc. xl.
Nitri drach. ij.
Oxymell. vnc. iv. M.
Bibat. vnc. ij. *calidas, omni quadrante hora.*

SECT. 851.

Rec. *Fol. Parietar.*
Agrimon.
Taraxac. ana m. j.
Semin. contus. papau. alb.
fœniculi. ana vnc. j.
Glycyrrhizæ vnc. iſs.
Cum aq. decoct. vnc. l. exhibeo
Vſus ac præcedentis.

SECT. 853.

Rec. *Rad. Gramin.*
Ruſci.
Petroſelini,
Fœniculi, ana vnc. ij.
Imperator. drach. ij.
Semin. contus. Bardanæ,
Petroſelini, ana vnc. j.
Cum aq. decoct. vnc. xl. exhibe. In eundem uſum

SECT. 855. N. 2.

Viſtus.

| | | |
|------------------------------|---|--------------------------|
| <i>Olera.</i> | } | <i>Vid. §. 35. N. 1.</i> |
| <i>Farinoſa.</i> | | |
| <i>Piſa.</i> | | |
| <i>Fructus horæi maturi.</i> | | |

SECT. 855. N. 3.

Sunt vapores §. 809. N. 5.

SECT.



SECT. 855. N. 4.

Rec. *Aceri scill.* drach. vj.
Oxymell. scillir. vnc. iij
Sal. polychrest. drach. j.
Aq. decoct. bordei vnc. viij.
stillat. hyssopi vnc. iv. M.

Bibat vnc. j. omni hora dimidiata.

Rec. *Potus Coffe* lib. ij.
Mellis vnc. ij.
Aceri Sambuc. vnc. fs. M.

Sorbeat feruida, quantum iuuat.

SECT. 858.

Aperientia deterfua ad vlcus aper-
tum pulmonis.

FOLIA *Adianthi vulgaris.*

- - - *albi f. Rutæ murariæ.*

- - - *nigri.*

FOLIA *Adianthi aurei.*

Agrimoniæ.

Alchimillæ.

Beccabungæ.

Betonicæ.

Bellidis pratensis.

Borraginis.

Botryos.

Bugulæ.

Ceterach.

Chamædryos.

Chamæpityos.

Cichorei.

Dentis Leonis.

Endiuia.

Eryfimi.

FOLIA *Feniculi.*

Fumariæ.

Hederæ terrestris.

Hepaticæ nobilis.

- - - *terrestris.*

Hippocelini.

Hyperici.

Hyssopi.

Isatidis.

Lactucæ.

Lingæ Ceruina.

Marrubii albi.

Morsus diaboli.

Nummulariæ.

Ononidis.

Primulæ veris.

FOLIA



FOLIA Prunellæ.

Pulmonariæ maculatæ.

Saponariæ.

Scabiosæ.

Scordii.

Sigilli Salomonis.

Sophiæ Chirurg.

Tussilaginis.

Valerianæ hortensis.

- - - sylvestris.

Verbenæ.

FOLIA Veronicæ.

Vincæ peruinçæ.

Virgæ aureæ.

GUMMI Ammoniacum.

Galbanum.

Opopanax.

Sarcocolla.

Mastiche.

Myrrha.

Olibanum.

Terebinthina.

Rec. Fol. recent. Agrimon.

Virgæ aureæ,

Betonica,

Valerian. hortens. ana m. j.

Marrubii alb. m. $\frac{1}{4}$.

Rad. 5. aperient. ana vnc. j.

Flor. Centaur. min.

Agrimon.

Hyperici, ana m. j.

Cum aq. decoct. pint. iv. exhibe.

Bibaz. vnc. ij. omni biborio dici.

Aliud.

Rec. Rad. Bardan,

China,

Sarsaparill. ana vnc. iij.

Cum aq. decoct. spatio semihoræ, adde

Ligni Sassafr. vnc. iij.

Vbi iterum parum ebullierint, admisceto Decoct. lib. iij.

Syrup. 5. rad. aperient. vnc. ij. Vfus ut prius.

Rec. Myrrh. lucid. elect. drach. ij.

Cum vitelli ou rec. scrup. j.

In mortario vitreo diu contritis simul, admisce.

Thuris.



Thuris elect. scrup. ij.

F. Pil. sing. gr. iij.

Capiat unam vel alteram ante usum decocti.

Rec. Myrrh. elect. drach. ij.

Spermat. ceti drach. j.

M. F. pulu. diuidend. in xij. dos. æquales.

Capiat unam mane & vesperi cum decocto.

Rec. Myrrhæ,

Olibani, ana drach. j.

Mellis albi, vnc. ij.

M. S. A. Sumat drach. j. *omni hora.*

Lenia Opiata vespertina.

Rec. Pilul. de Cynogloss. scrup. j. *F. Pil. N.* vj.

Capiat unam vel alteram vesperi ante somnum.

Rec. Pilul. de Styrace. simili dosi: *In eundem usum.*

Rec. Opii lamellatim tenuiter scissi, & lente exsiccati, gr. j.

Corall rubr. gr. xij.

Olibani gr. vj. *M. F. Pulu. tenuis:*

Vesperi, ut prius, assumendus.

Rec. Opii gr. j. *F. Pilul. 2. Capiat unam vesperi.*

Rec. Opii gr. j.

Syrup. Capill. Veneris drach. iv.

Aq. stillat. flor. papau. rhoead. vnc. j.

M. F. Haustus.

Vapores Emollientes.

Rec. Fol. Maluæ,

Bismaluæ,

Mercurial.

Parietar. ana m. ij.

Farin. semin lini vnc. ij. *Cum aq. decoct.*

Vaporem excipe cum aëre adducendo.

SECT.



SECT. 859.

Vid. *Decoctum secundum* §. 858.

- Rec. *Chærophyll. recentis expressi succi,*
Lactis dulc. ana vnc. iv.
Syrup. Hyssop. vnc. j. M.
Bibat vnc. j. omni biborio.

SECT. 861.

- Rec. *Lychnid. saponar. maj. m. ij.*
Endiu. recent. m. iv.
Fol. Cichor. syluestr. m. iij.
Cum aq. decoct. & express. pint. iij. exhibe.
Bibat omni biborio vnc. ij.

SECT. 866.

Vapor.

Vid. 858.

- Rec. *Oxymell. simpl. vnc. iij.*
Syrup. 5. radic. aperient. vnc. ij.
Decoct. hederæ terrestr. vnc. x.
Nitri puri drach. j. M.
Bibat vnc. j. omni hora.
- Rec. *Laudani puri gr. ij.*
Flor. sulph.
Spermat. ceti,
Stibii diaphoretici non abluti, ana drach. j. M. F.
Pulu. tenuis, diuid. in xij. partes æquales.
Capiat unam omni triborio cum uncia una, vel altera,
misturæ præcedentis.
- Rec. *Flor. sulph. drach. ij.*
Olibani scrup. j.
Spermat. ceti drach. ss.
Stib. diaphor. non abluti, drach. j.

M.

M. F. P. diuid. in xij. doses.

Sumat unam omni hora cum vnc. j. Misturæ prioris.

Rec. Olei amygdalar. dulc. recens press. vnc. jss.

Syrup. violar.

Mell. virgin.

Vitell. oui recentis ana vnc. ss. M. accurate.

Lingat vnc. ss. omni hora, donec sputa redeunt.

PERIPNEVMONIA NOTHA.

867. **Q**uæ peripneumonia hyeme a frigore, verno tempore a calore superueniente multoties accidit, oriri solet ex pituita lenta in toto sanguine nata, ex causis recensitis olim (69. 72.), & sensim pulmones infarciendo, donec in pessimum hunc, & improuiso sæpe lethalem, morbum eat.

868. Vbi paululum adoleuit id malum, produxit iam in toto corpore effectus plurimos (72. 73. 74.), tumque præterea eos, qui peripneumonix lentæ proprii (825. 826.), vnde malum curatu difficillimum.

869. Nam missio sanguinis, eousque celebrata, vt in hoc morbo requiritur, (854.) nocet admodum ob debiliora viscera, nimisque aliena humida lenta; hinc primo iuuare visa, mox mala auget.

870. Attenuantia autem adeo hic famigerata, dum impetum in vasa pulmonalia augent, densitatem, impactumque obstruentis sæpe augent, simulque morbum cito reddunt lethalem.

871. Morbus ille senibus, pituitosis, frigidis, catarrhosis, grauedine laborantibus frequens, sequi solet omnes causas, quæ stagnantia cito mouendo in pulmones agunt, vt cursus, declamatio, cantus, ebrietas inprimis a valide calefacientibus, comessatio, calor foci, balnei, solis, maxime si æstus hinc natus subito frigus ingens exceperit.

872. Primo fallaci lenitate opprimit nec opinantes: quippe leui fatigatione, debilitate, prostrato omni fere animi motu, anhelitu, oppressione pectoris incipiens, adeo leues motus excitat, vt vix calor, febrisue indicia moneant periculi: mox vagæ horripilationes, leuiusculi febris insultus adsunt; vnde subito crescente anhelitu & debilitate mors; cuius in vrina & pulsû vix vllum adfuit præsagium.

873. Curatur hac methodo cautissima: 1. mittatur sanguis ex largo vulnere.

2. mox

2. mox eluatur aluus clysmate, quod repetatur quotidie, donec signa docuerint leuari pulmonem. 3. vtatur victu tenuissimo iuris carniū, inprimis cum leui acido, potu tenui ex aqua & melle. 4. vapores, suffitusque descripti (866.), decocta diluentia, abstergentia, lenissime aperientia assiduo potanda, adhibeantur; simulque balnea crurum, pedumque, & larga vesicantia.

874. Ex his omnibus (820. ad 874.) ratio datur, cur pueris hic morbus, scēminisque rarior? vt & iis, qui laxæ sunt structuræ quoad solidorum fabricam cur vix accidat? Cur in his facile, & fere sponte, sanetur? contra in robustis exercitatisque corporibus? ex iisdem pariter liquet, hunc morbum fere fieri ex omni alio prægresso, antequam ex eo moriatur æger: adeoque proximam mortis causam, & vltimum ferme omnium lethalium morborum effectum, esse peripneumoniam.

PERIPNEVMONIA NOTHA.

SECT. 873. N. 2.

Clysm. hic esto hocce.

X

Rec.

Rec. *Mell.* vnc. iij.
Nitri drach. j.
Vitell. ouor. N. i.
Aq. decoct. hordei vnc. viij. F. S. A. clyfma.

SECT. 873. N. 4.

Rec. *Rad. Fenicul.* vnc. ij.
Gramin. vnc. iv.
Fol. Parietar.
Agrimoni. ana m. iſſ.
Sem. contuſ. papauer. alb. vnc. j.
Glycyrrhizæ vnc. iſſ.
 Cum aqua decoct. ſpatio $\frac{1}{4}$ horæ, pint. iſſ. exhibe.
 Capiat vnc. ij. omni bihorio.

PLEVRITIS.

875. **P**leuritis dicitur adesse, quando æger laborat acuta, continua febre (564. 567.), cum pulſu duro; dolore acuto, punctorio, inflammatorio (382. N^o. 3.), in inſpiratu valide aucto, in exſpiratu vel animæ retentione leniori, mitiori pariter, vbi reſpiratio, immoto thorace, maxime ope abdominis fit: tuſſi fere perpetua, dolorem magnum inferente, hinc ſuffocata.

876. Quoties vna cum his ſymptomatibus ſputa ex pulmone ſymptomatica prodeunt; dicitur *humida*; quando hæc abſunt, *ſicca* vocatur.

877. Nulla est pars integumentorum interni thoracis, quam non aggreditur: tota ergo pleura, totumque mediastinum, hinc anterior, posterior, dextra, sinistra, superior, inferior, exterior, profundior pars æque obsidetur hoc malo: sed in primis latera.

878. Vbi autem ipsa membrana costas interne succingens doloris sedes, aut pars illa musculorum intercostalium internorum, *vera*; si autem altius intercostales musculi, externi in primis, vel & his superiora laborant, *spuria* appellatur.

879. Adultos, sanguineos, lautius potos, pastosue, exercitatos valde, acidum raro eructantes, in morbos inflammatorios vergentes; verno tempore, maxime subito æstuante post acre gelu cælo; aut hyberno in acerrime frigido vento; infestat primario: tumque vocatur *idiopathica*.

880. At ex materie prægressi inflammatorii morbi mota, & in loca descripta (877. 878.) delata, exorta *symptomatica* dicitur.

881. Pro causa antecedente habet: i. omne id, quod inflammationi generan-

dæ cuicunque aptum (375. ad 380.). 2. id, quod hanc causam generalem determinat in pleuram præcipue; quo pertinent maxime, natura ægri, intercostales arteriolas angustiores, magisque duras, habentis; morbus præcedens, qui reliquit dispositionem eadem proferentem, vt est scirrhus pleuræ, callus, pulmo adnatus &c.; natura epidemici morbi prædominantis; aër frigidus, per angustas rimas violente actus in nudatum corpus, ex labore vel igne prius valde æstuans; potus gelidus subito, magno haustu ingestus in corpore simili; aër hyemali tempore borealis gelidissimus. 3. *μετάπτωσις* materiæ inflammatoriæ, ichorosæ, suppuratoriæ, prius in toto, vel in aliqua parte, prædominantis, & dein quacunque causa huc depositæ, vt in morbillis, variolis, tumoribus vlcerosis, vlceribus magnis, latis, subito euanescentibus, absorpta venis materie.

882. Historia hæc (875. ad 882.), decursus mox exponendus (883. ad 907.), dissectio cadauerum pleuriticorum clare docent, eam esse inflammationem sanguineam (371.) in arteriolis locorum descriptorum (877. 878.), ortam plerumque ex febre acuta præcedente. 883.

883. Inde (881. 882.) perspicue deducitur mali historia: incipit cum appetitu ciborum sæpe magno; frigore; horrore; debilitate; lassitudine; febre; procedit cum calore, sensim in æstum excrecente; siti; prostrato appetitu omni; dolore abniti in acerbissimum tendente; respiratione valde læsa: viget cum febre violenta, sed minus manifesta ob respirationem coactam, & præ sensu doloris summi suffocatam; vnde sæpe turpiter fallitur medicus: inde definit in varios euentus, pendentes ex pluribus causis, sed inprimis a diuersitate mutationum inflammationis (386. ad 393. 492. ad 500.), natura loci vbi malum est (877. 878.), & consideratione harum circumstantiarum: prout partes plures (877. 878.) affectæ simul; prout impetus circulantis liquidi violentior (92. ad 102.); aut maior malignitas ipsius morbi principis (564. 567.), eo symptomata cuncta peiora; inprimis respirationis & pulsus vitia magis a naturalibus recedentia, vt & excretorum.

884. Exit in sanationem, alios morbos, vel in mortem.

885. In sanationem ope naturæ, vel

X 3

artis

artis in initio, dum simplex adhuc morbus.

886. Sanatur auxilio naturæ, vel resolutione benigna, vel coctione & excretionem mali.

887. Resolutione, si contingunt simul causæ (386. 401.); tumque benignitas symptomatum nihil agendum docet, nisi ut leui victu, blandissimis aperientibus, mollissimo fotu, malum leuetur.

888. Coctione & excretionem causæ sanatur, inprimis obseruatis hisce. 1°. quoties hæmorrhoides debita copia liquidum aptum oportuno tempore fundunt; 2°. quoties vrina copiosa, crassa, hypostatica, stranguriosa, subrubra cum albo sedimento fluxit cum leuamine malorum ante quartum diem, qualis & siccam sanauit; 3°. si aluus materiem flauam biliosam ante quartum diem copiosam cum leuamine eiecerit: 4°. si abscessus ichorosi, purulenti, fistulosi, diu manantes, ante sextum diem incepti, post aures, vel ad crura, prodierunt (iuxta 837. ad 843.); 5°. dolor lateris si transit ad humerum, manum, dorsum, cum stupore, dolore, grauitate illarum partium, 6°. si sputum
ex

ex parte liberale, leuans, sine coryza, copiosum, mox puriforme, album statim, vel ante diem quartum, continuatum, vel a suppressione statim redeuns, inde enim nono vel vndecimo die salus.

889. Vbi signa accurate obseruata docent, statum pleuritidis (875.) adesse modo descriptum (888.), tum medico nihil mutandum, sed omnia continuanda incumbunt. Ergo neque venæ sectio, neque euacuatio, vel mutatio alia instituenta. 1°. victu molli, tenui; animi, corporisque quiete; aëre temperato calido, & humido; somno spontaneo, vel lenibus conciliato; medicamentis mollibus, tenuibus, leuissime aperientibus; vtendum. 2°. deinde euacuationi cuiuslibet singulari proficienti prouidendum: ergo in statu (888. N°. 1.) anus fouendus molli, laxante, aperiente fotu; aut, si minus sic processerit, hirudinum applicatarum sucu. Si (888. N. 2°.) obseruatur; statim fomenta similia renibus, perinæo, hypogastrio apponenda; lenia diuretica aperientia danda; aër paulo minus calidus curandus; sudor, & aliæ euacuationes, vitandæ; blanda clysmata diuretica profunt.

In casu vero (888. N°. 3.), similia fomenta emollientia toti obuoluenda abdomini; clysmata laxantia iniicienda aluo; victus laxans instituendus: vbi denuo quartus status (888. N°. 4.) adest præuifus (838.), & simul locus (839. 840. 841.) innotuit, tum vtendum memoratis (859. 860. 861.), & apertura facta suppuratoriiis locum aliquamdiu apertum tenentibus: deinde in casu (888. N°. 5.), præter communia, partes, in quas dolor migrat, fouendæ mollibus, calidisque, fricandæ leuiter, stimulantæ emplastris parumper attrahentibus. Denique in vltimo dato (888. N°. 6.) tota res eadem ac in peripneumonia bona, adeoque omnia huc repetenda ex (850. 851.), & agenda.

890. Arte autem, sine alio morbo, fanatur pleuritis hac inprimis methodo: si pleuritis (875.) recens ante tertium diem finitum, magna ex symptomatibus validis (875. 883.), sicca (876.), in robusto, exercitato, sicco corpore, sine spe, vel præsentia (887. 888.); tum 1°. cita, larga, accelerato fluxu celeris, ex magno vase, per magnum vulnus, missio sanguinis instituenda, corpore quiescente, supino,
&

& respiratione, dum fluit, tussi, suspiriisque accelerata, loco affecto eodem tempore foto, & leniter perfrieto; debet continuari in remissionem satis notabilem doloris, vel ad prima signa deliquii animi; debet repeti ex consideratione redeuntium denuo symptomatum, ad quæ tollenda prima instituta fuit; crusta (384.) absens finem definit. 2°. statim adhibenda fomenta, balnea, tepesfactoria, linimenta, emplastra, quæ laxando, resoluendo, mitigando, auertendo, prodesse queant. vid. (395. N°. 6. 398. N°. 3.) 3°. tum ea medicamenta danda, quæ diluant, resoluunt, laxent, mitigent, refrigerent, dolorem leniant, aut sopiant: quæ calida, humida, magna copia, sorpta, & ad locum affectum determinata, iuuant, & pro mutatis phænomenis varia assumenda sunt, semper curando, vt elegantur illa, quæ putredini aduersissima. 4°. victu tenui, molli, refrigerante, antiphlogistico est opus. 5°. denique omne exsiccans, calefaciens, impetum augens, vitandum; vt calor aëris, solis, foci, lecti, victus, medelæ.

891. Quæ ipsa (890.) quamdiu continuanda,

X 5

nuanda, vel repetenda sint, docet morbi pertinacia, remissio, atque in sanationem (888.) mutatio.

892. Abit in alios morbos dum .i. suppuratur locus inflammatus, quod futurum scimus *α.* ex signis generalibus (387. 402.) *β.* ex pertinacia doloris, tussis, febris, ultra quartum diem. *γ.* absentia signorum resolutionis (887.), & sanationis (888.) *δ.* neglectu medelæ requisitæ (890.).

893. Ipsum vero apostema iam fieri, scitur ex signis communibus (405.), maxime hic ex horrore sæpe recurrente sine causâ, & signis datis (834. 835.) in peripneumonia, & tempore morbi: inde & factum cognoscitur, & quandoque sputo per pulmonem euacuatur.

894. Abscessus vero ille pure proprio rumpitur, vnde pus stillat in caua pectoris; vlcus nouo pure facto & accumulato totum cauum replet, totum corpus consumit; id factum noscitur ex prægressis signis (892. 893.) duratione mali vsque in decimum quartum diem; symptomatum subita remissione, & repentino reditu: inde Phthisis.

895. Vbi ergo per signa (892. 893.) nouimus inflammatum abscedere, locus ante dolens notus per caustica erodendus, vsque circiter ad pleuram incidendus, suppuratoriis apertus seruandus, vt materies extrorsum versa vi pulmonum a pleura caueat, ne fiat empyema: dein emolliendus, donec mundatio facta sit.

896. At vero si constat per signa (302. 894.) iam rupto apostemate pus formasse empyema, ilico thorax aperiendus (303. N^o. 5.), pus educendum (303.), vulnus percurandum (304.) victu, & medicamentis.

897. In alium quoque morbum abit, scirrhus, callosus factus loco affecto, tum etiam pulmone pleuræ iam adnato; quæ vbi facta, oritur asthma, dyspnœa, tussicula sicca, imprimis a pastu vel motu corporis; ex quibus cognoscitur, si præsentia sunt sine signis abscessus (893.), vel empyematis (896.) & imprimis si diu, sine magno mali incremento durant.

898. Cognitum hoc malum (897.) vel nullo remedio medicabile; vel tollitur vita duriore, labore, aëre libero, rusticatione, equitatione forti, multumque repetita.

899.

899. In gangrænam quoque talis inflammatio transit primo lateris, mox, vicinia loci, pulmonis (844.).

900. Quod malum (899.) vel ex vehementia pleuritidis, vel ex acri, aut putri materia concomitante simul oritur.

901. Id vero futurum esse, & iam inchoari præfagitur ex variis: si sputa purulenta subbiliosa, rotunda, purulenta subfanguinea, nigra fuliginosa, cœnosa, fœtida, strepitus in pectore multus cum vultu moesto, oculis rubro flavis, puluerulentis, caliginosis, si sputa initio varia; tum sæpe tertio vel quinto die moriuntur. Si stertor, sputum nullum, vel difficile, pulsus languidus, vrina flammea: si alui fluor liquidus, fœtidus, putridus, symptomaticus: si superuenit magna peripneumonia: si nouus insultus priori succedit: si sanguis floridissimus effluit ex vena secta sine crusta inflammatoria (384.), licet ex largo vulnere, pleno saltu, puro vase exceptus sit: si sputum supprimitur dyspnœa manente, vel aucta cum dolore, grauitate pectoris, pulsu duro, paruo, celeri, calore magno; hæc enim quinto die exacerbata septimo mortem inferunt: si
vrina

vrina prærubra, obscura, cum varia hypostasi, nec discreta, intra quatuordecim dies occidit: si hypostasis nigra vel furfuracea, citior mors: si initio mitis, quinto vel sexto die exacerbata, septimo & duodecimo periclitantur, raroque sanantur, nisi post quatuordecim dies: si dorsum, latus, humeri, cum rubore accenduntur cum angore summo, alui fluxu viridi, & fœtidissimo.

(901.) Si sicca ob defectum virium, ob dolorem summum, ob ineptitudinem materiæ ad expulsiõnem, ob vasa nimis contracta & crispata, ob nimium vsum calidorum, dolore simul vergente ad superiora: si lingua statim sicca, sordibus obfita, liuida, nigra, cum bulla nigra: si horum signorum singula, vel plura simul, eueniunt, plerumque morbus ex se lethalis, non facile sanandus, sed vt plurimum gangræna loci in latere, & vicino in pulmone, necat.

902. Quando autem hæc signa (901.) iam imminere id malum (899.) designant, statim vno impetu summa remedia tentanda sunt, nec vitæ auxilio, nec leuiori fidendum medelæ, modo aliquæ vires superfint.

903.

903. Ergo hoc casu (902.) statim crustæ ferro ignito in loco affecto profunde inurantur, dein fortibus emundantibus obducantur, & penetrantissimis fomentis calefiant assidue; tum fortia diluentia, aperientia, antiseptica, sudorifera, larga copia hauriantur. His enim, si vllis, lenietur mali sæuities.

904. Sed si causa inflammatoria vehementissima summa crearit symptomata pleuritica, nec auxilio naturæ (887. 888.), nec remedio vlli antipleuritico (890. 903.) cedentia, & hæc dein subito, sine causa tolluntur, quatenus ab inflammatione pendebant, manente pulsu paruo, celeri, intermittente, respiratione celeri, paruaque, sudore frigido, constat gangrænam iam occupasse loca inflammata. Hinc delirium breui, statimque mors, maxime si simul liuidus thoracis color: quod idem fit, si ille, qui sputum subbiliosum excreat, dolore leuatur sine ratione, tunc enim pariter lethalis insania, mortis ex gangræna nuncia, adest.

905. In mortem exit ipsa pleuritis tunc, quando tam vehementes causæ eius, vt dolor productus omnem motum thoracis

racis supprimens breui creet, impedito sanguinis traiectu, peripneumoniam lethalem (848.) quam breuissime.

906. Hinc liquet, cur omni sæuiori pleuritidi peripneumonia superaccidat? cur senibus, puerperis, grauidis, plerumque lethalis? cur thoracis per fasciam adstrictio adeo dolorem leuet, vt morbum tolerabilem reddat?



IN PLEVRITIDE

SECT. 887.

Vid. *Decoët.* §. 873. N. 4. §. 861. 859.

SECT. 890. N. 2.

Fomentum.

Rec. *Fol. Maluæ,*

Bismaluæ.

Parietar. ana m. ij.

Papauer. hortens.

Hyoscyami, ana m. j.

Flor. Sambuci,

Chamamel.

Melilor. ana vnc. iij.

Cum lacte dulci decoët. est Fomentum.

Hinc balnea & tepidatoria intelliguntur.

Linimenta adinungenda latera.

Rec. *Sacchari Saturni* drach. iv.

Acet.



- Aceri* drach. vi.
Ol. Rosac. infus. vnc. j. M. F. Nutritum.
 Rec. *Vnguenti popul.* vnc. ij.
 Rec. *Emplastr. diapomphol.* q. s. Extende ad alutam.

SECT. 890. N. 3.

- Rec. *Fol. Tussilag.*
 Maluæ, ana m. ij.
 Flor. Papauer. errar.
 Althææ, ana m. ss.
 Rad. Petroselin.
 Sarsaparill. ana vnc. iij.
 Sem. Lini contrus. drach. iv.
 Lactuca,
 Card. Mariæ, ana vnc. j.
 Cum aq. decoct. pintas iij. exhibe.
 Bibat vnc. ij. *omni hora.*
 Rec. *Sem. 4. frigid. mai.*
 min. ana drach. iij.
 Papauer. alb. vnc. ij.
 Cum *Aq. decoct. hordei* F. S. A. emulsio, cuius *vnc.* xiv.
 admisce
 Nitri puri drach. jss.
 Syrup. capill. Veneris vnc. j.
Bibat vnc. j. *omni hora, vel 3 omni $\frac{1}{4}$ hora.*
 Rec. *Aq. stillatit. flor. Rhoæados*,
 Sambuc. ana vnc. viij.
 Borruginis vnc. v.
 Lapid. Cancror. drach. ij.
 Prunellæ drach. j.
 Syrup. flor. Rhoead.
 Papau. alb. ana vnc. j. M.
Bibat vncias ij. *omni semihora.*

SECT.



SECT. 903.

Rec. *Fol. Scordii*,
Alliaria,
Marrub. alb. ana vnc. ij.

Cum aq. decoct. pint. ij. admisce
Oxymell. scillit. vnc. viij.
Nitri drach. iij.
Aceci theriacal. vnc. j.

Bibat vnc. ij. *omni* $\frac{1}{8}$ *horæ calidissimas.*

PARAPHRENITIS.

907. **S**i morbus pleuritidi similis occupat eam membranæ pleuræ partem, quæ diaphragma ambit, vel & ipsum septum medium, oritur morbus dirus, quem paraphrenitidem appellant.

908. Qui longe frequentior, quam vulgo quidem censetur, licet præsens sæpe ignoretur, negligatur, vel alterius morbi titulo tractetur.

909. Cognoscitur ex febre acutissima, continua; dolore inflammatorio loci intolerabili ob membranas neruosas; qui dolor immaniter augetur in inspiratione, tussi, sternutatione, repletione stomachi, nausea, vomitu, compressu abdominis in aluo, vel vrina reddendis; respiratione hinc sublimi, parua, celeri, suffocatiua,
Y
qui-

quiescente abdomine, solo thorace peracta; delirio perpetuo; hypochondriorum introfurfum reuulfione; rifu fardonio; conuulfione; furore; gangræna.

910. Exitus idem, vt in pleuritide (884. 892. 896. 897. 899.), fed ob motum partis magnum & affiduum, ob neceffitatem ad vitam, ob neruofas membranas tenfas, omnia velociora, funeftiora; & afcites hinc purulentus.

911. Curatio hinc eafdem diftinctiones & cautelas requirit, tum eadem ferme remedia, exceptis iis, quæ loci fitus refpuit. Clyfmata mollia ob viciniam loci fæpe iuuant.

912. Vbi vero fuppurato diaphragmate prius inflammato, abfcelfus in caua abdominis ruptus fuum pus euomit, fit collectio eius in abdomine, aggeftio, putrefactio, tumor, vifcerum exefio, tabes miferiffima, mors.

913. Eftque totum hoc malum infuperabile, licet cognitum.

HEPATITIS, ET ICTERVS MVLTIPLEX.

914. **V**t vifcera & partes, de quibus hactenus, ita hepar quoque inflamm-

flammationis capax; licet raro de eo cogitetur, & forte etiam non ita frequens sit ob arteriæ hepaticæ paruitatem, & minorem impetum sanguinis venæ portarum.

915. Locum ergo habet in finibus ultimis vtriusque huius vasis (914.), hepatis adferentis cruorem effectum arterioso; hinc, ut pulmonis, duplex est sede, origine: ita tamen, ut vnam natam altera facile sequatur.

916. Antecedunt vtramque (915.) causæ similes, nempe generales inflammationis cuiuscunque (375. ad 380.) determinatæ inprimis ad hæc loca; tum nonnullæ huic maxime loco propriæ, quæ multæ quidem huc referendæ: obesitas omenti ingens; atrabilaria cruoris, bilisue temperies; acrimonia stagnantis alicubi materiæ purulentæ, ichorosæ, scorbuticæ; si his accedit calor, febris, motus, victus, medicamentum, venenum, quod eliquat, mouet, in hepar promouet; bilis pinguis, acris, exusta, per suas causas agitata; lapis, gypsus, scirrhus, callus, steatoma, apostema, cancer, vermis, aliquem locum iecoris, vesiculæ fellis, meatus biliarii occupans, premens, comprimens, si

acceſſerit tum ſimilis cauſa excitans, vt mox enumerata; ſubita fortis frigoris per aërem, potum, natationem, calefacto fortiter prius iecori applicatio; fitis diuturna in magno motu, æſtu, ſudore; febris ardens cum inedia & defectu potus; ſummæ animi perturbationes; maximi motus per vomitoria excitati; mala hypochondriaca inueterata.

917. Ex his tam multiplicibus cauſis (916.) orta inflammatio varios habet effectus pro varietate diſpoſitionis præcedentis in iecore, pro varietate materiæ motæ & inflammantis; tandemque pro varietate cauſæ pellentis.

918. Dum vero indolem communem inflammationis ſequitur, vaſcula obſtruit; fluida ſiſtit; tumorem eleuat; vicina comprimit; eadem ac in ſuo loco producit; hinc ſenſim increſcit, totum fere occupat, ventriculum impedit, & ab eo repleto dolet, ſic & diaphragma; omnem cruorem arteriæ cœliacæ, & binarum meſentericarum impedit, ad hepar ſiſtit; adeoque omnem venoſum, arterioſum, lymphaticum fluorem in viſceribus primis abdominalibus integre impedit; bilis

lis generationem, secretionem, excretionem, circulationem, actionem inuertit; icterum producit, eiusque effectus, putrefactionem omnium liquorum & viscerum abdominalium producit; vnde infinita mala.

919. Habetque pariter exitum in sanitatem, alios morbos, mortem.

920. In sanitatem transit beneficio naturæ, vel artis.

921. Per naturam autem benigna resolutione, aut coctione & excretionem materiæ morbosæ.

922. Resolutione, si materies recens, lenis, & reliquæ conditiones adsunt (386.): tum ars diluendo, soluendo, leniter mouendo, per epithemata, potus, clysmata, negotium promouet.

923. Coctione, & excretionem, dum in morbo hoc per sua signa (916. 917. 918.) cognito 1. aluus fluit biliosis cum paucocruore ante diem quartum; 2. vrinaue excernitur multa, acris, crassa, rubra cum sedimento subalbo, diu continuata, ante diem quartum; 3. superueniente dolore mitiori lienis ante signa suppurationis; 4. hæmorrhagia larga ex nare dextra; 5. sudoribus,

ribus, materie, loco, tempore, continuatione, effectisque, bonis.

924. Vbi primum apparet (923. N^o. 1.), statim epithematibus, clysmatibus, fomentis, potibus, victu, medicamentis, ea sunt subministranda, quæ valent diluere, resolvere, mouere, abstergere, leniter expellere, putredini biliosæ inprimis obesse.

925. Si alter casus adest (923. N^o. 2.) vtendum dictis (889. ad curam 888. N^o. 2.), inque iis addenda parum deterfiua.

926. In tertio casu (923. N^o. 3.) eadem (924. 925.) peragenda; sed lienî simul, & toti viæ ab eo in hepar, fomenta similia danda.

927. In quarto (923. N^o. 4.) nares interne & externe emollientibus, tepidis fouendæ, donec ad leuamen symptomatum fluxerit sanguis; tum vero, si nimius fluor, compescendus lente per stiptica & diætam; ne nimis cito.

928. In quinto denique (923. N^o. 5.) requiritur vsus decoctorum diluentium, abstergentiumque largus.

929. Inprimis in his (924. ad 929.) cautio sit, ne aliquid materiæ morbi in loco

loco restet, difficulter postea superandæ: & inde prima, atque benigna icteri species curatur.

930. Si recens, vehemens, sine signis & spe (922. 923.), erit tractanda eisdem cautelis, remediis, methodo, ac pleuritis (890.), paraphrenitis (911.), & similes morbi: nisi quod ea, quæ leniter vi antiphlogistica aluum emolliendo subducunt pota, & per clyσμα iniecta, inprimis hic profint.

931. Signa autem perfectæ sanationis, color non amplius ictericeus in oculis, facie, vrina, fœce alui, cum absentia symptomatum (918.).

932. Vnde noscitur origo, natura, effectus, curatio secundæ speciei icteri grauioris.

933. Si autem in hepate inflammato (914. 915.), remedia (922. ad 931.) non, ferro, frustra applicata; causa maior; tum orietur suppuratio (387. 402.) iecoris, similis vt alibi, nisi quod ob copiam multi hic liquidi cruenti & biliosi stagnantis raro bonum pus, nisi in paruis & exterioribus, plerumque vero funesta putredo.

934. Cognoscitur id futurum i. ex
Y 4 signis

signis prægressæ inflammationis in loco, dolore inflammatorio, ictero flauo in oculis, cute, vrina, fœce alui, apparente, febre acuta. 2. ex absentia resolutionis (922.), cocti excretionis (932.), aut sanationis (924. ad 933.) 3. ex mutatione symptomatum, remissa acutie doloris, sequente pulsatione, manente ictero, horribus vagis. 4. ex duratione inflammationis non pessimæ vltra triduum.

935. Factum nouimus: 1°. ex signis (934.) prægressis. 2°. tumore loci. 3°. mutatione symptomatum, loco doloris iam præsentē grauitate partis manente ictero. 4°. ex debilitate magna, febricula hæctica, siti ingente.

936. Tale apostema vel 1°. totum depascitur iecur; 2°. vel rumpitur in caua abdominis effuso pure sanioso; vel 3°. per vasa biliosa in intestina; vel 4°. per venam cauam in cruorem; vel 5°. elato tumore accrescit peritonæo, atque ibi abscessum externum hepatis format, ibi apparentem.

937. Vbi hepar consumitur, tum tabe lenta icterica, cum febricula assidua, siti intolerabili, debilitate summa, anxietate in-

inexplicabili, vrina fere nigra, tympanitide, fluore alui sanioso, foetidissimo, diu luctatus moritur.

938. Qui casus (937.), eousque prouectus, nullam medelam, vix palliationem capit; hæc noua icteri idea.

939. Si vlcera facta hepatis, & iam rupta effuderint suam materiem in caua abdominis, collecto ibi puri assiduo nouum addunt; omne corporis humidum & pabulum in nouum pus conuertunt, cuncta viscera putrefaciunt, hinc asciten, mentiendo tympanitidem, creant, vnde post lentam, terribilemque tabem, & eius symptomata, mors: similis fere priori (938.) hæc icteri species, nulla arte sanabilis.

940. Quoties vero suppurata materies & ichor, exesis finibus meatuum biliosorum, in horum amplitudinem, indeque in intestina fluxerint, pro varietate affectatæ viæ, vomitus foetidos, putrefactos, purulentos, ichorosos, albi, cinericei, fusci, flauī, nigri coloris, vel similes alui euacuationes producunt, cum summa virium iactura, titulo fluxus colliquatiui, breui lethales. Nouus hic iterum icteri exitus, maxime metuendus.

941. Si vero in venæ cauæ exesos fines, hinc in ipsam, denique in massam sanguinis eadem liquida (940.) se effuderint, miscuerintque, teterrima oriuntur, & breui exitialia, symptomata; animi deliquia enormia, frequentia; debilitates summæ; pulsus omnimodo malus; perturbatio omnium functionum simul; mors improvisa. Nouus iterum icterus.

942. Quo quidem casu (941.) nulla valida medela habetur, largus autem vsus eorum, quæ vires focillant, putredini resistunt, humida restituunt, aliquid proficit.

943. At si vltima obtinet mali species (936. N°. 5.), tum deprehensus tumor, lino, ferro ignito, causticis, lanceola aperitur; vulnus leniter erodentibus & suppurantibus tam profunde exeditur, donec ad vomicam peruentum.

944. Si tum album, æquale, læue, inodorum, specillum non colorans, pus extrorsum exit, spes est: oportet enim vt vlcus tractare (402. ad 413.); simul interna depurantia medicamenta adhibere.

945. Si autem flauus, fuscus, liuidus, niger, foetidus, specillum colore iridis infici-

ficiens, saniofus, amurcofus ichor prodit, fenfim exedetur iecur; confumetur æger; fientque fere eadem fymptomata (941.).

946. Atque rurfum fi poft inflammati-
onem iecinoris adfunt conditiones (392.)
fcirrhus ibi nafcetur; qui tumore, duri-
tie, incremento, & fuam fedem, & vici-
na lædit, hinc iterum eadem fere mala, fed
lenta producit (881. 882. 883.); mollibus
non aufcultat; acribus in cancrum (492.)
horrendum vertitur, cuius dein terribilia
effecta intelliguntur ex (499.) comparato
cum hac fede affecta: præcipuum fcirrhi
talis effectum, icterus perpetuus.

947. Vnde patet, id malum per fua fi-
gna cognitum (946.) mitiffime tractan-
dum, fanari vix vnquam.

948. Si autem in parua modo parte
iecoris exigua talis inflammatio hæfit, cal-
culo, fcirrho exiguo, puftulæ, exiguo ab-
fcessui, originem dabit: quæ per fe pa-
rum, fed orta febre multa mala pariunt
(881.).

949. Tandem etiam inflammatio he-
patis definit fubito in mortem, fi cauſæ in-
flammationis tam validæ, vt nihil per to-
tum iecur tranſire queat, febre fimul in-
tenſa

tenſa vrgente: tum ſtriſtum ad fines, dilatatum ad vaſa hepar, nullam functionem obit; fit icterus ſubitus & ingens; rumpuntur vaſa; effunditur ſanguis & bilis; moritur ilico æger. Id futurum prædicit. 1. viſ morbi in hepate cognita. 2. ſumma & ſubita reſolutio virium: at vero iam fieri docet vomitus, aut ſecefſus ſanguinis, bilis, fœcis amurcoſæ, viridis, nigræ, fœtidiffimæ, cadaueroſæ; ſingultus magnus, perpetuus; febris intenſiſſima; ſitis inextinguibilis; ſubitus admodum pallor.

950. Ex his omnibus expoſitis (914. ad 950.) intelligi poſſunt infinita ſymptomata in morbis acutis occurrentia; quorum ignota ratio inanes malignitatis fabulas produxit: nam ab hepate omnia viſcera abdominis, adeoque omnes illorum actiones, digeſtionis, aſſimilationis, nutritionis, reſectionis ſanguinis, excretionis aluinæ, pendent. In hepate triplex, facile in calore putreſcens humor, ſanguis multus & ſolutus, bilis veſicaria, & hepatica: Hepatis cum diaphragmate & corde magna vicinitas: finibus bilioſis obſtructis facile liquor portarum bilioſus

fus in cauam transit. Tum ex iis solis
 perspicitur, quam varia, quam multiplex
 icteri idea? cur aliquando facile sanetur,
 & quando? cur sæpe sit pertinacissimus?
 cur sæpe cito, sæpe tarde admodum oc-
 cidat? Cur per vices accedat, maneat,
 abeat, redeat? cur cum tantis anxietati-
 bus, vomitu, dolore, conuulsione, præ-
 cedentibus, appareat, quiescat, redeat?
 & quid tum denotet? Cur in acutis tam
 calamitosus ante septimum diem? Cur
 tam inexpugnabilis in iisdem post septi-
 mum diem? Cur dysenteria larga, cito
 desinente, tam bene sanetur? Cur missio
 sanguinis tam parum hos morbos iuuet?
 Cur in omni morbo acuto adeo atten-
 dendum sit ad hypochondriorum dolo-
 res, tumores, retrosursum eleuationes?
 Cur color oculorum, vrinæque tam cito
 icterum præsentem & abeuntem desi-
 gnent? Cur vitia inflammatoria, suppu-
 ratoria, gangrænosa, scirrhusa, cancro-
 sa, lienis, ventriculi, omenti, mesenterii, in-
 testinorum, semper ipsum hepar adeo
 violenter infestent? Cur tam enormiter
 vitia inflammatoria hepatis vicissim &
 scirrhusa illa afficiant? Cur iecur tam im-
 men-



mensum augeri, tumere, iterumque exsic-
cari possit? cur hydrops a malo hepatis,
& tympanitis eo crudelior? Cur ab hy-
drope extenuatio, & exsiccatio hepatis,
cum prætumido liene; quæ dysenteria
hepatica? &c. sunt enim infinita, quæ
huc spectant.



IN HEPATITIDE ET ICTERO MVLTIPlici.

SECT. 922.

Vide de resolutione §. { 54. N. 4.
75. N. 5.
88. N. 5. 6.
135.

SECT. 924.

Vide §. { 54. N. 4.
88. N. 5. 6.

SECT. 927.

Stipticum hic necessarium.

1. *Lenius.*

Rec. *Alumin. rup.* drach. j.

Aq. stillar. plantag. vnc. j. M. solue.

Turundis ingestis applicetur cauo narium.

2. *Fortius.*

Rec. *Sacchar. Saturn.* drach. j.

Aq.



Aq. stillatiz. rosar. vnc. j. M.
In eodẽm vsus.

3. *Fortissimum.*

Rec. Vitriol. commun. drach. j.

Aq. stillat. Rosar. drach. vj. M.
Similes in vsus.

SECT. 928.

Vid. 54. N. 4.

SECT. 930.

Remedia hic fere propria.

| | |
|--------------------------------------|--------------------|
| Acetosa hortensis. | Cichoreum sativum. |
| - - - - pratensis. | Dens Leonis. |
| - - - - rotundifolia. | Endiuia. |
| Acetofella. | Fumaria. |
| Atriplex sylvestris. | Hieracium. |
| Bonus Henricus. | Lactuca. |
| Chondrilla. | Oxylapathum. |
| Cichoreum agreste. | Portulaca. |
| Syrupus Borraginis. vnc. ij. | |
| - - - - Cichorei cum Rhab. vnc. iij. | |
| - - - - Fumariæ vnc. ij. | |
| - - - - 5. rad. aperient. vnc. ij. | |

Rec. Tamarind. vnc. j.
Prunor. acido-dulc. vnc. iij.
Vuar. passular. sine gigartis.
Corinthiac. ana vnc. ij.
Flor. Taraxac.
Cichorei sylvestris, ana vnc. j.

Rad. Scorzonæ. vnc. iv.
Cum aq. decoct. spatio $\frac{1}{2}$ horæ lib. ij. admisce.
Sal. polychrest. drach. j.
Syrup. cichor. cum rheo vnc. iis.
Bibat vnc. j. omni semiborio, donec leniatur aluus, cum
regimine.

Rec.



Rec. Syrup. cichor. cum rheo vnc. ijs.

Sal. prunell. drach. j.

Aq. stillat. cichorei.

Fumar. ana vnc. ij. M.

Capiat cochleare j. omni semiborio, in eisdem usus.

SECT. 942.

Æstiuo tempore.

Rec. Baccar. matur. Mori.

Ribesior.

Sambuci.

Cerasor.

Berberis, ana vnc. iv.

Contusis expressum succum decoque; tum vnc. j. *hujus*
succu admisce

Vitell. ouorum N. j.

Succi citrei drach. j.

Vini rhenani vnc. j.

Panis tost, tenuissime contriti, q. f.

Sacchari q. f. F. Haustus.

Hyemali tempore.

Rec. Rob. ex iisdem vnc. j.

Elaosacch. de nuce myrist. gr. v.

Aq. stillat. cortic. citrei. vnc. ij.

Vini Rhen. vnc. j.

Vitell. ouorum N. j.

Sacchari q. f.

Hæc cum pauxillo Panis tost infusa, expressa exhibe.

Ad idem.

Rec. Fol. elect. rec. & caulium Lactucæ,

Endiuia,

Taraxaci

Portul. ana vnc. vj.

Acetosa vnc. iij.

Munda-

Mundata, lota, iterum excussa aqua, cum iure carniū
& pauxillo butyri, salis & nuc. myristicæ, leniter, vase
clauso, cocta comedat.

VENTRICULI INFLAM- MATIO.

951. **V**t reliquæ partes, ita quoque sto-
machus vera inflammatione
corripi potest. Cuius signa, & effectus
hæc fere habentur: dolor ardens, fixus,
pungens in ipso stomachi loco; eius ex-
acerbatio in ipso puncto, quo aliquid ei
ingeritur, vomitus dolentissimus statim
ab omni ingesto, cum singultu dolorifi-
co; anxietas summa & perpetua circa
præcordia; febris acuta continua. Eius
causæ generales inflammationes, vel vici-
nia aliorum, vel acria ingesta.

952. Breui plerumque lethalis fit, nisi
subito curetur, ob læsam necessariam fun-
ctionem, & infinitos nervos connexos.

953. In sanitatem; morbos suppura-
torios, scirrhosos, cancrofos, gangræno-
fos; vel in subitam mortem convulsioni-
bus acceleratam, transire, vt reliqui in-
flammati, solet.

954. Simulac præsens per sua signa sci-
tur (951.), statim valida sanguinis misfio-

Z

ne,

ne, si opus repetita; potu lenissimo nutriente, emolliente, antiphlogistico, causæ contrario; clysmatibus, fomentisque similibus, diligentissime vtendum. Cauendum summopere ab omni acri, maxime autem a vomitu.

955. Si in suppuratum abit multa mala, maxime nausea, vomitus, dolor, succedunt, quæ sæpe mirabilia apparent; ignorata causa, raro curantur; cognita (951.) per curam abscessus tractari requirunt (402. ad 413.).

956. Vbi scirrhum, cancrumue procreat, tum enormes illos vomitus, dolores intolerabiles, ad minima ingesta acerbatos, fixos, diuturnos, ad omnia medicamenta aspera insurgentes, excitat.

957. Solis lenibus, ad hos morbos requisitis, medelis pacatur (490. 491. 506. 507. 508. 509. 511.); raro curatur: aquæ medicatæ fontium maxime hic efficaces.

958. Lienis, pancreatis, omenti, inflammati, suppurati, gangrænosî, scirrhomî, cancrôsî, origo, natura, effectus, cognitio, præuisio, curatio, palliatio, ex iisdem dictis (914. ad 958.) hauriri possunt.

AD



AD VENTRICVLI INFLAMMA- TIONEM.

SECT. 954.

Potus leniens &c.

Rec. *Fol. rec. trifol. Acetos. vnc. iij.*

Maluæ m. iſs.

Auenæ integræ vnc. j.

Cum *ſero lactis rec. decoct. vnc. xij. adde*

Vitell. ouorum N. ij.

Rob. Ribesior. vnc. j.

Clyſma.

Rec. *Fol. recent. Endiv.*

Cichor.

Fumar.

Maluæ, ana m. j.

Cum *ſero lactis decoct. & expreſſ. vnc. x.*

Adhibe pro clyſmate bis, vel ter, de die.

INTESTINORVM INFLAM- MATIO.

959. **I**nſteſtina, maxime tenuia, & frequentiffime, in ſuis membranis acuta inflammatione, vt ventriculus, ſæpe infeſtantur, a cauſis communibus inflammationis huc delatis; vel a materie acri potus, cibi, condimenti, medicamenti, veneni, aſſumta, huc delata, in plicis valvuloſis retenta, hærente; tum etiam ab acri, putrida, fœtida materie purulenta,

Z 2

ta,

ta, ichorosa, gangrænosa, biliosa, atrabiliaria, ex cæphago, stomacho, hepate, liene, pancreate, omento, huc appellente, hærente, rodente; denique ab conuulsione ingente prægressa, flatus creante, motum sistente, sicque inflammationem creante.

960. Nata his locis, contrahit intestina; cauitatem claudit; transitum appulsi impedit; fistulam loco obstructo altior, ipsumque ventriculum immaniter inflat; extendit, dilacerat, inflammat; hinc dolorem acutissimum, ardentem, fixum, creat, perque omnem inflammatum locum extendit; conuulsiones violentas, ubi appulsis irritatur, producit in diaphragmate & abdominalibus musculis; aluum claudit; vomitum excitat ingestorum, & appulsi, citius, tardiusue post assumptionem, prout superius, vel profundius hæsit; flatus dolentes; tormina cum borborygmis acutissima; ileum; voluulum; abscessum; gangrænam; scirrhum; cancrum; febrim acutissimam; debilitatem ex dolore acerbissimo summam; mortem citissimam, producit.

961. Quamdiu in gradu inflammatorio

rio subsistit, doloris iliaci nomine imponit incautis, frigori, flatui, vento, periculoso successu adscribitur, calidis tractatur, & carminantibus, euentu funestissimo.

962. Cognoscitur autem facile pro vera inflammatione ex febre acuta continua comite; siti ingente, calore magno, pulsu duro, dolore igneo, vrina flammea, debilitate subitanea.

963. Si flexum coli occupat (959.), facit colicum dictum dolorem; si recti intestini vltima infestat, tum pro hæmorrhoidibus cæcis haberi solet: soluitur dysenteria blanda subcruenta biliosa.

964. Simulac noscitur præsens per signa (959. 960.) in eo statu statim, maximo molimine tentanda sanatio, quæ acquiritur 1. missione larga, & repetita sanguinis, ut in pleuritide (890.) 2. assiduo iniectione clysmatum laxantium, diluentium, antiphlogisticorum, sæpe repetitorum ad tertiam, quartam, & ultra, vicem vno die. 3. potu assiduo calido eorundem, additis prudenter opiatibus, & iis, quæ causæ singulari compertæ (959.) aduersa sunt. 4. fomentis ex similibus toti abdomini applicatis, maxime ex iunioribus, viuis, vali-

dis, fanis, animalibus impositis. Atque
 5. interim caute cauente ab omni acri,
 impetum augente, calefaciente, potu, ci-
 bo, medicamento, motu, animi affectu.
 6. tamdiu persistendo in vsu horum, do-
 nec omne malum sedatum sit, nec tribus
 diebus redierit.

965. Si malo hoc (959. 960.) prægres-
 so; nec debitis remediis curato; & vltra
 triduum semper cum vehementia persi-
 stente, loco doloris, ardoris, distractionis,
 successerit horror vagus per totum cor-
 pus sine causa, obtusus cum grauitate do-
 lor in loco, signum erit ibidem formari
 abscessum, vnde intra quatuordecim dies
 eo rupto effluet pus; quod si in caua ab-
 dominis effluit facit mala multa similia
 (939.); si autem effluit in caua intestino-
 rum, facit dysenteriam purulentam ma-
 gnam, paruam, longam, breuem, prout
 vlceris ibi facti natura dabit; inde sæpe
 integræ intestinorum membranæ exeunt,
 & sæpe tabes fieret.

966. Simulac id (695.) adesse nosci-
 tur, statim inhibendus omnis victus, vnde
 stercus multum, durum, crassum, acre na-
 scitur; æger pascendus solis iusculis cum
 leniter

leniter deterfiuis radicibus incoctis; decocta balsamica, detergentia, multum bibenda, & instar clysmatum iniicienda; aut aquæ fontanæ medicatæ larga copia bibendæ, in his pergendum vsque ad perfectam sanationem.

967. Si vero morbus habuerit causas violentissimas (959.), & produxerit sæuissima symptomata (960.), poterit facile in illo loco (959. 963.) producere gangrænam (388.), miserrime dein lethalem.

968. Quam futuram ex iisdem obseruatis prægressis facile præuidemus (967.), si simul nulla benignæ resolutionis (963.), vel medelæ (964.), signa apparuerint.

969. Eam fieri docent signa prægressa (968.), tum subita, & sine causa, remissio acerrimi doloris, manente pulsu debili, intermittente, sudore frigido, dysenteria fœtida, cinericea, ichorosa, liuida, nigra, fœcum sine sensu demissione; vnde breui placida mors.

970. Malum id, eousque prouectum, raro medelam capit; curandum prius; cæterum sola methodus (966.) prodest.

971. At si causæ (392.) hic scirrhum

Z 4

pro-

produxerint, longe alia mali idea nascitur, quæ clare certe pernoscenda.

972. Ergo, si in intestinis dictis (959. 963.) inflammatio cum conditionibus (392.), diu perdurans, nec in summam sæuitiem (960.) adscendens, nec resolutione (963.), nec medicamentis (964.), nec suppuratione (965.) soluta, deinde reliquerit in loco affecto stuporem, grauitatem, distractionem, constantem, cogitandum est, scirrhum ibi nasci.

973. Qui si naturam suam (392.) sequens, effectusque suos (486.) producens in hoc loco (959. 963.) multa, grauia, pertinacia mala producit; qualia inprimis: stupor, pondus, incrementum; assiduo aucta; hinc cauitatis intestinalis angustatio; fœcum ibi & chyli stagnatio; horum in locum resistentem actio, maxime putrida, ob moram, materie; hinc intestini occlusio; intorsio; ingestorum remora; ileus; voluulus; vel ab acri irritante dysenteria ficcior; conuulsio; singultus; vomitus; dolor assiduus; febris; macies; atrophia; mors.

974. Medicamenta parum valent, quæ-

quæcunque demum sint: victus sit (966.).
Sic fertur diu, sine magno malo.

975. Si autem scirrhus ille hoc loco conceptus per causas (492. 495.), signis (497. 498.) cognoscitur, tum vero miserimus rerum status, & immedicabilis cernitur: qui intelligi potest ex (498.) collatis cum natura, functione, nervosa textura intestini: maxime autem dysenteria acerrima, assidua, rebellis, cuncta, per quæ vadit, exurens, erodens, consumens, cum convulsionibus acerrimis, doloribus omni patientia majoribus, fixis, diuturnis, donec tandem mors vnico sit miserix solatio.

976. Si simulac scirrhi præsentia nascitur (972.) tractatur methodo (974.), hoc malum (975.) multum cauetur. Sed si, ad id superandum acria (490. N°. 3. 495. 502.) applicata imprudenter, maxime per valida purgantia, tum cancer illic oritur, sæuitque: tum autem potius ex solo lactis recentis sero; victus ex iusculis farinosis, carnosive solis cum vitellis oui; clysmata blandissima ex solo decocto feminum lini, foliorum so-

lani officinarum, vel capitum papav. alb. iniicienda; medicamenta summo-pere demulcentia, anodyna, leniter opiata, non facile in acre transeuntia, danda.

977. Hinc demum liquet, cur practicis toties occurrant dolores cesophagi, oris ventriculi, hepatis, lienis, pancreatis, intestini ilei, intestini coli, adeo sæui, fixi, pertinaces, intolerabiles, insuperabiles? quod in omni ileo vero sit semper causa physica transitum contentorum per intestinum absolute impediens, quæcunque demum hæc fuerit, siue in ipsa scilicet intestini fabrica male affecta, siue in materie quadam cauum occupante, quæ multiplex quidem deprehensa fuit? item quam sit multiplex, miraque omni modo, dysenteria? quam male in huiusmodi malis sæpe accusetur acrimonia quædam hectica humorum singularis, & contra eam fictam dentur nocentia medicamenta? quanta sit prudentia opus medico daturis purgans in magno dolore illarum partium? quænam sæpe sit illa post hæc in nonnullis sequens, immedicabilis hypercatharsis? quam

quam varia remedia, & methodus medendi requirantur ad dysenterias curandas? quam vanum, fallax, & damnosum fit, ad has commendare vnum, qualecunque demum fit, medicamentum proprium? aut vnā vniuersalem medendi methodum? Et infinita similia.

AD INTESTINORVM INFLAMMATIONEM.

SECT. 966.

Viētus.

Rec. *Rad. Scorzon.*

Tragopog.

Sisari,

Petroselin.

Cichor. ana vnc. ij.

Cum iure carnis S. A. decoct. ad *vnc. xxx.* iusculo admisce

Vitell. ouorum N. ij.

Salis q. s.

Decoctum.

Rec. *Rad. valerian. hortens. vnc. ij.*

Fol. leuistici m. ij.

Flor. Hyperici m. j.

Agrim. vnc. ij.

Cum aq. decoct. lib. ij. exhibe.

Bibaz. vnc. ij. omni hora.

Ex eodem etiam fit clyfma.

APH.

APHTHAE.

978. **Q**uum vero in multis morbis acutis cum visceribus inflammatis aphthæ oriantur, de his nunc paucis agendum.

979. Sunt autem parua, rotunda, superficialia, vlcuscula, os internum occupantia.

980. Quæ examinata accurate videntur esse vltimi emissarii, quo in os liquor secretus effunditur saliuosus, mucosusque, exulcerationes, factæ ex obturatione eius canalis extremi per humorem lentum, viscidumque eo delatum.

981. Hinc occupant omnia loca, vbi talia emissaria hiant; adeoque labia, gingivas, genas internas, linguam, palatum, fauces, tonsillas, vuulam, gulam stomachum, intestina tenuia, vbique fere eadem specie.

982. Gentibus borealibus, paludosa loca inhabitantibus, tempestate calida, pluuiosa, infantibus, senibusque, frequentes.

983. Solent autem aphthas in ore apparituras præcedere febris continua putrida,

trida, aut intermittens, continua facta; incipiens cum diarrhœa, vel dysenteria; magna & perpetua, nausea, vomitus, prostratus appetitus; anxietas ingens, sæpe repetens circa præcordia; debilitas magna; magna euacuatio quæcunque humorum; stupor & hebetudo, somnolentia levis, inæqualis, perpetua; perpetua querela de pondere & dolore circa stomachum.

984. Solet in initio aliquando hinc inde sparsa apparere solitaria pustula, iam primo in lingua, in labiorum angulis, in faucibus, & alibi, sine vlla certa constantia loci primi: & illæ fere semper benigni: aliquando primo apparent in imis faucibus adscendente quasi ex œsophago crusta alba, densa, splendente, instar recentis lardi, tenacissime adhærente, lente adscendente: atque hæ fere pessimæ, & vt plurimum certo lethales: aliquando duris, crassis, densis, tenacibus crustis totum cauum oris vbique, vsque ad extrema labiorum, obsident, omnia tegentes simul; & ab his raro resurgunt ægri.

985. Varius harum color: albus pelucidus instar margaritarum; albus sincerus ex densitate magna; fuscus; flauus; liui-

liuidus; niger: quorum malignitas pari ordine, ac hic recensetur, procedit, vt prior optimus, pessimus posterior, sit.

986. Vbi hæserunt aliquamdiu, solent inferne solui, laxari, frustulatim decidere, sicque sensim, & successiue omnes partes prius affectæ liberantur. Tum nonnullæ cadunt cito, aliæ tarde. Quædam illico renascuntur, quædam tarde, aliæ non: renascuntur quandoque æque densæ ac priores, & etiam nonnunquam adhuc densiores: patetque iterum tum diuersitas periculi, & vbi.

987. Hic locus (981.), natura (979. 980.), causa (980. 983.), symptomata huius mali (984. ad 987.), vnde de genio statuere licet; atque inde effectus eius facile deduci possunt.

988: Vbi enim talis crusta aphthosa totam superficiem tegit partium descriptarum (981.), tum sensum nervis inprimendum tollit, vnde sapor omnis sublatus; exitum liquidorum per sua emissaria impedit, vnde siccitas, vasorum suppositorum dilatatio, liquorum sub his stagnantium putrefactio, inflammatio partium ipsarum; cavitates vasorum absorben-

forbentium claudit, vnde ingressum noui chyli, potus, medicamentorum impedit, vitia a denegata refectione corporis nata producit, vnde tandem inde mors; crustis deciduis, maior per dilatata vasa iam aperta humorum effluxus, vnde saluatio; diarrhoea, quæ bonæ si non renascuntur aphthosæ crustæ; malæ, si iterum procreantur; deciduis crustis, dolor inflammatarum, & iam denudatarum partium, sæpe viuum cruorem stillantium, vnde salua sanguinolenta, talisque dysenteria: hæc autem omnia, si stomacho, emissario hepatis, pancreatis, intestinorum applicantur, nos docent infinita mala, quæ ex hoc vno morbo oriri possunt: vt non opus sit aliam prognosin dicere.

989. Si vero vlcerosæ crustæ hæ admodum lentæ, crassæ, latæ, compactæ, tum sæpe suffocata caro subiecta inflammata, suppurata, gangrænosa, in dira vlcera mutatur, eroso quandoque in os palati vsque eius inuolucro; qualia autem in stomacho & intestinis hinc mala, per se patet.

990. Vt curetur optime hoc malum, debet

debet 1. humorum vitalium impulsus internus in partes obsessas excitari, temperari, ut suppeditato liquido inferne resolutione, laxatio, lapsus concilietur crusta ulcerosæ: id efficitur potu multo, calido diluente, resolvente, abstergente. Et qui in mala specie huius morbi vasa lacte obsessa introitum facilem negant, hinc fomenta, vapores, balnea mirifici hinc usus ex eisdem; cibus autem optimus ex aqua, pane, coctis, dein vino & mellis mistis. 2. debet crusta in facilem citurque lapsum disponi: id fit fomento, gargarismo, clysmate: quæ liquore calido laxante, emolliente, detergente, & satius diu adhærendo humectante, putrefactioni resistente, constare debent. 3. simulac lapsus conciliatus est, tum anodyno demulcente, & simul parum corroborante medicamento simili utendum. 4. simulac rursum febris sedata, urina hypostatica, pulsus paulo liberior, tum potus corroborans prodest. 5. in fine melius purgans corroborans per alium exhibendum.

991. Ex hac historia & curatione aphtarum multa obscura problemata proferuntur
 Etia

ctica solvuntur. Cur enim in febre cum diarrhœa & dysenteria in fine morbi aphthæ? Cur id in pueris, senibusque in primis? cur maxime, si medicamenta, vitus, regimen, calefacientia, aut adstringentia, in initio morbi huius data? Cur si in talis morbi initio purgans datur aphthæ huiusmodi præcauentur? Cur in pessimis aphthis molestus & funestus singultus? Cur ora aphthosa, ventres turbati, appetitus prostrati iunguntur ab Hippocrate? Cur aphthosa tunica ventriculi lenteriam creat? Cur aphthæ nigræ pestiferæ habentur? Cur aphthosum os gravidæ abortus prænuncium? Cur in putridis pulmonibus, hepate &c. aphthæ adsunt? Cur tumor, calor, suffocatio, angina ab aphthis refrigeratis? Cur deliria, iactationes, peruvigilia, sudor frigidus, adeo hic funesta?

992. Regula ergo est: aphthæ pellucidæ, albæ, tenues, sparsæ, molles, facile cadentes, parum renascentes, superficialiæ, bonæ; contra vero, candidissime opacæ, flauæ, fuscæ, nigræ, densæ, crassæ, coeuntes, duræ, tenaces, assiduo resectæ, erodentes, malæ.

A a

AD



AD APHTHAS.

SECT. 990. N. 1.

*Potus.*Rec. *Amygd. dulc. excortic. contus. vnc. ij.**Pistachior. vnc. j.*

| | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| <i>Semin. 4. frigid. maj.</i> |] <i>contus. ana drach. ij.</i> |
| <i>min.</i> | |

Auenæ excortic. drach. iij.

Cum aq. vase clauso decoque spatio 1. horæ, tum adde

*Rad. excortic. Glycyrrhiz. vnc. j.*Ebulliant denuo parum, tum decocti accurate contriti.
lib. ij. exhibe.*Hoc bibat, fauces eo colluat & os.**Vel.*Rec. *Rad. Pastinacæ tenuifol. rubr.**Sisari.**China,**Sarsaparillæ,**Raparum, ana vnc. iv.**Hord. integri vnc. j.*Minutim contusa cum aq. decoct. & fortiter express.
*vnc. xxx. admisce**Syrup. Althææ. vnc. j.**In usus eosdem.*Rec. *Bulb. rapar. cum cortice q. s.*Tyrocesti, vel radula, ex bractea ferrata, radantur:
tum exprimatur succus, qui ebulliens leniter despume-
tur; huius *vnc. xvj. admisce**Virell. ouorum N. ij.**Syrup. violar. drach. iv.**Bibat vnc. ls. omni semihora.**Cibi optimi.*

Vid. §. 35. N. 1. 3.

SECT.



SECT. 990. N. 2.

Rec. *Fol. Maluæ,**Branc. vrsin.**Althææ,**Parietariæ,**Verbasci,**Mercurial.**Alchimill. ana vnc. ij.**Rad. Althææ. vnc. j.**Bulbor. Rapar. vnc. x.*

Cum aq. decoct. & express. vnc. xxxvj. admisce

*Vitell. ouorum N. iv.**Mell. rosar. vnc. ij.*F. Collutorium semper in ore tenendum, & gargarisma assidu-
duum.Fiat ex fæce residua cataplasma, externe faucibus appli-
candum.*Clysm,* ex iisdem.

SECT. 990. N. 3.

Rec. *Syrup. papau. alb. vnc. ij.**Cremor. lact. dulc. vnc. ij.**Vitell. ouorum N. ij.**Aq. stillat. rosar. vnc. ij. M.**Huius pauxillum ore assiduo contineat.**Vel.*Rec. *Gelatine CC. aut**Carnis, bene spissæ, in frusta
conscissæ parum q. f.**Assiduo imponatur lingua, ut soluta ibi oblinias: & sic lente
deglutiat.**Hæc leniunt excoriata.**Vel.*Rec. *Decoct. fol. rec. agrimon. vnc. vij.**Mell. rosar. vnc. j. M.*

Aa 2

In



In eodẽm vsus. Hoc laxata roborat.

SECT. 990. N. 4.

Rec. Rad. Oxylapath. vnc. j.,
Cortic. Peruvian. drach. vj.
 ramarisc. drach. vj.
Fol. agrimon. m. j.

Cum aq. decoct. lib. jss. admisce
Syrup. Kermes vnc. j.

Bibat vnc. ss. omni hora.

Hoc intestinorum laxata vascula roborat.

SECT. 990. N. 5.

Rec. Rhei drach. iss.

Myrobalan. citrin. sine nucleis, vnc. iss.

Cum aq. decoct. & express. vnc. iij. admisce

Syrup. cicbor. cum rheo drach. xij. F. Haustus.

NEPHRITIS.

993. **I**pfosrenes vera inflammatione occupari scimus ex dolore ardente, pungente, magno, inflammatorio loci vbi renes siti sunt; ex febre acuta, continua concomitante; ex vrina pauca, sæpe parua copia, emissa, admodum rubra & flammea, vel in summo malo, aquosa; stupore cruris vicini; dolore inguinis, testisque vicini; dolore iliaco; vomitu bilis; ructu assiduo.

994. Hanc (993.) producant omnes causas

causæ generales inflammationis renibus applicatæ; adeoque 1. quidquid fines arteriæ ad transmittendum impedit, vulnus, contusio, abscessus, tumor, decubitus diuturnus, nixus corporis validus, lapillus. 2. quidquid urinam in peluim, vreterem, vesicam transire impedit, vt similes causæ, ac mox enarratæ, applicatæ his partibus. 3. quæ crassiora sanguinis vi adigunt in canales vrinosos, vt cursus, equitatio diuturna & vehemens, æstus, nixus, plethora, diuretica acria, venena. 4. spasmodica omnium illorum vasculorum diu permanentes contractio.

995. Si summa inflammatio hæc vascula occupat, ita sæpe stringuntur, vt nihil reddatur lotii: aliquando vt valde parum, pellucidum, tenue, aquosum, quod pessimum. Irritatis sæpe nervis cohærentibus, & vicinis, dolores & conuulsiones facit per stomachum, mesenterium, intestina, vretes; vnde ructus, nausea, vomitus, deiectiones alui, ileus, vrina intercepta, crurum stupor, horum immobilitas, lumborum ardor.

996. Sanatur bonitate naturæ, & morbi, 1°. per resolutionem, 2°. vrina copio-

sa, ruffa, crassa, continuato fluore reddita ante diem morbi septimum, aut ad summum quartumdecimum. 3°. hæmorrhoidibus initio morbi large fluentibus.

997. Sanatur, vbi in statu inflammationis per sua signa noscitur (993. 995.), 1. per remedia generalia omni inflammationi sanandæ propria, venæ sectionem, auulsionem, dilutionem. 2. decocta lenia, emollientia, antiphlogistica magna copia ingesta. 3. clysmata, fomenta, balnea ex iisdem constantia. 4. victu humido, leni, quiete, vitatione lecti calidi, inprimis autem decubitus in dorso.

998. Si nimia symptomata doloris, vel conuulsionis vrgent, opiata profunt.

999. Vomitus autem nimium, morbi symptoma, sæpe ingestu tepidæ mellitæ iuuare prodest.

1000. Atque hac sola methodo tuto curatur ipsa nephritis a calculo renibus, vreteribusue impacto orta.

1001. Si causæ nephritidis magnæ, nec malum resoluitur (996.), nec sanatur (997.), sed excurrit vltra septimum diem, abscessus metuendus; quem fieri, docet remissio doloris, eius in pulsationem mutatio,

tatio, horror sæpe recurrens, grauitas, stuporque partis; iam factum esse docet prægressus priorum, tum pulsus, ardor, tensio in loco, vrina purulenta, foetida, instar vrinæ falsæ putrefactæ: simulac abscessus ille factus scitur, vtendum valde maturantibus primo & emollientibus, dein purulenta apparente vrina, diureticis puris ex aquis medicatis, fero lactis, similibusque, vsurpatis simul balsamicis.

1002. Si vero suppuratio illa (1001.) diu durat, totus ren exesus saccum format nulli vsui seruientem: tumque frequenter tabes renalis adest.

1003. Si scirrhum hic format, paralyfis, vel claudicatio cruris suppositi oritur, immedicabile malum: vnde sæpe lenta tabes, hydrops: &c.

1004. Si autem parua copia materiæ inflammatae coagulata in folliculo vrinæ minimo hæserit, basin format, cui apposita sabuli in vrina materies crustatim accrescens calculum renalem creet, sicque eundem augeat: de quo postea.

1005. Quin etiam aliquando in gangrænam transit, quod docet vehementia causæ (994.), symptomatum (995.), ab-

sentia leuaminis per remedia (997.), & subita remissio doloris sine causa, cum sudore frigido, pulsu debili, intermittente, singultu, vrina vel nulla, vel liuida, nigra, capillosa, foetente, carunculis fuscis, nigrisue foeda, defectu virium subito, summo: vbi nihil iuuat, vel medicina (902.).

1006. Hinc patet, infinitas esse nephritidis species, causasque: & inter eas vnam a calculo; tamen esse omnium ferme eandem curationem? Cur in febribus toties nephritis (993.), eiusque crisis (996.)? Imo & inde ischuria vitio renum, vel vreterum, orta intelligitur, sanatur.



IN NEPHRITIDE.

SECT. 997. N. 2.

Rec. *Fol. recent. Chærophyll.*

Beccabungæ,

Parietar. ana m. ij.

Rad. Acetosell.

Cichor.

Bardan. ana vnc. ij.

Cicer. rubr. vnc. jss.

Semin. contus. papau. alb.

card. Mariæ, ana drach. vj.

Cum



Cum aq. decoct. spatio $\frac{1}{2}$ horæ, lib. iij. exhibe.

Capiat vnc. ij omni $\frac{1}{4}$ horæ.

Rec. Rad. gramin. vnc. vj.

Semin. contus. melonum, vnc. jss.

Glycyrrhiz. vnc. j.

Cum aq. decoct. lib. iij. exhibe in usus eosdem.

SECT. 1000.

Remedia hic propria.

Agrimonia.

Alcea.

Alchimilla.

Althæa.

Beccabunga.

Bellis minor.

Bugula.

Chærophyllyum.

Daucus Sylvestris.

Dens leonis.

Fœniculum.

Glycyrrhiza.

Fraga.

Syrup. Althææ Fernelii.

Capillor. Veneris.

Cichorei cum rheo.

Papau. alb.

- - - erratici,

Violaceus.

Gramen.

Herniaria.

Lactuca.

Lingua ceruina.

Mercurialis.

Nummularia.

Nymphæa.

Ononis.

Parietaria.

Perficaria.

Scabiosa.

Virga aurea.

Vrtica.

Sal Ammoniacus, Gemmæ, marinus.

APOPLEXIA.

1007. **S**umma velocitas, nexus sæpe cum inflammatione, fecunditas multorum

Aa 5

torum

torum inde pendentium malorum, requirit, vt ordine nunc de apoplexia agatur

1008. Quæ tunc dicitur adesse, quando repente actio quinque sensuum exteriorum, tum interiorum, omnesque motus voluntarii abolentur, superstitie pul-
plerumque forti, & respiratione difficili magna, stertente, vna cum imagine profundæ perpetuæque somni.

1009. Accuratissima & multiplex vnde observatio docuit, hunc morbum accidisse, quoties illæ prægressæ essent causæ, quæ potuerunt impedire integre, vnde multum, effluxum liquidi cerebrosi spirituosum in organa sensuum, motuumque voluntariorum, & vicissim huius refluxum ab his organis in ipsum sensorium commune; superstitie interim cerebellosum liquoris in cor, & naturalia respirationis organa, ita, & forsan reditu, aliquo, qui has functiones sustinendas quodammodo sufficiat.

1010. Quæ causæ omnes recensitæ a observatoribus in aliquas classes redigi possunt in commoda praxios.

I. Natiua corporis fabrica, caput magnum; collum breue, & sæpe sex modis

do vertebris extructum; corpus valde crassum & pingue, temperies plethorica, cacochymia pituitosa multum excellens.

2. Quæcunque sanguinem, lympham, materiem spirituum ita mutant, vt per arterias cerebri libere ire non possint, sed impacta hæreant: talia sunt sæpe.
 - α. polyposæ in carotidibus, vertebrali-
busque arteriis concretiones, siue cir-
ca cor primo, siue intra ipsum cranium
factæ; quæ cordis palpitatione, pulsu
inæquali, vertigine, scotomia, frequen-
tioribus, & ad auctum motum calo-
remue, incrementibus, se manifestant.
 - β. spissitudo inflammatoria cruoris;
quam docent febris acuta continua,
phrenitis, dolor capitis ingens, inflam-
matorius, diu prægressa; tum omnia
signa, quæ oriuntur a sanguine, qui im-
peditus ire per vasa cerebri, eo maiore
copia, & impetu per ramos carotidis
alios ruit, vnde rubor, tumor, inflam-
matio oculorum, cum lachrymis ex-
cussis, faciei, & colli.
 - γ. crassa, glutino-
sa, pituitosa iners sanguinis totius na-
tura; vnde senibus, catarrhosis, frigi-
dis,

dis, humidis, pallidis, leucophlegmaticis, hic morbus admodum familiaris quin & præfagitur iis futurus iam ante aduentum suum, per otia, hebetudinem, somnolentiam, pigritiam ad motum quoscunque, vocem solito tardiores tremores, stertores, incubos, oculos pallidos, turgidos, humentes, caliginosos, vomitum pituitæ frequentem vertigines, respirationem ad minimos motus anhelosam, cum narium pinnis compressis, omnes causæ, unde glutinosum iners fit, accumulatur (69. ad 75.).

3. Quæcunque arterias ipsas, vasaue nervosa cerebri ita comprimunt, ut cruor, spiritusque, transfluere non possint.
 - α. plethora, cacochymia replens, calida valde temperies, hinc obnoxia huic malo, maxime si motus, calorue ingens velocitatem adauxerint; hinc his accidere solet a lauto valde cibo, potu, medicamentis acribus & valde mouentibus, ut sunt cardiaca, volatilia, vomitoria, &c. æstu, motuque exorbitantibus, intentione animi summa, diuturna, sæpe repetita. β. tumores quicunque

que intra cranium nati, inflammatorii, abscessus, serosi, pituitosi, stœatomatosi, scirrhusi, ossei, vel arterias, vel venarum coitum circa torcular, vel nervorum initia medullosa, comprimentes, aut medullam cerebri ipsam. γ . nimia velocitas cruoris in caput determinata, dum per inferiora arteriosa vasa impeditum iter per quascunque ex infinitis causas. δ . quæ extra cranium venas cerebri sanguinem referentes comprimunt rursum quacunque causa. ϵ . effusi humores sanguinei, purulenti, ichorosi, lymphatici, supra duram piamue matrem externe comprimentes.

4. Omnia, quæ arteriosa, venosa, lymphatica vasa interioris cerebri, circa cavitates ita soluunt, ut exeuns liquor aggestus, compressu suo fornicatas cerebroforum nervorum origines lædat. Talia sunt, serum acre in hydropicis, leucophlegmaticisque; sanguis in plethoricis; acrimonia atrabilaria in melancholicis, scorbuticis, podagricis; quæ vulgaris causa intra 40 & 60 gesimum ætatis annum agens; quæ omnia latentia per causas mouentes excitata, sæpe

sæpe subito morbum hunc creant. Huius ergo prænuncia ex natura materiæ prius natæ, & cognitis causis excitantibus, peti debent. Maxime his animi affectus summi, & intensissima studiorum nocent.

5. Huc venena quædam referuntur, quæ tamen vel ex vi trium ultimarum causarum (Nº. 2. 3. 4.) agunt, vel potius pulmone primo, quam cerebro nocent.

1011. Causas has (1010.) docuit anatomica inspectio cadauerum apoplexia extinctorum, atque observatio historiarum, quæ in ipsa horum ægrorum curatione observari possunt: meditatio autem facile in dictis (1010.) classes ordinationi inveniendæ quam aptissimas.

1012. Ex iisdem constat a diuersis, oppositis quidem causis, morbum hunc sæpe produci; adeoque bene diuidi sanguineam & pituitosam; sed non perfectâ diuisione, quum & serosa, & atramentaria, & polyposa sit, & alia.

1013. Locus vero affectus in apoplexia exquisita est totum sensorium commune; in parapoplexia vero eius quidam

dam pars præ cæteris, reliquis quodammodo, sed tamen minus, pressis. Cerebello, vt plurimum, in initio illæso.

1014. Vnde patet, cur pulsus & respiratio exerceanur, sensibus interim, motibusque voluntariis, destructis? imo cur sæpe pulsus & respiratio crescant pro rato, quo sensus, motusque plus decrescunt, vt & circa mortem?

1015. Magnitudo igitur apoplexiæ censetur ætate, temperie, fabrica ægri; tum vehementia symptomatum, & inprimis absoluta destructione sensuum, motuumque; respiratione valida cum profundo stertore; spuma circa os copiosa, viscidaque; sudore tenui, gutta in hærente; frigidiusculo; ortu ex debili primo parapoplexia prægressa; ortu ex epilepsia ingenti præmissa, vel ex causa nota vehementiori.

1016. Leuitas & sanabilitas mali contra decernitur ex leuitate symptomatum, absentia dictorum (1015.).

1017. Lenis apoplexia soluitur superueniente sudore multo, æquabili, rorido, calido, leuante; vrina multa, crassa; hæmorrhoidibus largis, diu fluentibus; flu-

xu menstruo restituto; alui fluxu; febr magna.

1018. Paulo grauior, superata causa solet mutari in paralyfin alicuius part musculosæ; totius lateris vnius, vnde hemiplegia; vel omnium ceruici supportarum partium, vnde paraplegia dicitur quæ raro curatur, semperque memori iudicii, motuum læsiones relinquit; vnde soporosi, hebetes, tremuli, vertigine pusillanimes remanere solent.

1019. Exquisita apoplexia (1015.), trito cerebello, corruptis liquidis, causa in cerebellum propagata, in mortem cito finitur, raro septimum diem excurrit.

1020. Futura apoplexia præuidetur
1. ex cognita naturali temperie (1010. N°. 1.). 2. materie morbosa cognita causa proegumena (1010. N. 2. 3.). 3. procataceticis. 4. ex primis effectibus cepti mali, vt sunt tremor; vacillatio; vertigo; scotomia; stupor; sopor; memoria vacillans; tinnitus aurium; inus superiorum; respiratio solito profundior, cum naribus compressis; incut

1021. Præsens facile noscitur, si inter diuersos eius gradus distinguitur

1022. Curatio huius mali generalis nulla dari potest: oportet enim; vt pro varietate causæ (1010.), modi applicandi, & loci affecti, varia omnino sit, & vt applicetur antequam malum adoleuerit.

1023. Si ergo ex lenta, inerti, frigidaque causa (1010. N. 2. lit. γ.) oritura præuidetur per signa ibi posita, statim conandum. 1. vt pressio glutinosi a capite aueratur. 2. lentor in cerebro & in toto corpore attenuetur.

1024. Pressio in vasa cerebri minuitur 1. deriuatione in alia, & opposita loca. 2. euacuationibus vniuersalibus.

1025. Vapor, focus, balneum, fuctio, epispasticum, rubefaciens, vesicans, causticum, fonticulus, setaceum, frictio, ligatura determinata, venis maioribus, pedibus, cruribus, femoribus, applicata primo scopo attingendo (1024. N°. 1.) valent. Collutiones, gargarismi, masticatoria, saliuam mouentia, apophlegmatismi, ori, faucibus, naribus applicata, eidem inferuiunt.

1026. Vomitoria, purgantia valida, certo determinata; scarificatio; venarum pertusio secundo scopo (1024. N°. 2.) sa-

tisfaciunt; licet aliquid semper incerti fecum ferant.

1027. Lentor vero, præmissis (1024. 1025. 1026.) determinantibus, dissolutiu remediis generalibus contra gluten descriptis (75.), cum prudentia adhibendis, capiti applicandis omni forma: inter omnia vesicæ per cantharidas profunt, & infecta similia sensim vsurpata.

1028. Si ab iisdem causis (1023.) apoplexia iam facta est, raro curatur: si vires ferunt, eadem tentanda (1023. ad 1028.) naribus, ori, capiti applicanda omnia, quæ sensus excitare queant; acerrimi vsurpandi stimuli quicunque; alius acriclysmate laxanda.

1029. In vsu tamen horum omnium (1028.) augetur sæpemalum, materie magis mota, & impacta, per omnia stimulantia: viribus tamen mox proiiciundis per euacuantia. Hinc in concilianda dissolutione semper euacuationi & auulsioni studendum, quantum res pati queat: inde regula; venæ sectio, ni iuuet, occidit.

1030. Si autem per sua signa (1010. N°. 2. l. ε. N°. 3. l. α. l. γ.) apoplexia oritura præ-

præuidetur, ilico confugiendum ad ea, quæ velocissime inanire, resolvere, auertere, queant. 1. ergo fiat larga, cita, missio sanguinis, & quidem ex iugularibus venis; quæ, pro re nata, repetatur: post hanc enim, si statu est morbus sanabili, statim leuamen oriri solet. 2. tum purgans antiphlogisticum detur magna copia, aliquoties repetatur, vt fere assidua diarrhœa excitetur; si autem purgantia non satis cito operantur, clysmate satis acri determinantur. 3. toto dein decursu morbi medicamenta refrigerantia, diluentia, attenuantia, ad vrinas ducentia, exhibeantur. 4. assiduo simul reuellentia fortia addantur, donec malum superatum sit. 5. victu, potuque vtatur tenuissimis. 6. caueatur summopere ab omni medicamento valido stimulante, mouente, calefaciente; a calore externo; a decubitu in lecto, maxime decliui & supino.

1031. At si illa ipsa (1030.) iam facta est, vix vlla spes supererit; eaque sola in exercitatione eorundem (1030.).

1032. Quæ vero ab extrauasis liquoribus inter cranium & membranas membranas ipsas, a vulnere, contu-

cto, suppuratoue oritur, iam tractata et in vulneribus capitis (267. 268. 273. ad 297.) vnde petenda.

1033. Quæ ab effusis iam liquidis in interioribus cerebri cavitatibus orta iam est (1010. N°. 4.), per sua signa ibi data cognita, vix requirit medelam, quum plerumque mors certa cito adsit: si quid tentandum, id omne sperandum 1. a resorptu effusi in venas iterum (279. 280.). 2. a correctione acrimoniæ prædominantis, & glutinis simul, quæ nulla refelicius, quam per saponacea chemica absoluitur.

1034. Quæ a prædominio lymphæ extrauasatæ orta est, facilius tollitur, omiſſa, vtpote hic fere nocente, missione sanguinis; datis hydragogis fortissimis statim ad aluum determinatis; tum dissipantibus applicatis; maxime vesicatoriis largissimis, diu apertis; victu exsiccante; fortibus epispasticis, fonticulis, seraceisque.

1035. Si vero a venenis iam producta fuerit, nulla hætenus medela descripta habetur; vt nec illi, quæ a polypo.



IN APOPLEXIA.

SECT. 1025.

Collutoria & gargarismata, in hoc casu.

- Rec. Rad. Imperator.
 Pyrethri,
 Galangæ, ana vnc. j.
 Fol. recent. Origani,
 Rutæ,
 Thymi, ana m. j.
 Flor. Lauend.
 Matricar. ana vnc. j.
 Corz. Magellan. drach. vj.
 Cum aq. decoct. vase clauso lib. iij. admisce
 Sp. Sal. Ammon. drach. iij.

Masticatoria saliuam mouentia.

- Rec. Mastich.
 Cerae alb.
 Zingib. ana vnc. j.
 F. S. A. parui pastilli.
 Apophlegmatizantia fiunt ex iisdem.

SECT. 1026.

Vomitoria.

- Rec. Vini Emetici vnc. ijs.
 Oxymell. scillit. vnc. j. M. F. haustus.
 Rec. Cremor. tartari emet. gr. vij.
 F. vna dosis.
 Rec. Succ. ex raphan. rustic. express. vnc. j.
 Oxymell. scillit. vnc. ij. M. F. haustus.
 Rec. Mercurii Visæ gr. ij.

Bb 3

Pur-



Purgans.

Rec. *Diagrydii* gr. x.

Resin. Ialapp. gr. x.

Sp. Vini rectific. drach. ij.

Accurate tritis, & solutis, admisce

Syrup. Rosar. solutiu. cum semm. drach. vj.

F. Haustus.

SECT. 1028.

Vapor stimulan's nares.

Rec. *Tinct. Castor.*

Sp. Sal. Ammon. ana drach. ij. M.

Subolfaciat sape.

Rec. *Aceri acerrimi,*

Tinct. Castor. ana drach. ij. M.

In eisdem usus.

Rec. *Ol. stillat. Rorifinar.*

Tanacet.

Lauend.

Rutæ,

Absinth. ana gutt. iv.

Infusi Castor. drach. j.

Unguent. Neruini vnc. j.

Sal. vol. oleos. drach. j.

M. F. S. A. Balsamus.

Pro suffitu sub naribus, & circa tempora, affricandus.

Acre Clysma.

Rec. *Pulp. Colocynth.* drach. ss.

Fol. Tabaci drach. jss.

Aq. vnc. x. incoctis, admisce

Salis Gemm. drach. ij. F. Clysma.

SECT. 1030. N. 2.

In primis vero ex *fenna* & *tamarindis*;
Vid. §. 396. N. 2.

SECT. 1030. N. 3

Vide §. 954. 966.

CATALEPSIS.

1036. **C**atoche, catochus, catalepsis, dicitur morbus, quo laborans repente, immotus, nec sentiens, illum corporis statum retinet, quem primo momento accedentis morbi habebat.

1037. Huius ergo proxima causa immobilitas sensorii communis, prout primo momento insultus se habebat.

1038. Ergo sanguinis cerebrosi, glandularum cerebri, emissariorum eius absoluta quies, ut in initio.

1039. Omnes quidem in eo morbo functiones cerebri læduntur, & illæ, quæ inde pendent; soli muscoli sic manent tensi ut in initio erant; cæterum respiratio & pulsus supersunt, at plerumque leues.

1040. Febris intermittens diu perdurans, maxime quartana; melancholica, sicca, strigosa temperies; menstrua, & hæ-

morrhoides retenta; terrores summi, sub
tigue; profunda, protracta diu in vnu
obiectum meditatio; febres validæ i
homine sanguinolento accensæ, morbi
hunc plerumque antecedunt.

1041. Dissecta cadauera demonstr
uerunt arterias venasque cerebri valde
turgentes fortiter impacto denso cruore.

1042. Sanatur sæpe excitata larga n
rium hæmorrhagia.

1043. In alios morbos raro transit;
liquando tamen epilepsia, conuulsio, d
mentia, ἀρεφία, eum exceperunt, in mo
tem plerumque finitur.

1044. Curatio tentatur pro varietate
causæ varia. Excitando per obiecta v
lide in organa sensuum agentia, vt su
lux, sonus, stimulus, sal volatilis acer, d
lor, frictio, motus continuatus; hæmo
rhagiæ ex naribus prolectu; hæmorrh
dalis, menstruiue fluxus prolectu; stern
tatoriis, vomitiuis, vesicatoriis, fonticul
fetaceis; victu humectante.

C A R V S.

1045. **C**arus est apoplexia levis, somni
vero grauissimus, cum febre, c
cau

causis maxime cerebrum illæsum comprimantibus (1010. N°. 3. l. α. ε. γ. δ.), aut causis obstruentibus, sed facilius, quam in apoplexia, soluendis (1010. N°. 2. l. ε. γ.): est in hoc aliqua perceptio, sed subitanea; aliquis sensus, sed parvus.

1046. Hinc a caro soluto sanitas, nisi quod forte titubatio vacillans capitis aliquamdiu supersit.

1047. Curatio petenda ex curatione apoplexiæ tradita (1020. ad 1036.).

1048. Coma vigil, coma somnolentum, cataphora, videntur tantum esse carileuiiores species (703. ad 710.).

1049. Lethargus autem leuior est apoplexiæ species, ex causa frigida, lenta, aquosa: vnde ex historia apoplexiæ eius cognitio & curatio petenda (1008. ad 1036.).

DE MORBIS CHRONICIS.

1050. **H**actenus de morbis principibus acutis internis, & externis: nunc de chronicis agendum. Illi vero, si in corpore nati, ortum duxerunt vel ex vitiis liquidorum sensim natis, vel ex vitiis relictis a morbis acutis non bene sanatis.

1051. Vitia liquidis sensim nata oriuntur

untur i. ex ingestis aëre, cibo, potu, condimento, medicamento, veneno, tam lienis, vt nostris humoribus similia non sint, tam validis, vt vi nostrorum viscerum & humorum nostris assimilari non possint. Eaque sunt *α. acor* (60. ad 69.). *austerum*, ex acore & terrestri plurimovitis, vt fructibus immaturis, vel adstringentibus, succis, vinis, & similibus; quæ quores coagulant, vascula constringunt hinc obstructiones duras pariunt (31. 40. 50. 51. 113. N^o. 1. 117.). Sanatur diluentibus, alcalicis fixis, saponaceis alcalicis diu, prudenter vsurpatis. *γ. acre pingue aromaticum*, ex cibis, potibus, condimentis, calidis odore, sapore; hæc calore attritum, læsionem minimorum vasculorum, dolores calidos, attenuationem quorum, horum putrefactiones, extractions, & similia multa producant: ranciditas aquosa, farinosa, gelatinosa, & similia. *δ. pingue iners*, ab nimio vsu pinguium ex animalibus terrestribus, piscibus, vegetabilibus oleosis; hinc obstructio (117. ranciditas biliosa, inflammatio, corruptio putrefactio pessima (82. 526.). Cura diluente, saponaceo, acido. *ε. salsedo* &

ri

riatica, ex fale, falitisue; vascula destruit, liquida soluit, acria reddit illa, hinc ἀτρεφίαν, solutiones vasorum, extrauasiones liquorum, non cito putrescentium, sed maculas producentium. Tollitur aqua, acidis, lixiuio calcis viuæ. ζ. *alkali* (76. ad 91.) η. *glutinosum* (69. ad 76.) 2. a viribus nostris nimis in ingesta (50. ad 58. 92. ad 106.), 3. a spontaneis nostrorum humorum vitiosis permutationibus (58. ad 91.).

1052. Ex morbis acutis male sanatis oriuntur vitia in humoribus quocunque corporis loco: α. purulenta (158. N°. 5. 6. 7. 402.), quæ producunt multa mala (936. N°. 4. 941.): sanantur (942.). β. Ichorosa (158. N°. 4. 206.), quorum effectus rodere, consumere. Sanantur blandis, demulcentibus, inspissantibus: γ. putrefacta, quæ recensita (1051. N°. 1. l. γ. ζ. N°. 3.).

1053. Morbi acuti male sanati in partibus solidis, compositisue, relinquunt abscessus (387. 402.), fistulas (413.), empyemata (894.), scirrhus (392. 484. 485. 486.), cancos (492. 494.) caries (526.).

1054. Ex his in morbis (1051. 1052. 1053.) simplicibus, aut omni modo compositis
inter

inter se infiniti sane alii, vt effectus, fieri possunt; adeoque ex eorum dato intellectu hætenus optime perspici, & curari.

1055. Quum vero inde pendeant, patebit, omnes chronici; horum erit generalis doctrina, diuisioque hinc habenda.

1056. Vnde etiam statim apparet, hanc varietate quidem infinitos ratione symptomatum, tamen ex origine non ac compoſita pendere, neque tam varia radicalia, medendiue methodum requirere; tum simul perspicitur diuturnitas in plerisque, incurabilitatis vero in multis ratio; id ipsum pertractando iam patebit.

PARALYSIS.

1057. **P**aralysis vocatur musculi immobilitas, nullo nixu voluntatis, vel vitæ, superanda; sensus quando simul absolute perit; aliquando levis cum stupore, sensuque quasi punctorio leui, superest.

1058. Causa huius proxima semper impeditus fluor liquidi neruosi a cerebro in musculum paralyticum, vel liquidi arteriosi in eundem.

1059. Ergo oriri potest 1. ab omni causa apoplexiam generante (1010.) 2. ab omni ea, quæ nervum transmittendo spiritui ineptum reddit. 3. Quæ introitum arteriosi cruoris in musculum impedit. Inde paraplegiæ, hemiplegiæ, paralyfios partis singularis, natura intelligitur.

1060. Itaque apoplexia; levior parapoplexia (1009. 1010. 1015.); epilepsia; conuulsio; dolor ingens & diuturnus; omnes solitæ euacuationes retentæ cum subsequente vertigine, vt hæmorrhoidum, menstruorum, abscessuum, fistularum, alui, vesicæ, salivæ; metaptoses cuiuscunque materiæ morbosæ in acutis, vel chronicis; quidquid obstruendo, solvendo, comprimendo, ligando, distorquendo, distrahendo, constringendo, nervos lædit; adeoque crassi humores, vulnera, erosiones, abscessus, gangrænæ, tumores inflammatorii in integumentis nervosæ medullæ, in gangliis, in nervis ipsis, ferofi, purulenti, ichorosi, scirrhusi, & similes, fortes arctæque ligaturæ, fracturæ, luxationes, adstringentia valde alimenta, medicamenta, venena; inde frigus summum, calor maximus, humiditas frigida, usus aquæ

aquæ calidæ nimius, assiduus, vapor arsenici, antimonii, calcis recentis, mercuri & aliorum venenorum, paralyfin creare possunt.

1061. Causa proxima (1058.), & remota (1059. 1060.), adeoque his nata paralyfis ipsa, varios admodum producit effectus, pro varietate sedis, ubi illa causa hæret; pro varietate magnitudinis, qua ibi hæret; pro diuersitate partis affectæ, prout vitæ necessaria magis minusue, magis mediate, vel immediate; inde enim lethalis, minus lethalis, sanabilis, incurabilisue haberi potest.

1062. Paralyfis cordis, pulmonum, musculorum respirationi inferuentium; gulæque, breui lethalis: stomachi, intestinorum, & vesicæ, a causis internis, valde periculosa: musculorum faciei mala, & facile in apoplexiam mutabilis. Paraplegia valde periculosa, apoplexiæ prænuncia, hac nata lethalis: hemiplegia mala, paraplegiæ affinis, hinc apoplexia necans; quæ cum frigore, insensibilitate, atrophia partis, mala, raroque medicabilis: quæ cum sæua conuulsione, & magno calore partis oppositæ, mala, ex horum
vero

vero oppositis scitur, quænam sanabilis, minusque metuenda sit: quænam vero toties causa repentinæ, nec vlllo præfagio præuisæ, mortis, sine vlllo fere symptomate concomitante.

1063. Quæ omnia (1057. ad 1063.) si quis singulis musculis, cuiuscunque demum functionis auctoribus, applicat, infinitorum certe, & maxime mirabilium morborum causas intelliget, diagnosin, prognosinque sciet.

1064. Sanauit natura hunc morbum attenuando & dissipando materiem morbosam, mala crisi ad cerebri exteriora, eius ventriculos, circa medullam oblongatam, spinalem, exitum neruorum a medulla, neruos, depositam; soluendo impacta per magnam febrim superuenientem; mouendo per tremorem conuulsuum partis; educendo per diarrhœam largam & diuturnam.

1065. Curatio requirit ablationem causæ (1059.1060.), neruorum functionem & arteriarum impediens, dein liberi fluxus restitutionem.

1066. Causa impediens auferitur variis modis, causæ, prius, perspectæ, facile applicandis.

1067.

1067. Si illa causa intus hærens, crassa stagnansque est, vtendum iis remediis quæ producere possint illa, quibus natura (1064.) hunc morbum sæpe sanauit.

1068. Ergo curatio tentatur 1. attenuantibus, dissipantibusque α . aromaticis cephalicis, neruinis, vterinis dictis vegetabilibus, specie succi expressi, infusi, decocti, extracti, spiritus, conditi. β . Salibus fixis vstione, volatilibus destillatione, aut putrefactione hinc electis. γ . Oleis expressione, coctione, infusione, destillatione hinc productis. δ . Saponaceis ex horum combinatione per artem productis. ϵ . Virofis animalium partibus, insectorum succis, spiritibus, oleis, salibus, tincturis. ζ . Salibus fossilibus, crystallis metallicis, & iis, quæ ex his maxime composita. η . His omnibus, vt se mutuo iuuent, cum prudentia, permittis: atque horum quidem vsu attenuatio, dissipatio, calor febrilis, obtineretur. 2. Validis stimulantibus, & impacta quæcunque fortiter, motu neruoso tremente & conuulsivo excitato, excutientibus: eo inprimis sternutatoria, & vomitoria fortia pertinent; si aliquoties inprimis repetuntur.

3. Pur-

3. Purgantibus per aluum calidis, soluentibus, aromaticis, vegetabilibus, vel & fossilibus acribus, metallicisque mercurialibus, antimoniatis, adeoque fortibus hydragogis, larga dosi, pluribus diebus successeive repetita, datis; quorum ope copiosa, & aliquamdiu perdurans diarrhoea, excitetur. 4. implendo primo vasa corporis largo potu attenuantium præmissorum, dein excitatione maioris motus, & sudoris, ope vaporis spirituum accensorum.

1069. Frictiones externæ siccæ, calidæ ad ruborem vsque, vel cum spiritibus penetranti & stimulante virtute præditis ex animalibus, vegetabilibusque, aut cum oleis, linimentis, balsamis, vnguentis, neruinis, profunt. Balnea vaporum, immersiva; emplastra acria, aromatica, attrahentia dicta; cucurbitæ; scarificationes; vesicatoria; fustigationes; dolorem & leuem inflammationem excitantia, vt vetricæ, & similia, iuuant.

1070. Maxime autem curandum, vt ad sedem causæ detectam omnia remedia (1068. 1069.), si possibile, applicentur: pars læsa, plures simul eodem vitio læsa,

Cc

sci-

scientia musculorum, neruorum, horum
vnitio, origo, dispersus, & cognitio fun-
ctionum ab vnoquoque horum pende-
tium, si comparantur inter se, clare de-
cent sedem latentem mali.



IN PARALYSI.

SECT. 1068.

Vid. 75. N. 5. §. 54. N. 4.

SECT. 1069.

Rec. *Mastiches,**Olibani,**Succini, ana vnc. fs. M. F. Pula.*

*Huius drach. j. super prunam sparsæ fumus excipiatu-
no sicco, calido, ex lana. Quo dein fortiter frice-
tur partes.*

Rec. *Sp. Lauendulae vnc. iij.**Sal. Ammon. drach. ij.**Tinctur. castorei drach. iv.**Aq. stillatit. lauendulae vnc. vj. M.**Perfricentur hac cum mistura partes.*Rec. *Emplastr. de Cumino,**Meliloto,**Galbani purati, ana vnc. j.**Olei Castorei vnc. fs.**M. F. Emplastrum ad alutam.**Parti affectæ, prius fricatæ, apponatur.*Rec. *Olei infus. Absinth.**Anethi.**Chamamel.*

Nep



Nepetæ,
Rutæ,
Trifol. odorat.
Castorei,
Crocini,
Iriui,
Lumbricor. terreſtr.
Nardini,
Terræ ana drach. j.
Unguent. Agrippæ,
Arthanitæ,
Martiat.
Neruin. ana drach. vj.
 M. F. linimentum.

Emplaſtra acria.

De Cumino, Galbano, Meliloto &c.

EPILEPSIA.

1071. **P**riori malo aduerſus valde morbus Epilepſia eſt, quæ adeſſe dicitur, quoties homo ſubito proſternitur, amiſſis ſenſibus externis, internisque, cum concuſſu violento, inuoluntario muſculorum omnium, vel aliquorum, reciproco, alterna cum requie, & nouo paroxyſmo.

1072. Morbus hic mira facie variatus ſæpe tam mirabilis apparet, vt diis, dæmonibus, iræ diuinæ, incantamentiſ, & ſimilibus cauſis, naturalibus maioribus, adſcriptus ſæpe fuerit.

Cc 2

1073.

1073. Nulla quippe gesticulatio, inflexio, posituraque noscitur, quam non aliquando exhibuerit; omnes quoque nonnunquam æmulatur motus, cursus ambulationis, gyrationis, prostrationis decubitus, erecti, rigidique corporis species.

1074. Omnes tamen hæ varietate tantum versantur in mutatis motibus aliquarum partium mobilium, adeoque musculosarum; ergo tantum ponunt varia musculorum contractiones; hinc variorum liquidi nervosi influxus; inde variam huius a sensorio communi expressionem in nervos; tandem itaque varias causas in cerebri medulla has expressiones producentes: quæ optime noscuntur enarratione harum historica.

1075. Illæ autem sunt 1. hæreditaria ex labe gentili patris, matris, parentumve, aut maiorum, silente sæpe morbo in genitore, dum ex auo deriuatur in nepotem. 2. Congenitæ, ex imaginatione matris gravidæ excitata per conspectum epilepticum. 3. Cerebrum in integumentis suis, superficie, substantia, ventriculis male affectum, per vulnera, contusiones, abscessus,

ſceſſus, pus, ſaniem, ichorem, ſanguinem, lympham acrem, foetidam, excreſcentias oſſeas cranii interni, intropreſſiones eius, cartilagineam ſinuum venoſorum naturam, fragmenta, ſpinasue oſſium, vel inſtrumentorum lædentium meningas, cerebrumue, argentum viuum ad cerebrum quacunque via delatum. Idem cerebrum affectum male per inflammationem, corruptionem, eroſionem meningum, a carie oſſis, bile atra, gummatibus venereis. Has autem cauſas iuuant omnia, quæ liquidorum in cranium affluxum augent, vt ſunt, plethora, motus, calor, ebrietas, epulæ, venus, ingenium perſpicax, altum, meditatio profunda, affectus animi ingentes, imaginatrix vis ingens, terror, metusque inprimis. 4. omnes violentæ affectiones generis neruoſi, vt ſunt magni & periodici dolores, paſſio hyſterica, roſiones & irritationes a lumbricis, dentitione, acri humore, lacte caſeoſo, acri, acido infantum, meconio, contagio variolarum, cardiogmo, vlcerofa materie alicubi hoſpitante, inedia, crapula, acribus potulentis, eſculentis, medicamentis, venenis. 5. ab interceptis nonnullis, quæ olim excerni

Cc 3

ſole-

solebant, sanie, pure, menſtruis, lochii hæmorrhoidibus, vrina. 6. fumis nonnullis paroxyſmum integrantibus, fomite licubi hærente, vnde ſenſu eleuatæ aur adſcendens cerebrum petit.

1076. Quæ omnia (1075.) hiſtoria olferuatorum, & incifio cadauerum, docui

1077. Effectus huius morbi redu poſſunt: 1. ad mala corrupti tot violentis & repetitis conuulſionibus cerebri, vnde vacillatio memoriæ, hebetudo, ſtultitia, paralyſis, apoplexia, mors. 2. ad maneruum & muſculorum, vnde horum & artuum, contractiones, diſtorſiones, deformitates. 3. a violento ſpaſmo inflammatio, gangræna, nigredo partium ſanguinolentarum, maxime quæ ſupra muſculos ſitæ ſunt. 4. ad ſecretiones quædam in impetu paroxyſmi vi factas; citipotus, lymphæ, bilis, ſpumæ, muci, ſanguis, ſurſum reiecta; fœcum alui viridiurſeminis, vrinæ per inferiora egeſtio; ſanguis vtraque via ſecretus huc ſpectant.

1078. Inde intelligitur, quæ hereditaria? cur ea nunquam ſanabilis? quæ idiopathi

pathica? cur raro curabilis? quæ sympathica? cur sæpe curabilis?

1079. Atque etiam liquet, diuersissima remedia, diuersissimam curandi methodum, ad hunc morbum requiri, pro nota varietate causæ, materiæ peccantis, loci, ad quem applicatio remedii, per quemeductio mali, fieri debet.

1080. Causa enim prima & secunda, in mala conformatione solidorum consistens (1075. N^o. 1. 2.), vix vllam suscipit radicalem medelam; paroxysmorum autem renouantes causas, vtpote renatas assidue, tollere tuto potest: vnde hæ, quæ infinitæ, nec nisi obseruando cognoscendæ, indagari debent sedulo, dein pro sua natura curari.

1081. Tertia (1075. N^o. 3.) cognoscitur ex symptomatibus aliis læsum simul cerebrum designantibus, vt est dolor, grauitas, plenitudo, læsio capitis antecedens, vertigo, tremor vniuersalis, scintillæ oculorum, eorundem immobilitas, circumgyratio totius capitis, vel & corporis. Huius causa solida vix tolli potest, quia vix cognoscitur singularis: reuellentia, discutientia, viam parantia, depurantia, iuuant:

iuuant: hinc venæ sectio, purgatio, vomitus, inustio, fonticulus, fistula, epispasticum, vulnus capitis, cranii perterebratio, antihysterica, opiata, profunt: ex quibus quid eligi debeat, docebit inuentio mali causæ proxima (1079.).

1082. Quæ a causâ quarta (1075. N°. 4.) fit, ea tractanda erit varia pro varietate causæ proximæ: hinc anodyna, paregorica; narcotica; antihysterica; anthe mintica; demulcentia & corrigentia acrimium; incisio apta gingivarum; ablatio correctio, materiæ vlcerosæ, tunc funt antepileptica.

1083. A quinta causâ (1075. N°. 5.) ortæ epilepsiæ medela fit soluendo materiem immobilem, laxando vias, expellendo: hinc vesicatoria, caustica, fonticulos, & fistulas producentia; aristolochica; emmenagoga; hæmorrhoidas aperientia; diuretica toties contrahunc morbum profunt.

1084. Quæ autem a causâ sexta (1075. N°. 6.) oritur, tolli poterit, sanata debilitate generis nervosi nimis facile mouendi, quod exercitio motus, lusus, equitationis, vectationis; assumtu aromatum; vfu
chaly

chalybis, & corroborantium optime fit: tum etiam loci fomitis exulceratione artificiosa, profunda, diuturna, inducta cæsim, causticis, vesicatoriis; dein autem apertis retentis diu per suppurantia corrosiuis mista: tandem ligaturis neruum comprimentibus affectum.

1085. Ex his vanitas apparet omnium specificorum, & methodorum, quæ inanis iactantia contra hoc malum laudat.

1086. Et patet quidem, causam proximam omnis epilepsiæ exquisitæ semper esse nimiam cerebri in neruos motorios, nullam in sentientes actionem.

1087. Atque causas, quæ reciprocos paroxysmos creant, numero & varietate plurimas esse.

1088. Tandem vero spasmi singularis, opisthotoni, emprosthotoni, tetani vniuersalis, origo, natura, effectus, sanatio, sponte patent; quum sint modo species epileptici insultus singularis.

MELANCHOLIA.

1089. **M**elancholia vocatur medicis ille morbus, in quo æger delirat

lirat diu, & pertinaciter, sine febre, eide fere & vni cogitationi semper affixus.

1090. Hic morbus oritur ex illa sanguinis & humorum malignitate, quam bilem atram dixere veteres; & rursus idem morbus, a mente initium ducens, breui corpore bene sano ipsam bilem atram facit.

1091. Ideo opus hic erit paucis ideam pingere mirifici huius mali, & de quo tam obscura doctrina habetur, ut iniusti criminis rea agatur antiquitas.

1092. Si in toto sanguine mobiliora dissipata reliquerint immobiliora unitum ille erit crassius, ater, pinguis, terreftris. Ei vero nomen dabitur *humor atrabilarii*, vel *succi melancholici*.

1093. Cuius (1092.) causa, omne quod mobilia expellit, reliqua figit: vehementis mentis exercitatio, noctes atque dies in vnum fere obiectum occupatum peruigilium; animi motus magni, siue hilaritatis, siue mœstitiæ; magni & oporosi motus corporis multum repetiti, i primis in aëre valde sicco & calido admixtum; eo & immodica venus; cibi auri, duri, sicci, terrestres, cum quiete & t

pc

pore corporis diu assumti; potus similes; huc fumo, aëre, sale indurata animalium partes, maxime durorum & annosorum, fructus immaturi, farinacea non fermentata, medicamenta adstringentia, coagulantia, figentia, refrigerantia, venena lenta, similia; febres calidæ diu hærentes, sæpe repetentes, sine bona crisi, & sine diluentibus, abeuntes.

1094. Vbi iam in cruore id malum (1092.) per suas causas (1093.) natum adhuc omnem circumeuntem humorem æquabiliter inficit, producet aliquos morbos statim conspicuos, qui fere sequentes: color externus, internusque, primo pallidior, flavior, magis fuscus, liuescens, niger, cum maculis similibus; pulsus lentior; frigus maius; respiratio lenta; circulatio per sanguinea vasa bona, per lateralia parciore, minus bona; hinc humorum secretoriorum & excretoriorum omnium minor, tardior, crassior, exitus; minor consumptio; parciore appetitus; macies; mœstitia; solitudinis amor; affectus animi quicunque pertinaces; magni; in reliquis *ἀδιαφορία*; torpor ad motus; summa tamen simul studii cuiusque & laborum constantia.

1095.

1095. Habet ergo pro materie terra & oleum spissum sanguinis, vnita, compactaque simul: quæ prout liquidiore, blandiore; diluente parte magis priuata, quæ ipsa magis condensata, tenacius misceatur & diutius nata, eo effectis peior, eo curatione difficilius est.

1096. Inde diagnosis, & prognosis (quæ clarior ex sequentibus) patent, quæ & sanationis ratio hinc constat.

1097. Statim enim ac initiis primis (1093. 1094.), causa, effectiue, se prodicens animo assidua obiectorum variatio concilianda, & quidem ipso ignaro; eligenda autem, quæ affectui prædominanti oppositum in ægro creare solent; diluentibus demulcentibus, paregoricis, narcoticis quiete, conciliandus somnus est; æther vtendum humido tepescente; cibi dandi leues, liquidi, sanis humoribus simile recentiores, blandi, vi leni saponacea laxantes, atque in horum vsu diu persistendum; medicamenta danda diluentia, oleosum terrestre resoluentia, vasa laxantia; leni stimulo expellentia, vt succi bene maturorum fructuum horæorum, mellita, olerum iuscula ex his confecta; aquæ minerales potu

potus optimus ptisana mellita leuiter; abstinencia sedula a causis mali (1093.).

1098. Si autem illa ipsa materies (1092.) per easdem causas (1093.) magis densa, tenax, immobilis reddita est; necessario in vasa hypochondriaca depelletur: id enim natura huius humoris, situs & conditio horum vasorum, & leges hydraulicæ docent. Inde sensim hic hærebit, accumulabitur, stagnabit: tum vocatur *morbis hypochondriacus*, lienem, ventriculum, pancreas, omentum, mesenterium, obsidens.

1099. Hinc ibi producit sensum affidui ponderis, anxietatis, repletionis, maxime ab assumtis, cibo, potuque; respirationem ob grauata viscera abdominalia difficilem; bilis vtriusque, pancreatici, stomachici, intestinorum, mesenterii succi in confectione, secretione, permistione, efficacia in cibis, impedimenta; inde digestionem primam omni modo læsam; esculentorum corruptionem in crudum acidum, si ex vegetabilibus, in putridum alcali, rancidumue oleosum, si ex animalibus; hinc ructus, flatus, spasmos, adstrictam aluum, fæces induratas; icterum
peio-

peiores gradu, quam prior (1094.); omnia mala (1094.) iam peiora.

1100. Vbi iam eousque adole (1098.), & per effecta sua (1099.) se manifestavit, summa ope nitendum in curatorem, quia aliter tetra mox oritur malitiosa; difficultas autem maxime vitanda hæc est: si malum perseverat, fit incurabile, & sæpe lethale, ut in sequentibus quebit: si euacuantibus pugnatur, sani, facile mobiles humores expeiluntur, naves malique hærent, unde peior morbus: si per stimulantia valida tentatur, sæpe subito soluta materies acris fit, & in petu magno ruens in tenera vasa hepatica destruit, unde multa, & immedicabilia mala.

1101. Hinc 1°. lente mobilis reddenda materies est, indagando naturam prædominantis acrimoniæ; tum dando medicamenta saponacea, in quibus præminetur acrimonia opposita illi, quæ illo humore adest; in his pergendum, donec nec pulsus inæqualis, debilisque, nausæ, tenesmusue, anxietas, febricula, signa demotæ materiei; tum 2°. statim leniente purgatione, clysmate simili, ferro

Etis, aqua minerali, similibusque expellenda est.

1102. Verum si eadem illa materies (1098.) iam fixata, compactaque, ibi diu hæsit, ipsa acris fieri incipit; & rodens, per stagnationem, motum viscerum, calorem ambientium; noua assiduo aggeritur, quia iam obstructio facta est, & causæ eadem perdurant; hinc mole aggesta, acrimonia nata, motu assiduo, vasa extendit, rōdit, corrumpit; inde lienis, stomachi, pancreatis, omenti, mesenterii, intestinorum, hepatis, similis destructio; adeoque omnia mala (1099.) priora multum auget, maxime vero assiduo putrefacti vapore venis recepto omnes functiones, imprimis cerebri, perturbat. Tumque vocatur vero nomine *bilis atra*.

1103. Quæ deprehensa per hæc eius signa data (1093. 1094. 1099. 1102.), non nisi prudentissima arte eliquari, moueri, educi potest; ob difficultates (1000.) hic adhuc maiores, & facile excitandam, dein vero vix moderandam, morbi acerrimam materiem: hinc sit omnis victus oppositus acrimoniæ in humore prædominanti cognitæ ex (1051.), sit ille idem semper
leni-

leniter soluens, stimulans, laxans alui
 paucas fœces a digestionem relinquens; p
 tus, vel ex ptisana mulsa, vel ex succis h
 ræis, vel ex fero lactis sit; motus corpor
 sit levis, continuusque; calor admodu
 temperatus; somnus multus; balnea, f
 menta, clysmata, potus in crebro usu si
 ex his, quæ sine acrimonia, diluendo, sc
 uendo, abstergendo, macerando, mat
 riem eliquent, & dein quam lentissime
 prudentissime excernant, via a natura pr
 monstrata, habita semper ratione acrim
 niæ singularis, quæ simul adest.

1104. Id autem malum (1102.) ad m
 gnam iam acrimoniam prouectum, cu
 visceribus iam valde corruptis, si dura
 tibus iisdem causis (1102.) dein motu m
 sculari; calore solis, ignisue; victu ac
 copiosoque; medicamentis acribus v
 lide mouentibus, cum acrimonia mali
 feruescentibus; venenis simili actio
 lædentibus; vel tandem morbis nonnu
 lis validis mouetur, tum acrior, mobilis,
 iam agens reddita, vasa sua rumpit, co
 rumpit, putrefaciendo resoluit, cum ac
 bile ipsa in vomicas putrefactas muta
 iam est *bilis atra turgens*: hæc iam huc

que prouecta, si liquefacta in suis vasis mota versus hepar, in exesos venæ cauæ ramulos serpens, cordi infertur, damnosa illa mala producit: si enim de acido coagulante participat polypos cordis, pulmonis, aortæ, carotidum, horum mala, mortem creat. Si in cerebrum perrexerit, apoplexiam, paralyfin, catalepsin, epilepsiam, deliria, maniam, pessimi generis, & fere immedicabiles, producit. In genere arterioso omnia mutat, febres immanes, breui omnia putrefacientes profert: si de alcali putrefaciente participat, gangrænas subito lethales, vbicunque impigerit, ibi nasci facit. Vnde infiniti morbi in toto corpore, & qualibet eius parte, non curabiles, nisi hoc fomite extincto: si autem ruptis viscerum vasculis elapsa materies caua peritonæi occupat, debilitas mox exoritur ingens & insuperabilis, putrefactio acris elapsi, eiusque accumulatio; tum erosio gangrænosa omnium abdominalium viscerum, vnde mirabilia phænomena; tympanitis; mors cum fœtore immani: si autem mota ruerit in iecur, indeque per exesa & dilatata vascula biliosa in vesicam fellis, ductum

Dd

hepa-

hepaticum, communem, in intestina, facit
nauseas, vomitus, dysenterias atrabilarias
cum anxietate, impetu, dolore, rosione
intolerabilibus, vnde inflammationes, ex
ulcerationes, putrefactiones intestinorum
stomachi, œsophagi, faucium, oris; inde
convulsiones terribiles, tandemque pla-
cida fere mors, gangrænam, adeoque in-
dolentiam, sequens omnium.

1105. Materies vero sic reddita (1104.),
vna cum tenacitate summa & fere picea
simul habet acrimoniam acerrimam aci-
dam, quæ metalla rodit, terram ferment-
tet; aut alcalinam salinam, corrosivam
quam maxime; aut oleosam putrefactam,
omnium teterrimam. Quæ singulæ spe-
cies, vnde oriantur, quomodo cognoscan-
tur, qui curentur, supra satis demonstra-
tum habetur (58. ad 107. 1051. 1052.).

1106. Atque facile patet consideranti
dicta (1000. 1003. 1004.), & situm, structu-
ram, circulationem viscerum, in quibus
hæret hic malignus humor, morbum tur-
gentem curatione maiorem: diluentia
cum opposito acri ad acre prædominans,
& opio, primaria sunt.

1107. Ex quibus (1090. ad 1107.) iam
facilis

facilis intellectus melancholiæ descriptæ (1089.), malique hypochondriaci; nam liquet a diuturna moestitia prægressa, vasa viscerum abdominalium stricta creare stagnationem, mutationem, accumulationem bilis atræ (1092. 1093. 1095. 1098. 1102. 1104.), sensim incrementem, licet corpus fuerit paulo ante quam saluberrimum: iterumque natam ex corporeis causis eandem bilem atram producere illud delirium (1089.).

1108. Evidentes ergo causæ melancholiæ (1089.) observatæ sunt: 1. omnia, quæ liquida cerebri nervosa figunt, exhauriunt, perturbant; vt summi terrores, iique subitanei, studia acerrima cuiuscunque obiecti, amor ingens, vigiliæ, solitudo, metus, affectio hysterica. 2. quæ sanguinis confectionem, refectionem, circulationem, secretionem, excretionem variam impediunt, perturbant, maxime in liene, stomacho, omento, pancreate, mesenterio, intestinis, hepate, utero, hæmorrhoidalibus vasis; adeoque morbus hypochondriacus, acuti male sanati, præprimis phrenitis, caususque, omnes secretiones, & excretiones nimix, cibi potus-

Dd 2

que

que frigidi, terrestres, tenaces, acerbi, adstringentes, æstus ingens diu protractus & exaffans cruorem, aër stagnans, palustris, vmbrosus. 3. natiua corporis indoles, nigra, hirsuta, sicca, gracilis, masculina ætas media, ingenium acre, penetrans altum.

1109. Si morbus hic (1089.) diu perseuerat, producit dementiam, epilepsiam, apoplexiam, maniam, conuulsionem, caecitatem, imaginationes mirificas, risu, ploratus, cantus, suspiria, ructus, flatu, anxietates, vrinam copiosam, limpidam instar aquæ, alio tempore valde crassam sanguineæ fœcis in vasis viscerum abdominalium retentionem, accumulatiuam, subitanæ sæpe excretionem, uum pertinaciter stipticam, sputationem tenuem, frequentem, vigiliarum, inedia, frigoris tolerantiam incredibilem.

1110. Attulit sæpe curationem superueniens scabies fœda, aliquando elephantiasin æmulans; aut varix numerosa, ingens, enata; tumentium valde hæmorrhoidum fluxus; atræ bilis per superiora & inferiora reiectio.

1111. Ingens damnum capere so-

ab omni medela labefactante vires; acriter euacuante; rursumque ab usu eorum, quæ liquida vehementer exagitant, siue cardiaca fuerint; siue alio quocunque titulo exhibita.

III2. Vnde optima sanandi hunc morbum methodus est, si causa prima bene obseruata, & temperiei varietate, his opposita medela, variis varia, adhibetur.

III3. 1. Itaque erit indicatio liquida cerebri & neruorum excitare, augere, in ordinem redigere; quod fit: α. auertendo mentem ab obiecto consueto ad alia priori contraria. β. inducendo caute alium animi affectum, melancholico oppositum. γ. inseruiendo falsæ imaginationi. δ. aut sæpe magna vi ei repugnando.

III4. 2. Obstructiones, vel causam, vel effectum falsæ imaginationis, referando, emolliendo, incidendo, stimulando, per aquas minerales, serum lactis, mulsam, decocta splanchnica, hepatica, anthypochondriaca, aquas salibus lixiuiosis vel compositis acutas, mercurialia laxantia, vomitoria, motus, exercitia, equitationes; nauigationes, vterina, aristolochica, hæ-

morrhoidalia euacuantia, balnea, litus, emplastra.

1115. 3. Symptomata leniendo per venæ sectionem, immersionem in aquam frigidam, carminantia, opiata.

1116. 4. Præmissis euacuationibus (1114. 1115.), exhibendo ea, quæ exhilarare docet obseruatio, & roborare omnes corporis partes.

1117. Ex quibus (1110. ad 1117.) liquet, sanationem huius mali (1089.) absolutam esse in curatione bilis atræ (1097. 1100. 1101. 1106.), atque inde peti debere non hanc modo, sed infinitorum, falso pro incurabilibus habitorum, morborum.

M A N I A.

1118. **S**i melancholia (1082.) eousque increſcit, vt tanta accedat agitatio liquidi cerebroſi, qua in furorem agantur ſæuum, mania vocatur.

1119. Quæ gradu modo differt a melancholia trifti, huius proles eſt, ex iſdem cauſis oritur, iſdem fere remediis curari ſolet.

1120. In quo morbo eſt vt plurimum immenſum robur muſculorum, peruigilium

lium incredibile, tolerantia inediae & algoris mirabilis, imaginationes horrendae, lycanthropiae, cynanthropiae, &c.

1121. Notandum vero, anatomica sectione constitisse, horum cerebrum siccum, durum, friabile, in suo cortice flavum; vasa autem turgentia, varicosa, atro, tenaci cruore distenta fuisse.

1122. Tum etiam in hoc morbo omnes excretiones fere cessasse pariter.

1123. Praecipitatio in mare, submersio in eo continuata, quamdiu ferri potest, princeps remedium est.

1124. Frustra tentatae per omnia remedia, varix, haemorrhoids, dysenteria, hydrops, haemorrhagia magna spontanea, febres tertianae, quartanae accedentes, salutaria fuerunt.

1125. Huius maniae species oritur, postquam autumnali, valida, diuturna, intermittente febre, corpus exhaustum, debilitatumque, tam per morbum, quam per iteratas missiones sanguinis, & euacuationes alui saepissime repetitas; tum etiam per eadem haec renouari hoc malum solet.

1126. Haec species solis reficientibus,
Dd 4 replen-

replentibus, cardiacis, roborantibus, diu continuatis, sanatur. At, si euacuando tentatur, atrophiam, debilitatem, insuperabilem fatuitatem, infert.

1127. Mania vero enata in robustis, vegetis, floridæ ætatis, plethoricis, calidis, sanatur iisdem mediis, ac species epilepsiæ (1081.); missione sanguinis iterata; purgatione forti, inter singulas interposita; dein, impetrata sedatione, opiatís, & cardiacis.



IN MANIA.

SECT. 1126.

Rec. Cortic. Peruvian. drach. ij.

Magellan. drach. iij.

Conserv. Anthos vnc. j.

Syrup. Kermes q. s. Vt F. conditum.

Capiat drach. ss. omni triborio de die.

Vel.

Rec. Diascord. Syluii drach. j.

Elæosacchar. ex Ol. Citrei drach. ij.

Rad. Helenii condit. vnc. j.

Syrup. s. rad. aperient. q. s.

Vt F. conditum. Vfus idem.

Vel.

Rec. Rad. Zingib. condit. vnc. iij.

Cortic. Aurant. condit. vnc. ij.

Nucis



Nucis myrist. drach. iv.

Syrup. Artemis. Fernel. q. f.

Vt F. conditum. *Capiat ut prius.*

Vel.

Rec. *Theriac. Androm.*

Diátessar. Mesua, ana vnc. j.

Conserv. Absinth. vnc. fs.

Rad. Angelic. drach. ij.

Syrup. Tunicæ q. f. F. conditum.

Sumat drach. j. *quater interdium.*

Rec. *Cortic. Peruvian.*

Magellan.

Citrei,

Aurantior.

Chinæ,

Cinnam. ana vnc. j.

Summit. Serpill.

Tbymi,

Mari Syriac. ana vnc. fs.

Fl. Stæchad. Arab.

Lauend.

Tanacet. ana vnc. j.

Ligni Agalloch.

Sassafr. ana drach. vj.

Cum Vini Hispan. lib. vj. F. S. A. Vinum medicat.

Capiat. vnc. ij. quater de die, vacuo stomacho.

RABIES CANINA.

1128. **E**st & alia ægritudo, quæ ob furorem sæpe comitem, huc commode referri potest, quum ob summam perniciem tractari debeat.

Dd 5

1129.

1129. Vocatur rabies, & quia a canum morfu vt plurimum, rabies canina, tum a symptomate terribili, aquæ metus, hydrophobia, &c.

1130. Oritur fere semper ab aliis animalibus, prius rabiosis, suscepto contagio, tamen & sponte in acutis, quibusdam orta legitur, & obseruatur.

1131. Animalia autem fere quæcunque hoc malo affici, suoque contagio alia, & ipsum hominem lædere possunt.

1132. Nempe canes, feles, lupi, vulpes, equi, asini, muli, boues, sues, simiæ, galli gallinacei, homines, prius rabiosi, id vitium in alios propagauerunt.

1133. Nulli tamen animali frequentius, quam cani, lupo, & vulpi; hisque inprimis ex causis internis, absque contagio præuio, nascitur.

1134. Regio feruida; regio magno æstu squalens, & vicissim summo frigore horrens; tempestas æstuosa, siccaque diu durans; victus ex carne putrida, fœtida, verminosa; potus absentia; vermes renibus, intestinis, cerebro, cauis narium olfactoriis, innati, sunt causæ præcedentes, in his animalibus, nascituræ rabiei.

1135.

1135. Incipientis rabiei signa sunt hæc inprimis, quibus tetrae luis cautela nititur: fiunt tristes, solitarii, se abscondentes, muti quoad latratum, murmurantes tamen, cibum potumque omnem aduersantes, in ignotos quoslibet irati, & iruentes, heri tamen adhuc & memores & reuerentes, aures, caudamque dimittentes, somnolentorum instar incedentes: hætenus primus gradus mali iis adest: morsusque tum exceptus periculosus quidem, non vero pessimus est: dein anhelare, linguam exferere, spumam plurimam emitte, hiare, nunc segniter vt semisopiti, nunc subito celeriter incedere, non recta semper via, mox ne herum quidem amplius agnoscere, oculos habere demissos, lachrymosos, puluerulentos, linguam plumbeo habere colore, subito gracilescere, insanire, furere: hic secundus est gradus mali, quem vix triginta horis ferunt, quin moriantur. Morsus hoc tempore fere insanabilis: quo vero animal vehementius furit, diutius malo laborauit, morti propius est, eo morsus lethalior, acutior, & symptomata citissime creans violentissima, & contra.

1136.

1136. Vix autem ullius veneni tam multiplex contagium, nam morfu vel leuissimo, per vestimenta adacto, tantum radente, nec eliciente sanguinem; spiritu ex ore in hominis pulmone adducto spumæ contactu recentis, vel etiam dudum exsiccatae, labiis, linguaue exceptæ osculo tantum rabido cani dato; infectione a contactu multo instrumenti, vel vulneris, quo dudum ante animal rabiosum occisum fuit; esu lactis, carnisue animalis rabiosi; attactu, & pertractatione multa rerum per præcedentia infectarum.

1137. Rursum vix vllum venenum notum, cuius tam atrox, adeoque hominem immutans, virus, quodque, ubi incipit se prodere, tam violente & celeriter furit, & tamen simul adeo diu latere possit, antequam se manifestet: namque alii statim, alii vt narrant, post viginti integros annos a morfu elapsos, alii rursum omni intermedio tempore vrgeri incipiunt malis huic furori propriis: pendet vero hæc diuersitas, a calore tempestatis anni, a vario gradu morbi in animali mordente (1135.), a temperie hominis morfi, quum biliosi eo facilius vergant, pituitosi, & hydropi-

dropici contra, a diuerso victu, medicamentisque adhibitis.

1138. Homo optime sanus contagio hoc (1136.) infectus, post varium tempus (1137.), incipit hoc ordine fere ægrotare: dolet locus, cui impressa contagii labes primo fuit; dein vagi per alia maxime vicina, loca, dolores; lassitudo, grauitas, tarditas, in toto musculoſo genere; ſomni inquieti; turbati, terribiles, cum conuulſionibus, & ſubſultibus; inquietudo aſſidua; ſuſpiria; triſtitia; ſolitudinis ſtudium; atque his fere primus mali incurſus incipit, his ferme primus eius gradus finitur: ſanguis tunc venis emiſſus omni nota bonus. Tum poſtea priora augentur, acciditque porro ingens circa præcordia anguſtia; reſpiratio difficilis, ſuſpirioſa; horror; ad conſpectum aquæ, liquorum quorumcunque, & rerum vel pellucidarum, vel inſtar ſpeculi reflectentium, horripulatio, tremor; proſtratus appetitus; deglutitio tamen ſolidæ cuiusque offæ poſſibilis; attactus humoris cuiusque, maxime labiis vel lingua, incredibilem anxietatem, tremorem, conuulſiones immanes, atque furorem fere creans; vomiti-

vomitus glutinis fusci biliosi, aut bilis porraceæ; incallescencia; febris; vigiliæ assiduæ; priapismus; cogitationum alienarum & insuetarum perturbata valde series. Sic procedit malum, atque hic solet secundi gradus limites ponere. Postea autem omnia enarrata exacerbantur continenter, soletque sequi linguæ asperæ exsertio; hiatus oris; vox rauca; sitis ingens; furor ad conatum bibendi, humorum adspectum, contactumue; spumæ in ore collectio; eam in alios exspuendi conatus vel inuitus; ardor obuia quæque mordendi inuitus, nec tamen a voluntate comprimendus; spumante rictu frendit; pulsus & respiratio deficiunt; sudor gelidus; rabies summa, dum interim, quod mirabile, mens prudens, constans, aliis a se metuens, adest; hinc intra quartum fere semper a primo gradu diem, mors conuulsiva, cum summa in respirando angustia.

1139. Ex tota hac historia (1129. ad 1139.) constat huius mali cognitio: prognosis autem elicitur ex consideratione (1135. 1137. 1138.), simulque cogitando tristissimos vbique euentus, quum, a nata
medi-

medicina hucusque, omnes fere artis principes deplorent, *demorforum prophylaxin vix ullam certam haberi, at iam aquam pauentium sanatorum exemplum dari certa fide nullum!* maxime vero dolendum, post secula elapsa, irritum successum hactenus applicatorum deplorantia, non esse tentatas diuersas a primis methodos.

1140. Dissectio cadauerum docuit, plerumque organa deglutiendi vtcunque inflammata; gluten biliosum varium in stomacho; vesiculam fellis atrabile plenam; pericardium ficcum; pulmones coaceruato omni fere cruore incredibiliter plenos; cor sanguine saepe fere ficcato plenum; arterias plenas; venas vacuas; cruorem valde liquidum, & vix in aëre conrescentem, dum missus vena concreuerat ante triduum; omnes musculos, viscera, cerebrum, cerebellum, spinalem medullam, ficciora solito.

1141. Curatio omnis hactenus, paucissima exceperis, incerta, tam prophylactica, quam therapeutica; cuius prima causa inanis iactantia multorum specificorum, & neglectus methodi ex historia mali excogitata.

1142.

1142. Quantum ergo ex omni hac historia, comparatione eius cum aliis morbis, & feliciori paucorum casuum euentu concludere licet, videtur primo consistere in affectione neruorum, proxime referenda ad conuulsiones, quæ viscera, horumque vasa occupent, dein hinc vitium nasci sanguini, humoribusque, quod inflammationi gangrænosa quasi proximum sit; sedem vero mali primum circa stomachum, & vicina hære.

1143. Curatio in demorso prophylactica requirit, vt 1. statim a contagio suscepto totus locus affectus, vna cum vicinis profundis pertundatur scarificationibus, multumque mittat sanguinis; applicentur magnæ cucurbitæ fortiter trahentes; vel ferro inuratur ignito satis profunde; dein adigatur in suppurationem perpetuam applicatu eorum, quæ assidua rosione exulcerant; interim toto illo tempore, ab initio in finem, semper foueatur muria ex sale marino & aceto, nunquam intermittendo; id continuetur vsque ad sextum quidem mensem. 2. vestimenta, & cætera, quæ venenum attingere, vel afflare potuit, caute abiiciendo, vitando.

do. 3. statim post infectionem, magno cum apparatu, metu incusso, sæpe minitendo, tandem præcipitem in mare vel fluuium dando, aliquamdiu submersum tenendo, iterum mergendo, id repetendo aliquoties cum iisdem omnino circumstantiis: eas enim sanare spiritum turbando, non aquam salſam, docuit funestus exitus hominis post morsum naufragi, multis horis natantis, sæpe diu fluctibus submersi, tamen postea hydrophobi; dein rheo, agarico, succo corticis sambuci, sæpe, & valde fortiter purgetur. 4. omni mane ieiunus parum sudet assumpto aceto aromatico, sale marino, aqua calida. 5. quotidie pedes, manusque, balneo aquæ foueat, caput lauet, os, faucesque coluat, sæpe natet. 6. frigidam frequenter bibat, euomatque sæpe, tunc & potus acidulos; victus sit humidus, leuis, laxans tanta copia sæpe sumtus, vt reuomatur; cauendo a nimis aromaticis, vino, calefacientibus, vt & a motu nimio corporis, vel animi.

1144. Curatio vero morbi iam præsentis videtur tentanda, maxime in primo gradu; & in initio secundi (1138.), in-

Ee

primis

primis quum aliter funestissimo exitu neglectus plectatur. Apparet maxime probabile, & paucis experimentis confirmatum, sequentia fieri debere: 1. statim post prima signa inuadentis mali (1138.) morbus tractandus, vt summus inflammatorius (890.), mittendo sanguinem ex lato vulnere magni vasis ad animi deliquium vsque, mox clysmata ex aqua nitrosa, modiceue falsa, cum pauxillo aceti, iniicienda; hæc repetenda audacter, etiam plus, quam in aliis morbis prudentia concederet: interim hoc facto, obnubilatis oculis in piscinam frigidam demittendus, vel aquæ frigidæ iniectu humectandus tam diu, donec aquam vix amplius pauceat; tum statim plurimum aquæ bibere cogatur, & de die sic vexato vesperi concilietur somnus: victus sit tenuissimus, humectans semper.

1145. Vt vero methodus hæc nititur omni morbi indole, omni artis præcepto; ita videtur nihil exitiale magis, quam acerrimis calefacientibus, exsiccantibus, nervosum genus exacerbantibus medicamentis, hic venenis, iam exsiccatos suo malo ægros enecare; rursumque nihil crude-

crudelius, quam abiecta curatela omni, statim negligere, aut suffocare.

1146. Nec desperandum tamen, ob exempla iam in aliis venenis constantia, de inueniendo huius singularis veneni antidoto singulari.

1147. Haftenus vero nullius ea comperta fides, cui credi queat salus miserissime periclitantis hominis, quum nullum sit notum, cuius experimenta certa; sed vel speculationi ortum debent, vel descriptis ex alio confisum fuit: nec Aeschrionis apud Galenum & Oribasium arcano de cancris combustis; nec Scribonii Largi famigerata opiata ad rabiem Siculorum; nec Peregrini consilio de pelle hyænæ, nec Aetii, Rufi, Posidonii, cinere cancrorum cum theriaca; nec iactata Palmario medela; vel nimis laudato Mayerno, Grew, & venatoribus, stanno cum mithridatio; nec insomniis sacris reuelata radice cynorrhodonis, aliisque in cælum elato lichene cinereo terrestri, pimpinella, iecore rabiosi canis exusto, & similibus; exceptis.



IN RABIE CANINA.

SECT. 1144.

Clyfma.

- Rec. *Nitri* drach. ij.
Aceri Sambuc. vnc. j.
Mell. rofar. vnc. j.
Aq. decoct. Hord. vnc. x. M. F. *Clyfma*
- Rec. *Sal. marin.* drach. ij.
Aceri flor. calend. drach. vj.
Mell. commun. vnc. j.
Aq. stillat. Rutæ vnc. x. F. *Clyfter.*

SCORBVTVS.

1148. **S**corbutus septentrionalis maris
 accolis frequentissimus mor-
 bus, plurimorum aliorum causa, neque
 recens, neque veteribus præteruius, li-
 cet haud adeo accurate descriptus, defe-
 ctu longarum nauigationum, & peregri-
 nationum in plagas telluris frigidissimas.

1149. Hic, quum variatis admodum
 symptomatibus sæpe fallat, melius non
 cognoscetur, quam, si tota eius historia
 præmissa, deinde demum de eius natura
 constituatur.

1150. Inuenitur apud Britannos, Ba-
 tauios, Suecos, Danos, Noruegos, Ger-
 ma-

manos septentrionales, seu inferiores; attingit adeoque boreales populos, & frigidiori sub climate viuentes; atque inter hos maxime infestat vicinos mari, locis marina aqua submersis, lacubus, paludibus, glebæ spongiosæ pingui, solo depresso inter aggeres exaltatos, aquam coercentes, sito; inprimis sæuit in otiosos, hyemali tempore in locis lapidibus instratis & extructis frigidos, in nautas falsis, fumo duratis carnibus, pane biscocto, aqua putrida, verminosaque vtentes mari, terrae; item quos aues aquaticæ, pisces falsamentarii, ad ventos, fumosue indurati, caro bubula, suillaue fumo & sale condita nimis delectat, vel farinacea non fermentata, pisa, fabæ, caseus salitus, acer, antiquus; hos qui melancholiæ, mania, labi hypochondriacæ, hysterica, morbis lentis obnoxii viuunt, maximeque qui nimio cortice Peruuiano fuerunt vsi.

1151. Dum vero hos aggreditur, his fere phænomenis incedit, augetur, maturatur:

1. Pigritia insolita, torpor, sedendi & decumbendi amor, lassitudo spontanea toto corpore, grauitas eiusdem, musculorum

Ee 3

lorum

lorum omnium dolor quasi a nimia fatigue, maxime in cruribus lumbisque, ambulandi inprimisque per acclive vel declive summa difficultas; mane a somno euigilanti sensus omnium artuum & musculorum quasi fatigatorum & contusorum.

2. Difficilis, anhelosa, ad motus vel paruos fere deficiens respiratio; crurum tumor accedens, recedensque, horum præ gravitate immobilitas; maculæ rubræ, fuscæ, flauæ, violacæ; faciei color pallido-fuscus; oris fœtor incipiens; gingivæ tumentes, dolentes, calidæ, prurientes, ad minimam pressionem euomentes cruorem; dentium ob retractas gingivas denudatio, & mobilitas; dolores varii, vagi, per omnes externas, internasque corporis partes mira producentes tormina, pleuritica, stomachica, iliaca, colica, nephritica, cystica, hepatica, lienaria &c. hæmorrhagiæ variæ, sed leuiores.
3. Gingivarum putredo fœtens cadauer, harum inflammatio sanguinem stillans, gangræna; dentium vacillatio, flauedo, nigritudo, caries; varicosi anuli.

nuli ad raninas venas; hæmorrhagiæ sæpe lethales, ex ipsa cute externa, non apparente vulnere, ex labiis, gingiuis, ore, naribus, pulmonibus, stomacho, hepate, liene, pancreate, intestinis, vtero, renibus &c.; vlcera pessima, obstinata, nulli applicato cedentia, facile gangrænosa, vbique, maxime in cruribus, vagantia, cum diuturno foetore; scabies, crustæ, sicca & lenis elephantiasis; sanguis venis eductus, in fibrosa parte ater, grumosus, crassus, & tamen solutus, in parte serosa salsus, acer, mucosus flavo viridi in superficie scatens; dolores summi erodentes, lancinantes, cito traicientes, noctu ingrauescentes per omnes artus, iuncturas, ossa, viscera; maculæ liuidæ.

4. Febres variæ, calidæ, malignæ, intermittentes omnimodo, vagæ, periodicæ, continuæ, ἀτρεφίαν inducentes; vomitus; diarrhææ; dysentericæ; stranguriæ sæuæ; lipothymicæ; anxietates sæpe subito lethales; hydrops; tabes; conuulsio; tremor; paralytis; contractura; maculæ nigræ; vomitus, & secessus sanguinis; hepatitis, lienis, pan-

Ee 4

crea-

creatis, miseræi putredo & consumptio;
contagium celere.

1152. Ex quibus liquet, huius morbi naturam & effectus non difficulter elici ab his, qui prædicta expendunt.

1153. Et causam eius proximam esse eam sanguinis indolem, qua & crassitie simul in vna, & tenuitate acri salsa, alcalica, vel acida in altera parte peccat: quæ in primis accurate inuestiganda & distinguenda sunt.

1154. Et ex his per historiam morbi (1151.) cognitis, omnia eius morbi phænomena, vtut mira, facile deduci posse.

1155. Quod ipsum clarius docent regulæ, quas curatio morbi prospero, vel sinistro euentu comprobauit; quarum præcipuæ hæ sunt.

1156. In hoc morbo crassum est reddendum tenue; stagnans mobile; cohærens fluidum.

1157. Item nimis tenue cogendum; acre leniendum, in genere, in specie.

1158. Et in correctione vnius (1156.) semper respiciendum ad naturam alterius (1157.), vnde summæ artis opus tentare hunc morbum cum successu.

1159.

1159. Acrīa euacuantiā ſemper hunc morbum exaſperant, & ſæpe reddunt incurabilem.

1160. Hinc α . incipiendum in ſpecie (1151. N°. 1.) prima a leni, attenuante, deobſtruente, purgatiuo, parca doſi ſæpe iterata. ϵ . pergendum in attenuantibus, & digerentibus dictis. γ . deſinendum in ſpecificis lenioribus, diu continuatis, in forma quacunque. δ . interim ſex res non naturales ita ordinandæ, vt ſint contrariæ cauſis (1150.).

1161. Ad ſecundum gradum (1151. N°. 2.) conferent eadem, quæ in priori, (1160. α . ϵ . γ . δ .) tum uſus ſcorbuticorum acriorum paulo, forma ſucci expreſſi, conferuæ, ſpiritus, ſal. vol. vini, cereuiſiæue medicatæ; balnea itidem externa & pediluuiā ex antiſcorbuticis; frictiones calidæ, ſiccæ, cum ſpecificis liquidis; ſæpe venæ ſectio conducet, vt pars acris liquidi tollatur, eroſio in vaſa nimis diſtenta minuatur, reuulſio procuretur, via paretur medicamentiſ applicandis.

1162. Prout vero tenuitas acris, calor ingens, metus hæmorrhagiæ, maiora; vel craſſities, inertia, frigus, vaſorum pallor,

Ec 5

maio-

maiora; vtendum specificis modice adstringentibus, frigidiusculis, vel calidis, acribusue.

1163. Ad vitia autem oris in hac specie emendanda oportet vti his, quæ antiphlogistica, antiscorbutica, & simul huic illiue scorbuti speciei appropriata sunt.

1164. Ad speciem tertiam (1151. N°. 3.) valent omnia prædicta, nisi quod vtendum fit maxima copia liquidorum lenium, facile meabilium, antisepticorum, antiscorbuticorum, cum leni promotione sudoris, vrinæ, fæcis aluinæ, diu continuata.

1165. Ad quartam vero speciem raramedela; varianda medendi methodus pro varietate symptomatum; aliquando mercurialia profunt; vt & præscripta (1164.).

Ex quibus omnibus (1148. ad 1165.) rite consideratis, & cum phænomenis morbi, & cadauerum incisorum, collatis, constat, in curatione felici huius morbi id agendum maxime, vt indagetur indoles vitiosi humoris & singularis acrimoniæ, quæ prædominans peccat: quumque illa acrimonia sit salina muriatica, acida austera, alcalina fœtens, rancida oleosa; atque de
his

his singulis, & vniuersis sæpe actum sit, ordinator mali curatio habebitur; & liquet, cur serum lactis, lac ebutyratum, aquæ medicatæ, toties desperata huius morbi mala sanauerint? & quæ? Cur acidi succi horæi maturi pomorum arantiorum, citriorum, limoniorum, granatorum, acetosæ, acetosellæ, aceti, vini rhenani, mosellani, toties specifica huic morbo, & quando? Cur adstringentia austera, vt rheum, lapathum, tamariscus, caparis, vinum austerum nigrum, rubrumue, vt & chalybs, adeo sæpe bona? & vbi? Cur acerrima aromata, cochlearia, lepidium, nasturtia, arum, raphani, piper, zingiber, semperuiuum minus acre, sales alcalini volatiles, fixi, oleosi, aromatici, saponacei, iterum sæpe sola profint? Cur quod vni scorbutico salutare, id exitiale idem alteri fiat? Cur ergo non nomini huius mali studendum sit, sed eius tantum singulari, ac si alius foret morbus, genio.



AD SCORBVTVM.

SECT. II60. L. a.

Purgans.

Rec.



Rec. *Tartar. Vitriol. non acid.*

CrySTALL. Tartar.

Sal. Polychrest. ana drach. fs. M. F. Pulu.

Mane hauriendus ex Sero lactis: superbibat Seri dein vnc. xij.

Aliud.

Rec. *Sal. Polychrest. drach. ij.*

Pil. Coch. maj. scrup. j.

Syrup. rosar. solut. cum fenna drach. vj.

Aq. stillat. cichor. vnc. ij. M. F. Haustus.

Rec. *Elixir. propr. cum sale Tart. pp. drach. ij.*

Syrup. Rosar. solut. cum fenna drach. vij.

Aq. still. Fumar. vnc. ij. M. F. Haustus.

Rec. *Pil. Coch. Maj. drach. j.*

F. Pil. N. xxi.

Capiat duas vesperi ante somnum, mane s. ante ientaculum.

SECT. II60. L. β.

Attenuantia digerentia.

Tinctura salis Tartari Helmontiana. drach. j.

Ex Vini vnc. ij.

- - - - *Harueiana. drach. iv.*

Ex Vini vnc. iij.

- - - *Martis Ludouici. drach. j.*

Ex Vini vnc. j.

Tartarus vitriolatus.

CrySTALLI & cremor tartari.

Vitriolum Martis.

Sal polychrestus.

Sales Tacheniani ex vegetabili. drach. j.

Ex Vini vnc. iij.

Elixir. propr. cum Sp. Aceti pp. drach. ij.

- - - - *sale tartar. pp. drach. ij.*

aquis



- - - - - aquis aromat. pp. *drach.* iij.

Sales volat. oleosi aromatici. *drach.* j.

Sapo Venetus. *drach.* iv.

- - - Starkeianus. *scrup.* ss.

Oxymel simplex. *unc.* iv.

- - - - - scilliticum simplex. *unc.* iij.

- - - - - compositum *unc.* ij.

Conserua Acetosæ.

Lujulæ.

Poma Aurantia.

Chinenfia.

Citrea.

Limonia.

Granata.

SECT. II60. L. γ.

Specifica Antiscorbutica leniora.

Abrotanum mas.

- - - - - fœmina.

Absinthium latifolium.

- - - - - tenuifolium.

Acetosæ omnes species.

Acetofellæ omnes species.

Ageratum.

Agrimonia.

Anagallis mas.

- - - - - fœmina.

Artemisia.

Balsamita.

Bardana.

Beccabunga.

Botrys.

Brassica rubra, capitata.

Bunium.

Buxus.

Chærophylum.

Chamædrys.

Chamæpitys.

Cichorea.

Crambe.

Cuminoides.

Endiuiæ.

Eupatorium cannabinum.

Fœniculum.

Fumaria.

Galegæ ambæ species.

Hedera terrestris.

Lapatha.

Leuisticum.

Maiorana.

Melissa.

Mentha.



Nasturtium aquaticum.

----- hortense.

Nummularia.

Rheum Barbarum.

Salvia.

Scabiosa.

Scordium.

Sophia.

Veronica.

Vrtica.

Poma aromatica odorata.

Aurantia. Citrea. Granata. Limonia.

Fructus Berberis.

Cerasa matura quæcumque.

Fraga.

Grossularia.

Mori.

Poma acido dulcia.

--- Armeniaca.

--- Persica.

Pruna matura quæcumque.

Fructus Rubi vulgaris cæsi.

----- rubri.

----- Idaci.

----- Sambuci.

----- Tamarindi.

----- Vitis Idææ.

SECT. II61.

Scorbutica acriora.

Acriuiola.

Allia.

Alliaria.

Arum.

Armoracia.

Abfinthium.

Cepæ.

Chelidon. majus.

Cochlearia.

Enula.

Erysimum.

Eruca.

Gentiana.

Gratiola.

Isatis.

Piperitis vel Lepidium.

Por.



| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Porrum. | Santonicum. |
| Ptarinica draco. | Saponaria. |
| Raphanus hortensis. | Sedum minus vermiculare |
| - - - - - rusticanus. | acre. |
| Ruta. | Sinapi. |
| Sabina. | Trifolium aquaticum. |

Succus expressus.

Rec. *Raphan. rustican. radula rasi* vnc. iv.
Fol. rec. Cochlear.

Nummular.

Vrtica, ana m. iv.

Succum S. A. exprime & saccharo misce.

Capiat drach. ij. *quater, vel sexies, de die*

Spiritus.

Rec. *Semin. Sinapi,*
Raphan. hortens.
Eruca,
Erysimi,
Nasturt. hortens. ana vnc. j.

Fol. Cochlear.

Lepidii,

Raphan. rustican, ana m. ij.

Concissis & contusis adde

Sal. marini vnc. ij.

Flor. Cereuifia vnc. j.

Sp. Vini q. s. ad excessum duorum digitorum.

Destilla & cohoba ter.

Sal Volatile.

Præcedentibus, loco sal. marin. & flor. cereuifia, ad-
misce

Sal. Ammon. contusi vnc. iij.

Cinerum clauellar. vnc. vij.

Destilla vt ante.

Cere-

*Cereuisia.*

Rec. *Fol. recent. Cochlear.*

Eruca.

Erysimi,

Trifol. aquat. ana m. j.

Semin. recent. contus. Nasturt. hortensf.

Raphani hortensf. ana vnc. ij.

Flor. Centaur. min. vnc. j.

Rad. Raphan. rustic. vnc. v.

Concisissa reconde in cereuisiæ recentis & feruescentis

$\frac{1}{2}$ dolio,

Pro potu assiduo.

Vinum.

Rec. *Bulb. Ari recent. effossi, vnc. fs.*

Raphan. rustic. vnc. j.

Fol. Cochlear.

Trifol. aquatic. ana m. j.

Semin. Sinapi vnc. ij.

Vini Rhenani lib. vj.

F. S. A. Vinum medicatum.

SECT. 1162.

Antiscorbutica modice adstringentia.

Capparis.

Flos Genistæ.

Fraxinus.

Lapathum, omnesque eius species.

Lupulus.

Polypodium quercin.

Rhabarbarum.

Tamariscus.

Antiscorbutica frigidiuscula.

Poma odorata {
 { Aurantia.
 { Citrea.
 { Limonia.
 { Chinenfia.
 { Granata.

Fractus

Fructus horæi acido dulces.

Acetosa.

Acetosella.

Cichorea.

Endiuvia.

Luiula.

Tartarus & omnia acida tartarifata.

Lactuca.

Taraxaca.

Hydrogala, *æstase*.

Serum Lactis.

Lac. ebutyratum.

Calida & acria.

Vid. §. 1161.

SECT. 1163.

Collutoria oris.

In calidis.

Rec. Myriæ limonum,

Mell. rosac. ana vnc. ij.

Sp. sal. dulc. drach. fs.

Aq. stillat. rutæ vnc. ij. M.

Rec. Sp. Salis marini drach. ij.

Aq. stillatit. saluæ vnc. viij. M.

Rec. Succi limon. recent. vnc. j.

Salis ammoniac. drach. j.

Aq. stillatit. rutæ vnc. vj. M.

In Frigidis.

Rec. Sp. zheriacal.

coclear. ana vnc. j.

Mell. anthosat. vnc. ij. M.

Rec. Sp. Vini camphorati vnc. fs.

Tinctur. myrrhæ vnc. j.

Rob. iuniperin. vnc. fs.

Aq. stillatit. absinth. vnc. iv.

Sal. gemmæ drach. j. M.

Ff

SECT.



SECT. 1164.

Rec. *Fumariæ*,
Acetosæ,
Beccabungæ,
Trifol. aquat. ana m. j.
Seri lactis,
Lactis ebutyrati, ana pint. ij. F. Decoctum.

Rec. *Acetofellæ* m. jss.
Betonica,
Chærophylli, ana m. ss.
Tamarindor. vnc. jss.

Concissa infunde cum *seri lactis æstivi* lib. iij.
 Spatio horæ, in calore fere feruido, absque ebullitione tamen, dein per linteum expresso admisce,
Syrup. e succo citrei,

Rubi Idæi
Violacei, ana vnc. j.

Bibat de alterutro, omni semiborio interdiu, vnciam vnam.

C A C H E X I A.

1166. **C**achexiæ nomine intelligi solet ea dispositio corporis, quæ nutritionem eius deprauat per totum illius habitum simul.

1167. Adeoque pro causa agnoscit vel liquidi nutrientis deprauatam indolem quamlibet, vel vitium vasorum receptorum, vel defectum facultatis applicantis.

1168.

1168. Humoris deprauatio oritur 1. ab assumtis, quæ a virtute mutante in nobis non possunt assimilari restituendis: qualia cibi farinacei, leguminosi, crassi, fibrosi, pingues, acres, aquosi, viscosi (69). Corpora indigerenda, vt cespites, creta, arenæ, calx &c. 2. Ab defectu motus animalis in otio, torpore, somno nimio. 3. a vitiatis organis per debilitatem nimiam (41. 42. 43. 44.), aut nimium robur (50. 92. &c.); liquidisue vitio non facili medicabili (60. 69. 76. 106. 107. 406.): hisce causam præbent multa, vt omnes secretionis nimix, qualescunque demum fuerint, vomitus, diarrhœa quælibet, dysenteria, hæmorrhagia quælibet, visceris singularis vitium scirrhusum &c. retentio quælibet secernendi.

1169. Patet vero, has causas semel positas, vel minuendo solida, vel infarciendo ea liquidis libere transfluere ineptis, agere; vnde duplex notabilis huius mali effectus, tabes sc., vel leucophlegmatia, & hydrops anasarca.

1170. Quin & pro vario colore, mole, tenacitate, acrimonia, fluiditate liquidi infarcti varii admodum morbi, vt ca-

chexiæ effectus, prodire solent: cutis sc. albitudo, pallor, flauedo, liuiditas, rubedo, viror, nigritudo, fuscus color; grauitas; tumor sub oculis, & partium tenuissimarum; flatus, œdema partium a corde remotarum; cordis arteriarumque palpitaciones, ad minimum motum admodum auctæ; vrinæ crudæ, tenues; sudores spontanei aquosi plane; tandemque marcor, vel leucophlegmatia & hydrops.

1171. Vitium vasorum recepturorum bona liquida nutrititia vniuersale fingi vix potest vllum; tamen nimia contractilitas & laxitas, atque inde pendentia vitia pro causis admitti possunt: de quibus actum (24. ad 58.)

1172. Defectu facultatis applicantis nutritio vniversalis impeditur; si vires circulantes sunt nimis languidæ, vel nimis violentæ (92. ad 107.)

1173. Ex quibus diagnosi morbi facilis: prognosin firmat consideratio causæ, durationis, effectus, gradusque mali.

1174. Quin patet, etiam curationem semper quidem requirere 1. aliquando nimis acris, fluidique mitigationem, inspissationemque modicam. 2. tenacis, hæren-

rentisque, dissolutionem atque fluxilitatem. Sed quum a tam variis causis hæc duo oriri queant, (1168. 1169. 1170.) inprimis necessarium esse pro harum diuersitate variare & medicamenta, & modum his vtendi.

1175. Maxime curandum, vt victus sit ex his, quæ liquidis sanis similia, facile transmittenda, causæ singulari morbi aduersa, ægroque inprimis grata sunt.

1176. Tum vt optime digeri queant, condimentis, potu vinoso, exercitio, aëre, procurandum.

1177. Vt vero organa primarum coctionum itidem bene disponantur, leni digestiuo, vomitiuo, purgante, roborante, prospiciendum.

1178. Et vbi horum vsu viæ laxatæ, materies morbofa attenuata erit, tum attenuantibus, diureticis, sudoriferis insistendum.

1179. Vltimo chalybeatis vtendum, alcalinis, saponatis, cum exercitio cursus, vectationis, frictionis, balnei.

1180. Hæc autem ex variis peti, varie præparari, applicarique debent, pro causa proxima cognita.

Ff 3

1181.

1181. Vbi vero a nimia acrimonia consumtio, & tabes cachectica, inquirendum in acrimoniæ speciem, si fieri queat, 1. per indagationem causæ cachexiæ (1168.) 2. temperiei morbi, ægrique. 3. symptomatum. 4. excretorumque.

1182. Hæc cognita corrigenda suis contrariis (vid. 1166.)

EMPYEMA.

1183. **Q**uoties intra pulmones & pleuram pus in thoracis cauo colligitur, empyema est.

1184. Quod semper supponit vomitam purulentam fuisse ruptam, cuius elapsus pus thorace recipitur.

1185. Tales sunt vomicæ 1. Pulmonum ab inflammatione horum (820. 867.), a spūto sanguineo, a materie ad fluorem inepta his impacta. 2. Pleuræ ab inflammatione huius, (875.) a vulnere externe inflictō leui, cito externe clauso, interne rupto (298.), a contusione huius, vel rupture tectā in suppuratum abeunte (324.). 3. Diaphragmatis inflammati, suppurati, in superiora rupti (907. 910.). 4. Me-

Mediaſtini ſimiliter affecti (877.) vt & 5. Pericardii ipſius (877).

1186. Cognoscitur futurum 1. ab inflammatione quinque partium (1185.) nulla coctione, reuulſione, criſi, medicamento depurata, ſed cum horrore vago, febricula, noctu graui, calore vago, grauitate loco doloris, dyſpnœa, appetitu proſtrato, ſiti maiori deſinente. vid. (833. 892. 913).

1187. Cognoscitur iam præſens 1. a tempore inceptæ inflammationis xx. dierum ſine purgatione. 2. a ſignis vomicæ in quinque partibus (1185.) diſparentibus. 3. a nouo dolore, tuſſi, dyſpnœa, ſaliuatione ortis, moxque diſparentibus. 4. a tuſſi ſicca, grauitate ad diaphragma, decubitu in vnum latus, ſtrepitu puris ad motus, febre lenta, genis rubentibus, oculis cauis, digitis in extremitate calidis, vnguibus recuruis, abdominis tumore.

1188. Effectus huius mali 1. puris ex vlcere rupto, nec dein ſanato, vel repurgato, continua accumulatio. 2. huius in loco clauſo, calido, humido, perpetim agitato, exacerbatio, putredo, fœtor, attenuatio. 3. diaphragmatis eleuandi im-

Ff 4

pedi-

pedimentum, pulmonumque extendendorum: vnde anhelosa, difficilis, erecta respiratio, metus suffocationis iacenti, decubitus in liberam partem impossibilis, tussis sicca perpetua, anxietas. 4. Pulmonis, pleuræ, diaphragmatis, pericardii, cordis ipsius maceratio, corrosio, in tabum fluidum consumptio, vnde febricula hæctica cum pulsu celeri, paruo, rubore genarum, siti perpetua, fame sublata, debilitate summa, animi defectibus. 5. hinc omnium liquidorum ineptitudo ad nutritionem, circulationem, secretionem, excretionemque; vnde tabes, ἀτρεφία, fibrarum resolutio, liquidorum putredo, adeoque vel per comesum pulmonem reiectio, vel alui fluor saniosus lethalis, cum sudore nocturno post somnum, pustulis faciei, aduncis vnguibus, flauedine pellucente, facie Hippocratica.

1189. Curatio huius pro varietate causæ statusque mali diuersa plane est.

1190. Nam 1. cognita vomica pulmonis, pleuræ, diaphragmatis, mediastini, & pericardii; quod cognoscitur ex signis propriis, (834. 835. 893. 910.) omni ope nitendum, vt id rumpatur quantocyus, & deter-

determinetur ad exteriora: quod fit igne, ferro, medicamentis, motu idoneo.

1191. 2. Vbi constat iam factam disruptionem (302. 836. N°. 4. 5. 894. 910.), tum statim pus elapsum erit educendum, α. per os, si natura hanc monstrauerit viam. β. per vrinas, si in ea apparent puris euacuatæ signa. γ. per thoracis aperturam, factam ope instrumenti idonei in latere affecto, inter costam 5 & 6, vel 4 & 5, ab inferioribus numero ducto, pure lente, & per vices ducto, & leni mulla aliquando repurgato, vltimo bene consolidato (303.). δ. dando simul decocta vulneraria, abstergentia, putredini resistentia satis magna copia.

1192. Si pus album, læue, æquale, fœtoris expers, specillum non colorans exit, si æger sine feбри, siti, alui fluore, bene appetit, digerit, cætera sanus est, aëri ingressus in thoracem, quantum possibile prohibetur, spes est, ægrum conualiturum (304. 305.)

1193. Si pus fuscum, ichorosum, fibrillis mistum, fœtidum, specillum instar ignis colorans, subcruentum, vno impetu

F f 5

totum

totum effluens, effluit, summum periculum, & mors, vel phthisis.

1194. Si exesum fuerit mediastinum, aperto thorace, sæpe subitanea suffocatio.

1195. Si empyema vetus, vires collapsæ, capilli iam cadant, alui fluor colliquatius adfit; corpus contabescat; paracentesis facta mortem accelerare solet.

PHTHISIS PULMONALIS.

1196. **S**i vlcus pulmones exederit ita, vt totus inde habitus corporis consumatur, phthisis pulmonalis ægrum afficere dicitur.

1197. Cuius vlceris origo deducitur ab omni causa, quæ valet sanguinem in pulmonibus ita sistere, vt in materiem purulentam abire cogatur.

1198. Hæ causæ possunt referri. 1. ad ipsam corporis temperiem illam, qua vergunt in hæmoptoen primo, hinc in vlcus loci erosi. Hæc consistit æ. in teneritudine vasorum arteriosorum, & in impetu acrioris vtcunque sanguinis: cognoscitur conspectu tenellorum vasculorum, & totius corporis; collo longo; thorace plano

plano & angusto; scapulis depressis; sanguine valde rutilo, tenui, dissoluto, acri, calido; colore valde candido, & amœno roseo; cute pellucida; hilaritate, & subtilitate præcoci ingenii. *ε* in ea debilitate viscerum, qua ingesta sua indole nimis tenacia obstructions, putrefactiones, acrimonias, suscipiunt, hisque dein malis erosa vasa, post hæmoptoen exulcerant: cognoscitur leui febricula, tussicula sicca, calore maiori, rubore labiorum, oris, genarum, auctis & insurgentibus, quo tempore noui chyli in sanguinem ingressus, facili sudore dormienti, debilitate, anhelitu ad minimum motum magno. *γ* in ea ætate, qua vasa incrementi apicem adepta, vltiori productioni suæ resistunt, dum interim sanguis augetur copia, acrimonia, impetu: adeoque intra 16 & 36. ætatis annum. *δ* in hæreditaria dispositione: huc refer dicta (24. 26. 29. 38. 39. 40. 41. 44. 45. 48. 60. 61. 64. 69. 72. 82. 84. 86. 100. 106.), illa enim comparata modo dictis (*1198. α. ε. γ. δ.*) explicant, definiunt, prælagiunt, naturam, causas, effectus, hæmoptoes: huius vero conditionis effectum, hæmoptoen accelerant *i. omnes*
con-

consuetæ excretiones interceptæ, maxime sanguinæ, vt hæmorrhoidalis, vterina menstrua, lochiorumue, hæmorrhagiarium, missio sanguinis consuetæ, inprimis in plethoricis, vel truncatis membra. 2. vis quæcunque magna pulmonibus illata, tussi, clamore, cantu, cursu, nixu corporis ingenti, ira, vulnere quocunque quacunque causa inflicto. 3. victu acri, salino, aromatico; potu simili; vita; morbo alio, vnde copia, acrimonia, velocitas, rarefactio, calor sanguinis augetur; vnde in febribus acutis, peste, variolis, scorbuto, toties contingit.

1199. Hinc (1198.) oritur cum dolore leui, calore modico, angusta oppressione in thorace perceptis; exit sanguis plerumque floridus, coccineus, spumans, cum tussi, strepitu pulmonis, fibris, membranulis, vasculis arteriosis, venosis, bronchialibus; pulsu molli, paruo, vndoso, anhelitu; sapore falso in ore antegresso.

1200. Curatur 1. Venæ sectione larga, tertio quoque die, ad quartam vsque vicem, repetita, vel donec crusta inflammatoria integre disparuit. 2. Medicamentis refrigerantibus, incrassantibus, stipticis,

cis, lenientibus, diu vsurpatis, intermistis subinde lenissimis balsamicis. 3. Sex rebus non naturalibus ita directis, ut aduersissimæ sint causis (1198.) enarratis: maxime victu, vitæque, blandissimis semper continuatis; quo lactis diætâ imprimis facit. 4. Corrigendo specificam naturam causæ vel morbi singularis.

1201. Vbi semel accidit, sedatumque est (1200.), quibuslibet 6 mensibus per aliquot annos mittendus sanguis, sensim tamen copiam minuendo.

1202. Si vero ob magnitudinem mali (1198.), stiptica male applicata, neglectamue veram medendi methodum (1200.), post sputum sanguinis oritur dyspnoea, assiduo increscens; horror vagus; calor ruborque genarum; tussicula sicca; febricula hæctica; sitis maior, debilitas; grauitatis in thorace sensus; signat, vulnus hæmoptoes iam collectam circa labia sua, & sub crusta arefacti cruoris, materiem mutare in pus, collectionem abire in vomicam tectam, qua rupta, in vlcus pulmonum apertum.

1203. 2°. Oritur itidem collectio hæc puris, præter causas dictas (1199.), a peripne-

pneumonia quacunque terminata in apostema (832. ad 843. 867.); cognoscitur iisdem signis (832. ad 843. 867.).

1204. 3°. Quin empyema (1185.) ortum potest rodere, eliquare, consumere pulmonem; ut fiat idem morbus, ac si proprio hic ulcere absumeretur (1188. N°. 4). Cognosciturque signis ibidem positis.

1205. Vnde liquet, quænam signa sint cognoscendi ulceris pulmonalis, etiam tecti; quod diuersæ eius causæ, quam diuersæ species, ut & quam diuersa phthisis?

1206. Effectus vero ulceris pulmonalis iam facti, sed tecti, nomine vomicæ, hi fere obseruandi: puris acrimonia, copia, putredo quotidie auctæ; membranæ hoc coercentis dilatatio, corrosio, maceratio: vasorum sanguiferorum, bronchialiumque conuersio in pus: totius pulmonis, vel alterutrius lobi consumptio purulenta: tussis fere perpetua sicca, vel sputa solo concussu tussiculoso abrafa promens: sanguinis in vlcus affluentis conuersio in pus: vomicæ propagatio in pulmone: vomicæ huius perruptio in laryngis tubos:

bos; puris suffocans aliquando secretio, vel quotidiana cum tussi, ingens, in aqua subsidens, coacta, dulcis, pinguis, foetida, alba, rubra, flava, liuida, cineritia, strigmentosa, igni imposita carnem asiam spirans foetidam; vomicae perruptio in cavum thoracis, unde respiratio difficillima, phaenomena empyematis (1188. N°. 4.) Tum respiratio pessima; consumptio omnis sanguinis; chylique in pus; nutritivi praeparatio sublata; solidorum consumptio fere integra; febris hectica cum pulsu parvo, languido, calore ad superiora acri, genis rubentibus, facie Hippocratica; anxietas inexplicabilis circa vesperam plerumque; sitis magna; sudor nocturnus ingens; pustulae rubrae; pedum, manuumque inflatio a parte affecta; debilitas summa; vox rauca; capillorum defluuium; pruritus toto corpore, cum pustulis aquosis, diarrhoea flava, foetida, purulenta, cadauerosa, frequens, tenesmodes, debilitans; sputi suppressio; mors. Unde regulae hae perspiciuntur.

1207. 1. Phthisis haereditaria omnium pessima, nec sananda, nisi cum praecautio-
ne haemoptoes.

2. Phthi-

2. Phthisis ab hæmoptoe per vim externam, sine vitio interno præexistente, leuissima est, cæteris paribus.
 3. Phthisis (2.), in qua subito rumpitur vomica, expuitur pus album, coctum, æquale, facile, respondens copia vlceri, sine siti, cum appetitu, digestionem, secretionem, excretionem bonam, difficulter quidem, tamen sanari potest.
 4. Phthisis ab empyemate insanabilis.
 5. Sputa graua, solida, olentia, dulcia, cum signis vltimis (1206.), desperata.
1208. Postquam vomica iam facta in pulmone, indicatio oritur medica, eam ilico maturare, rumpere: quod fit victu lacteo, motu equitationis, vapore tepido, expectorantibus: vbi rupta, tum
1. Sanguinem munire contra infectionem purulentam oportet.
 2. Vlcus quantocius euacuare pure, & labia abstergere, consolidare.
 3. Huiusmodi in corpus ingerere, quæ minimam requirunt vim, vt per pulmones fluere, ibique subigi queant, tamen nutrire apta, & puris refectioni inepta.
1209. Primæ indicationi satisficit ope medi-

medicaminum leniter & grate acidorum, falsorum, herbarum vulnerariarum, balsamicorum lenium, omni forma, magna copia diu vsurpatorum.

1210. Alteri vero per medicamina liquida, diuretica, tussim mouentia, interna, externa, motum, equitationem, rusticationem expellendo; tum ope abstergentium balsamicorum internorum, exter-norumque depurando; atque ope consolidantium paregoricorum consolidando.

1211. Ad tertiam indicationem ptisana, iuscula, lacticia spectant.

1212. Curatio vero huius morbi palliativa maxime spectat tussim, anxietates, alui fluorem.


1213. Quibus occurritur diæta (1211.); opiatís caute adhibitis, liquidis calidis.

PHTHISES ALIAE.

1214. **V**t ab vlcere pulmonis, ita hepatis, lienis, pancreatis, meseræi, renum, vteri, vesicæ, &c. phthisis produci potest, cuius cognitio, prædictio, effectus, curatio, palliatio facile ex iisdem fontibus petitur ab eo, qui visceris

Gg

sceris cuiusque effectus naturales perspetos habet.



IN PHTHISI PVLMONALI.

SECT. 1200. N. 2.

Rec. *Conseru. ros. rubr.* vnc. iij.
Bol. Armen. læuigat. drach. ij.
Syrup. Myrtin. q. s. vt F. conditum.
Capiat drach. j. *omni bihorio.*

Rec. *Fol. tenerior. plantagin.* vnc. iij.
Flor. papauer. rhæad. vnc. jss.
Semin. plantag. rec. vnc. j.

M. S. A. cum f. q. *sacchari*, vt
F. Conserua. *Dosis vt supra.*

Rec. *Fol. acetosæ* m. ij.
In feri lactis lib. j. decocti, & expressi,
Vnc. j. bibatur omni hora diei.

Rec. *Rad. Tormentill.* vnc. ij.
Pentaphylloidis argentinae m. iij.
Flor. Pentaphylloid. rubr. palustr. vnc. j.
Semin. contus. acetosæ vnc. ss.
Cortic. tamarisci vnc. ij.

Cum aq. decoct. spatio $\frac{1}{4}$ hor. lib. iv. admisce *Syrup.*
Myrtin. vnc. ij.
Bibat vnc. ij. *omni bihorio diei.*

Balsamica lenissima.

Rec. *Amygdal. dulc.*
Nucleor. cocos,
Pistachior.

Semin. papau. albi, ana vnc. iv.

Accurate contusis S. A. sine multo igne exprime oleum,
Huius



Huius Ol. drach. j. bibatur omni biborio, vel quadrihorio, cum regimine.

Rec. *Terebinth. nativ. vnc. ss.*

Glycyrrhiz. q. s. vt

F. massa pil. formandis idonea.

Capiatur vna gr. iv. omni quadrihorio.

Vel.

Rec. *Terebinth. nativ. vnc. ss.*

Gumm. tragacanth. pulcrif. drach. v.

Amyli q. s. vt F. Massa, in eisdem usus.

Balsamus Lucatellæ. Capiat drach. ss. ter quotidie, vacuo ventriculo, superbibendo vnciam j. mulsæ sequentis.

Mulsa balsamica.

Rec. *Flor. purorum, recentium, Beronitæ,*

Hyperici,

Paralytiæ, ana pug. j.

Cum aq. calida fiat infusio, vase clauso, spacio semihorii, tum infusi puri lib. jss. admisce

Mellis Massiliensis vnc. ijs.

SECT. 1200. N. 3.

Rec. *Aquæ puræ lib. ij.*

Lactis recens mulsæ lib. j. M.

Hoc solo utatur pro potu, quantum libet.

Rec. *Lactis recens mulsæ lib. ss.*

Panis biscocti vnc. j.

Sacchari drach. ij. Cruda misce.

Sumatur quater quotidie, nec utatur alio cibo.

Rec. *Lapid. Cancror. drach. ij.*

Sapon. Veneti drach. ss.

Sacchari perlati drach. ij.

M. F. pulu. diuid. in xij. dof.

Capiat semper vnam ante usum lactis cum pane.



SECT. 1209.

Rec. Oxymell. simpl. vnc. iv.
 Tart. Vitriolat. drach. j.
 Syrup. s. rad. aperient. vnc. ij.
 Aq. stillat. fermentatæ Absinthii,
 Card. bened.
 Hyssopi, ana vnc. iv.

M. Bibat. vnc. iij. omni bihorio.

Rec. Lignor. trium santalor. ana vnc. j.
 Sassafr. vnc. jss.

Rad. Chinæ,
 Sarsaparill. ana vnc. iij.
 Flor. Centaur. min. vnc. ss.

Cum aq. decoct. vase clauso S. A. spatio $\frac{1}{2}$ horæ, adde
 Glycyrrhiz. decortic. vnc. j.

Ebulliant denuo parum: dein decocti lib. iv. exhibe.

Rec. Rad. Caryophyllat. montan. vnc. ij.

Apii,
 Bardanæ,
 Eryngii,
 Graminis,
 Liquiritiæ,
 Mei Athamant.
 Petroselini,
 Phu,
 Rubiæ tinctor. ana vnc. j.

Fol. Agrimonie,
 Artemisiæ,
 Capill. Veneris,
 Chamædryos,
 Chamæpitrys,
 Hyssopi,
 Parietariæ,
 Scabiosæ,

Tuss.



Tussilaginis,
Vrticæ,
Charophylli, ana m. j.

Semin. Apii,
Hyperici,
Pæoniæ, ana vnc. j.
Flor. Betonicæ,
Hyperici,
Centaur. min. ana pug. j.

Ex his vel quibusdam horum F. decoctum S. A.
Cuius vnc. iij. bibantur omni trihorio.

Rec. *Myrrhæ, tenuissime contritæ, drach. ij.*
Spermat. ceti drach. iv.

Accurate trita permisce
Terebinth. nativ. vnc. fs.

Admisce
Pulueris Olibani q. s. vt

F. Massa formandis Pil. apta.

Capiat gr. iij. omni trihorio.

Rec. *Balsam. Peruvian. albi,*
Copayb. albi, ana drach. ij.
Vitell. ouor. vnc. fs.

Accurate subactis adde
Pulu. Glycyrrhiz. q. s. vt F. Massa Pilularis.

Capiat gr. ij. mane, meridiæ, vesperi.

Rec. *Mastiches,*
Myrrhæ,
Olibani, ana drach. ij.

F. Pulu. subtilis, interim fluat in fictili ad ignem lenis-
 simum,

Succi glycyrrhizæ, inspissati,
Terebinthinæ purissimæ, ana vnc. fs.

Tum admisce puluerem præscriptum, sub finem addendo
Balsami ex Mecha drach. j.

F. Massa copioso Glycyrrhizæ puluere respergenda.



*Sumat quotidie, quater, vacuo ventriculo, massulam granor.
vj. suberbibendo vncias vj. sequentis potus.*

*Rec. Fol. tenerior. Agrimon.
Betonicae,
Botryos,
Hederae terrest.
Scabiosae,
Tussilaginis,
Veronicae, ana vnc. fs.*

Glycyrrhizae vnc. jfs.

F. Infusum, sine ebullitione, in magno calore, vase accurate clauso, cum aquae lib. ij.

SECT. 1210.

Vid. Omnia praescripta §. 1209.

*Rec. Fol. recent. Veronic. maris m. jfs.
Parietar.
Rutae, ana m. j.
Valerian. hortensf. m. fs.*

Semin. papauer. contusf. vnc. iij.

Rad. Petroselin. vnc. vj.

Cum aq. S. A. decoct. lib. iv. adde

Syrup. capill. veneris vnc. ij.

Bibat vnc. iv. omni trihorio.

*Rec. Pilul. Cynoglossf. drach. j. F. Pil. gr. iv.
Vesperisumat pilulam vnam harum.*

*Consolidans paregoricum, dandum ubi iam
desinit pus cum leuamine.*

*Rec. Fol. recent. Borragin.
Symphyti min.
Maluae, ana m. j.*

Flor. Papau. rhæad.

Verbasci,

Hyperici, ana vnc. j.

Rad.



Rad. Symphyt. maj. vnc. ss.

Althææ, vnc. j.

Semin. contus. Melon.

Papau. alb. ana vnc. j.

Cortic. Peruvian. drach. vj.

Cum aq. decoct. lib. jv. exhibe;

Bibaz vnc. iij. omni quadrihorio.

HYDROPS.

1215. **Q**uando serum aquosum extra vasa fufum, & cauitatibus receptum est, vel & stagnans alicubi vasa sua nimium distendit, hydrops vocatur.

1216. Qui ideo obtinere potest vbi-
cunque huius feri vasa, id est in omni corporis habitu, atque in parte qualibet singulari.

1217. Hinc hydrocephalus, colluue facta inter integumenta ipsa externa; inter hæc, & cranium; inter cranium & cerebri membranas; inter membranas ipsas; harumque duplicaturas; inter has & cerebrum; inter cerebri plicas; in cauitatibus ipsis; sine morte tamen subita.

1218. Facile cognoscitur posterior species incurabilis, reliquæ leui inustione, terebratione, punctura, prudenter,

Gg 4

lente

lente adhibitis, simulque hydragogis & roborantibus internis curatur; vel externis discutientibus dissipatur.

1219. In thoracis hydrope, qui ex variis locis colligere lympham valet, eadem fere signa, quæ empyematis, sed observatio causæ antecedentis discrimen exhibet; paracentesis sanat hunc, vna adhibitis his, quæ causæ aduersantur eius.

1220. Deprehensus itidem pulmo, accumulata, effusa, inter sinus magnos recepta lympham, nunc in hydatidas, nunc in vomicas hydropicas incidisse; morbus sane difficilis cognitu, curatuque, nisi alia signa præsentia fortuitam huic hydropis curationem petant.

1221. Quin & arteria aspera anteriori, & conspicua parte, quacunque vi lympham stagnantem colligens, bronchoceles sæpe speciem exhibet; quam cognitu facilem, punctura, discutientibus, auerentibus aggredi licet; si observatur, ut auctores scribunt.

1222. Simili morbo cuiuslibet glandulæ folliculus occupari, simili modo sanari potest.

1223. Notabilis itidem hydropis species

cies ouaria mulierum sæpe occupat, qui morbus vt plurimum steriles, annosasque mulieres occupat, difficulter cognoscitur, & vix sine inciso cadauere; curatur vero nunquam, sed transit sæpe in asciten.

1224. Imo in ipso cauo vterino, clauso accurate eius ore interno, sæpe colligitur tanta aquæ copia, vt integrum abdomen mentiatur asciten; morbus itidem difficulter cognoscendus ob signa fallacia grauiditatis; curabilis laxatione oris vterini per fomenta, vapores, vterina adhibita.

1225. Quoties in toto habitu pinguitudinis subcutaneæ eadem lymphæ stagnat, vel effunditur, hydrops oritur ἀνά σάρκα, ὑπό σάρκα, λευκοφλεγματία: qui & circum abdomen, & circa scrotum.

1226. Dum eadem aqua in duplicatura peritonæi, in cauo abdominis, inter peritonæum & viscera abdominis, aut in dilatatis glandularum cauis: vasisque in abdomine contentis, colligitur, ἀσκίτης appellatur, vt & τυμπανίτης, si vapore rarefacto turget, ab aqua, pure, ichore, aëre, clausis hic, fotis, putrefactisue.

1227. Hydrops testium dictus, est 1.

Gg 5

scro-

scroti; pertinet ad (1225.); noscitur sensu tactus; pelluciditate conspicua; vestigio remanente impressi digiti. 2. sacci ex producto peritonæo in hernia vera orti: fit in ascite (1226.) valido: noscitur signis ascitis, tympanitidisue prægressis; evanescencia per pressionem, decubitus supinum declivem, euacuationem aquæ ex abdomine; subito sæpe augmento & decremento mali, sine causa manifesta; figura tumoris farciminali per inguina ex scroto. 3. inuolucris vaginalis testis: fit, si humor ibi secretus non resorbetur suis vasis, sed stagnat, accumulatur, vesicam suam distendit in immensum sæpe; aut si ruptis, obstructis, vasis, itidem colligitur; inflammatio, suppuratio, ichorosa collectio, sæpe huius speciem mentiuntur. Cognoscitur tumore non elastico, non cedente, duro, lente producto; absentia signorum primi & secundi hydrophis testium; figura tumoris rotunda, vel ovali saltem; pelluciditate apparente, si circumtenso scroto, saccus collectionis candelæ lucenti expositus cernitur clarus: an vero, præter hos, inter tunicam nerveam & ipsam testis substantiam, aut in ipsa

ipsa huius substantia similis sit tumor, haud ita obseruatur, a præcedenti specie vix dignoscitur, nec forsitan, nisi extirpando, curatur. Vocantur mala hæc, ὑδροκῆλαι, hydrocelæ.

1228. Obseruatum fuit, hos omnes morbos produci ab omni causa, quæ valet liquidum serosum 1. ita coercere, vt redire nequeat in venas, sed extensis in vasis stagnet. vel 2. ipsa vasa rumpat ita, vt intra membranulas effundatur. 3. vasa reducentia a cavitatibus ita obstruat, & liquida in cavitatibus deposita tam parum moueat, vt non exhalent, nec resorbeantur.

1229. Quæ causæ obseruatæ sunt imprimis, dispositio gentilitia: potus nimius frigidaë subitus, neque vomitu, neque aluo, neque sudore, vel vrina, calore motuue excitatis, excretus: morbi acuti, imprimis ardentissimi, siue cum siti potuque inexplibili, siue sine his: dysenteria lienosa diu permanens: omnes pertinales viscerum obstructions, vt scirrhi hepatis, lienis, pancreatis, mesenterii, renum, vteri, intestinorum: icterus: quartana sæua & diuturna: lenteria: diarrhoea;

rhœa: dysenteria diuturna: cœliaca: empyema: phthoe, podagra: euacuationes quæcunque nimix, maxime sanguinis arteriosi: haustus acrium, fermentatorumque liquidorum: victus tenacium, durorum: hydatides ingentes, plures, in cauo abdominis pendulæ: & plura similia, vt melancholia, scorbutus &c.

1230. Effectus adeoque, & morbi progressus hic fere est: tument pedes, maxime vesperi, sensim hic augetur tumor increfcitque: tum tumor abdominis quotidie increfcens: huius extensi sonus in tympanitide, si percutitur; strepitus fluctuantis aquæ in moto corpore in ascite ab aqua libera fluente in cauo abdominis; at in ascite ab aquis clausis in suis cistis, fallit: dyspnœa: sitis: grauitas: torpor: alius dura: vrina parca: febricula lenta: sudor nullus: macies eo maior, quo partis affectæ maior intumescencia: tum femorum, scroti, cutis abdominalis aqua intercus: hydatides: aquæ, in loco calido, clauso, stagnantis, putrefactæ acrimonia: vlcera: gangrænæ: hæmorrhagiæ narium: exomphali: viscerum sphacellus: mors.

1231. Hydrops curandus ergo indicat. 1. Liberum conciliare fluorem lymphæ: siue fuerit aqua, serum biliosum, ichorosum, sanguinolentumue. 2. Aquas iam iam in cauitates effusas inde educere. 3. Labem debilitatorum viscerum tollere, siue ea causa, siue hydropis fuerit effectus.

1232. Fluor conciliatur lymphæ, tollendo causas hunc impediētes, quæ 1. vis vitalis minus fortiter circumagens; 2. vasculorum compressio, disruptio, obstructio. 3. liquidī nimia tenacitas.

1233. Ad primum (1232.) faciunt cardiaca dicta, roborantia, & stimulantia; quæ, si sitis valida non vrget, petuntur ex aromaticis, salinis, oleosis, calidis forma electuarii, misturæ, vini medicati, cereuiis medicatæ, pilularum, decoctorum, syruporum, tabellarum, facillime varianda.

1234. Si ingens vexet sitis, causa fuerit calida, morbus cum febre calida, quod sæpe solet fieri, ad primum (1232) faciunt cardiaca dicta reficientia, acida grata, & leniter aromatica.

1235. Vtroque casu (1233. 1234.) prodest frictio, motus, calor.

1236.

1236. Ad secundum scopum (1232.) indaganda causa vasa arctans, obstruens, rumpensue, quæ tollenda, si fieri queat, (1229.), vel emendanda sæpe aquis mineralibus.

1237. Liquidi nimia tenacitas soluetur in calido, frigidoue hydrope (1233. 1234.).
1. per ea remedia, quæ ibidem data. 2. per alcalinos maxime sales, tam volatiles, quam inprimis fixos. 3. ope mercurialium, antimoniatorumque, & venereorum medicaminum arte chemica rite præparatorum, & sagacitate medica bene exhibitorum.

1238. Aquæ in cauitates congestæ inde educuntur. 1. paracentesi. 2. emissariis paratis nouis. 3. vrinæ via. 4. vomitu. 5. purgatione alui. 6. dissipatione.

1239. Si causa hydropis ascitis est recens, extrinsecus cito applicata; si vires integræ, corpus iuuenile; si viscera bene constituta, neque alio morbo perditæ; si aqua nondum putrida, neque diu in loco stagnauerit, statim instituenda paracentesis.

1240. Quæ fiat 3. pollicum longitudine infra vmbilicum, & eadem distantia a linea

a linea alba, mensura in corpore sano intellecta, in latere a fonte hydropis auerso, punctura facta ope instrumenti idonei, cannula immissa, iterumqueeducta, aquæ copia parua, quotidie bis, emissa, ad minimum impensis 15. diebus in euacuando, interim vtendo præscriptis (1233. ad 1238.): aut & recentiori methodo; qua abdomen circumductis linteis premitur pro proportione eductæ aquæ: ne laxa, & pendula, viscera & vasa fluctuent in inani post euacuationem abdomine.

1241. Si conditiones (1239.) absint, vel sint contrariæ, paracentesis mortem accelerat.

1242. Emissaria ferro candenti, medicamentis causticis, vesicantibus, lanceolis, filis facta, in parte carnosa, loco decliui, sæpe admodum profunt; maxime si aperta teneri permittit morbi genius.

1243. Per vrinas euacuati hydropis quum citentur plurima exempla, & hanc viam tentabimus præeunte natura, vtendo salibus vrinosis, fixis, compositis, specificis animalibus, vitriolatis, solutisue metallis, specificis renibus.

1244. Per vomitus soluuntur cuncta
tena-

tenacia, concutiuntur obstructa, expelluntur stagnantia, vnde mirabiliter in hoc morbo profunt.

1245. Sed fortia dari, sæpe repeti, & sine longa mora intermedia se mutuo excipere debent.

1246. Vt plurimum eadem valide solent euacuare aluum, vnde duplici effectu, quin sæpe & tertio, diuresi, profunt.

1247. Per aluum seri eductio fit per vsum largum, sæpe & breuiter repetitum summe purgantium, variis formis, maxime liquida, assumtorum.

1248. Dissipatur calore foci, hypocausti, furni, arenæ, solis, salis, fimi, excitato sudore, vel diaphoresi.

1249. Tum maxime pertinaci abstinencia a potu, victu panis biscocti, cum pauco sale, & patuxillo vini oleosi.

1250. Tertiæ indicationi (1231.) satisfaciunt imprimis vina chalybeata, chalybs, & roborantia leniter adstringentia, debita dosi, & in tempore vsurpata; victus ficcus; vinum meracum, vetus, adstringens, motus.

1251. Tympanitis iisdem mediis, eadem methodo tollitur, si ortum duxit a
ra-

rarefacto vapore humoris extrauafati, & putrefacti; tum enim, caufa ablata, tollitur; fi vero ortum duxit ex aëre per membranas intestinorum putrefactorum perforatas in caua delapfo, retroire non potente, fed calore corporis rarefcente, tum cuncta cito putrefiunt, aëre iuuante, malumque ex pofita caufa eft fere femper infanabile: vnde hydrops ficcus humido longe magis immedicabilis habetur: punctura fæpe folatio, raro fanatione, fufficit; fasciæ post puncturam locum habent.

1252. Hydrocele prima (1227.) fanatur, fi 1°. hydrops anafarca, cuius soboles eft, fanatur (1231. ad 1238.). 2°. per remedia (1248.) 3. fummis difcutientibus, & corroborantibus fimul, ipfi fcroto applicatis, perque calorem externum affiduo excitatis in maiorem motum. Secunda autem species (1227.) curabitur optime 1. fi hernia radicali chirurgica cura perfanatur. 2. ablata afcitis materie (1238. ad 1252.), & occlufo fonte. 3. tum per machinas comprimentes preffo loco exitus, vt in herniis per ligamenta: raro autem femel factus hydrops hic fanatur integre. Vl-

Hh

tima

tima tandem (1227.) sanabitur. 1. datis hydragogis fortibus, sæpe repetitis, dum interim victus est exsiccans. 2. validissimis discutientibus & corroborantibus. 3. paracentesi scroti. 4. Causticis, & suppuratione.

1253. Ex quibus denuo apparet, in sanatione hydropis plus difficultatis oriri ab indole aquæ in stagno putrefactæ, quam quidem ab ejus causis primis. Cur eductis his aquis acceleratur gangræna partis prius innatantis? Cur educta subito ex thorace, vel abdomine, hæc aqua, mors, aut animi deliquium summum? Cur tanta in hydropicis sitis? & quid illa notat? Cur acida sæpe adeo in hoc morbo profunt? Cur eductis per euacuantia valida plurimis simul aquis tumor abdominalis idem, vel & maior videtur? opio autem dato subsidet? Cur fasciæ hic tanti usus? & quo usque?



IN HYDROPE.

SECT. 1233.

Rec. Rad. Imperator.

Aristoloch. utriusque,
Zedæar.

Siler.



Siler. montan. ana vnc. j.

Zingib. drach. vj.

Flor. Centaur. minor. vnc. ij.

Rorismar. vnc. j.

Gratiol. Germanor. drach. iv.

Baccar. Lauri,

Iuniperi, ana vnc. jss.

Thymi,

Serpilli,

Mari Syriaci, ana vnc. j.

Semin. Absinth.

Tanacet.

Santon. ana vnc. j.

M. F. S. A. omnium Pulu. tenuis, tum

Rec. *Pulu. præscript. vnc. vj.*

Vini Gallici meri lib. iv.

F. S. A. Vinum Medicatum.

Bibat vnc. ij. quater de die, vacuo stomacho, cum regimine.

Vel.

Rec. *Pulu. præscript. vnc. ij.*

Conseru. anthos. vnc. j.

Syrup. artemis. Fernellii q. s. vt

F. Conditum

Dosis drach. ss. omni quadriborio.

Aut.

Rec. *Pulu. præced. vnc. xij.*

Cereuisia meracioris $\frac{1}{4}$ tonnae.

F. Cereuisia medicata, in usus quozidianos.

Quin.

Rec. *Pulu. eiusd. drach. iv.*

Vini albi generosi. vnc. viij.



F. S. A. Infusio. *Bibat unc. j. omni biborio.*

Huc, Elixiria propriet.

Sales vol. Oleofi.

- - - - - Aromatici.

Sp. vol. acres olcofi.

Sp. - - - - - aromatici.

- - - cephalici.

matriciales.

stomachici, &c. pertinent.

Vid. §. 75. N. 5. §. 54. N. 4. §. 135.

SECT. 1234.

Rec. Ol. stillat. cortic. Citrei.

Aurant.

Cinnam. ana gutt. iij.

Flor. Laucnd.

Juniperi, ana gutt. ij.

Cum Sacchari drach. vj.

F. S. A. clæofaccharum, quod adinisceto dcin

Rob. Samb.

Iuniperi, ana vnc. iij.

Sp. Salis drach. j.

Aq. stillat. cortic. Citrei,

Aurant.

Cinnam. ana vne. ij.

Menthae vnc. x.

Capit vnc. j. omni bihorio.

Rec. Succi rec. expressi, ex to-
ta rec. herba confissa,

| | | |
|---|-----------|---------------|
| [| Fumaria, | } ana lib. j. |
| | Cichorei. | |
| | Taraxaci, | |
| | Acetosae, | |

Cremor. Tartari lib. fs.

Leni igne decoque ad $\frac{1}{2}$; dein depurati huius decocti
unc. x. admisce

Rob.

Rob samoluci vnc. x. *Capiat* vnc. fs. *omni biborio.*
 Rec. *Sp. Nitri dulcis* drach. iv.
 Cochleariæ drach. vj.
 Syrup. Cichorei cum rbeo,
 ſ. rad. aperient. ana vnc. j.
 Vini Rhenani lib. j.
 M. *Bibat* vnc. j. *omni biborio.*

SECT. 1237. N. 3.

Rec. *Turbith. mineral.* gr. fs.
 Zingib. albi gr. x. M. F. *Pulu.*
Mane ſumendus alterno die, ex pauſillo pulpæ pomi
et ſti.
 Rec. *Mercur. præcipit. rubri* gr. j.
 Nucis myrift. gr. vj. M. F. *Pulu.*
In uſus eoſdem, ſumendus ut prior.
 Rec. *Mercur. ſublim. dulc.* gr. vij.
 Cortic. Magellan. gr. viij.
 M. F. *Pulu.* *In uſus eoſdem.*
 Rec. *Tartari emetici* gr. fs.
 Elæoſachari citrei gr. vi.
 M. F. *Pulu.* *Tertio quoque die ſumendus.*
 Rec. *Emetici mitiſſimi, ex Antimon.* p. ij.
 Nitri p. v. *detonando præparati,* gr. iv.
 F. *Pulu.* *Omni mane aſſumendus.*
 Rec. *Limatur. cupri* gr. x.
 Sal. vol. oleoſi drach. vj.
 M. F. *Tinctura cærulea.*
Capiat gutt. xij. ter de die, vacuo ſtomacho, ex Syrup. ſ. rad.
aperient. vnc. fs.

SECT. 1243.

Vid. 334.

Hh 3

SECT.



SECT. 1245.

- Rec. *Vini emetici vulg.* vnc. ijs. *Vna dosi.*
 Rec. *Tartari emetici* gr. vj. *Vna dosi.*
 Rec. *Turbith mineral.* gr. vij. *Vna dosi.*
 Rec. *Succi recent. expressi cortic. medii Sambuci* vnc. j.
Syrup. Violar. vnc. fs. *Pro vna dosi.*
 Rec. *Fol. Soldanellæ marin.* vnc. j.
Comedat vna vice.
 Rec. *Elaterii* gr. iv.
Syrup. de baccis Rhamni-cathartici vnc. j.
 M. *Pro vna dosi.*

SECT. 1247.

- Rec. *Resin. Ialapp.*
Scammon. ana drach. j.
Fol. fennæ pulu.
Semin. contus. carthami, ana drach. iv.
Sp. vini rectific. lib. j.
 F. S. A. *Tinctura,* cui puræ admisce
Syrup. rosar. solut. cum fenna vnc. vj.
Bibat vnc. j. *mane.*
 Rec. *Lunæ purgatiuæ Boyleanae,*
Micæ panis, ana gr. iv.
M. F. Pil. gr. ij.
Capiatur vna omni semiborio, donec incipiat purgatio.

SECT. 1250.

- Rec. *Limaturæ ferri rec. non rubigin.* vnc. ij.
Cortic. Peruvian.
Magellan. ana vnc. ij.
Rad. Rhei exsiccatae vnc. fs.
Vini Rhenani generosissimi lib. ij.
 F. S. A. *vinum medicatum.*
Dos. vnc. ij. *ter de aë, vacuo stomacho.*

SEC

SECT. 1252. N. 2.

Rec. Rad. elect. Bryon.
Ialapp.

Fol. Ruta,
Absinthii,
Cinaræ hortens.

Flor. Melilot.
Centaur. min.

Bulb. Ceparum,
Allior. ana vnc. ij.

Cum aq. comm. q. s. decoct. S. A. in cataplasma sub finem admisce

Galbani, in vitello oui s. a. subacti, vnc. ij.

Farin. lini vnc. j.

Ol. lini drach. iv.

Sal. ammon. drach. iv. M.

Rec. Sapon. Venet. drach. iv.
Sp. Vini theriacal. vnc. xij.

M. accurate pro Fomento.

Cum laneis pannis applicando.

Rec. Sal. marin. decrepit. siccissimi, calidi, tenuissime tri.
ri, q. s.

Intra lintea confusa applicetur, renouando simulac maderit.

Rec. Benzoin,
Olibani,
Sarcocollæ,
Resin. Guaiaci, ana vnc. ss.
Camphoræ drach. ss.
Masticbes vnc. j.
Salis Ammoniaci scrup. ij.

M. F. Pulu. Cuius incensi vapor excipiat nudo scroto, dein panni lanci fumo hoc vaporosi, calidi, superapplicentur.

Hh 4

PODA-

P O D A G R A.

1254. **P**odagra vocatur dolens admodum ægritudo circa ligamenta ossium pedis, & circa iuncturas horum, vere & autumno maxime reuertens.

1255. Qui, semper idem, quacunque demum causa ortus, ubi naturæ suæ decursum non turbatum absoluit, sequi solet ætatem matura maiorem triginta, & plurium, annorum; sexum virilem: ingenium acutum, huius exercitia durissima & protracta, maxime nocturna; victum opiparum; vina acidula, alba, potum generosum, copiosumque, maxime noctu; venerem præmaturam nimis cultam; corpus magnum, crassum, plenum; acidorum usum nimium; pedes sudantes subito refrigeratos, in humidis caligis sudantes, hinc venatum, equitationem in frigore; hæreditatem in feros nepotes, per parentem sæpe nondum podagricum, sed tantum labe genitali damnosum genitæ proli; contagium.

1256. Tempus, ætas, & reliqua vice causæ fungentia, (1255.) tum & phænomena, initium, progressus, effectus, finis huius

ius morbi, simul comprehensa, causas medicas hius mali demonstrant.

1257. Repetitos enim eius, latentis diu, in femine nondum germinante, paroxysmos præcedit cruditas, ructus, grauitas, torpor flatulentus, alius adstrictior, febricula, sudor pedum solitus interceptus, horum varices, anni tempestas, mutatio cœli.

1258. Accelerat, & inexpectatos accersit vitium quodcunque admissum in sex rebus non naturalibus; vnde cruditas oritur; hinc venus immoderata; lubricatio; pergræcatio; asparagorum, lardi & similium comestio; defatigatio, animi affectus; purgatio medica alui sola; aër humidus, frigidus, procellosus; hæc adeo podagricis inimica.

1259. Locus, quem primo, quem regularis aggreditur, semper pes; huiusque illæ inprimis partes, quas difficillime suum peruadit liquidum; vt periosteum, tendines, nervos, membranas, ligamenta; quæ a corde remotiores; & maxime pressæ.

1260. His (1259.) demum obstructione, infarctu, tumore occlusis; vel mate-

ria morbi quacunque vi dispersa in alia loca, alias aggreditur partes, ita tamen, ut eadem ibidem loca, easdem partes, obsideat (1259.).

1261. Dolor adest tensivus, dilacerans, coarctans, increvens sensim, decrevens iterum, cum madore, rubore, tumore; finitus diaphoresi, fotu lecti, pruritu, desquamatione, vel abiens in cretam, calcemue, vasa rumpentem, articulorum vincula, formam, motum, usum priuantem.

1262. Ex quibus cunctis liquet, causam proximam huius mali esse vitiatam indolem minimorum, adeoque nervosorum, vasculorum in corpore; tum etiam liquidum, quod nervosas partes alluit.

1263. Et quidem liquidum peccans hic acrimonia, & maiore tenacitate; solidum nimia vasculorum angustia, & rigiditate.

1264. Vnde in locis a cerebro remotissimis, motui maxime resistentibus ob soliditatem, duritiem, exercitium, pondus incumbens, primo se manifestat.

1265. Eius vitii autem (1262. 1263.). origo proxima in indigestione viscerum, non

non attenuantium, assimilantiumque fatis assumpta in indolem requisitam in liquido nervoso, id est ultimæ elaborationis ultimo effectû, spiritui vitæ, & radicali feminis proliferi materiæ, hinc se innectit clanculum.

1266. Cuius (1265.) ratio iterum deducitur ex causis remotis (1255. 1258.).

1267. Supponit itaque omnes fere coctionum vitiatas functiones ad producendum hoc malum (1265.), & quidem vitio in maioribus vasis, liquidisue vix sensibili.

1268. Adeoque curatio impossibilis, nisi per medicamenta, quæ integre hæc vitia emendare queant, & subtilissimum peccans rite corrigant. Vnde incurabilis fere hæctenus habita, nisi paucis empiricis.

1269. Hæreditaria, & tophacea, curatu omnium difficillimæ.

1270. Ex iisdem deducitur, venæ sectionem non attingere mali materiam, sedem, causam: prodesse tamen aliquando casu, reuellendo parum, & vires vrgentes minuendo (1257.).

1271. Neque purgationem per superiora,

riora, inferioraue tantum præstare, quantum vulgo sperari solet; excitare sæpe tumultum liquidi neruosi, subducere liquidiora, labefactare virtutem expellentem.

1272. Sudorifera ex arte instituta plus proficere.

1273. Nihil autem in hoc morbo damnosius, quam impedire materiæ podagricæ iam adultæ (1263.), nec alio modo tuto eductæ, vel correctæ, defluxum ad sua loca (1259. 1260.), maxime quidem dolentia, minime tamen periculosa. Tum enim retenta apoplexias, paralyfes, deliria, debilitates, sopores, tremores, conuulsiones vniuersales, si in cerebrum introiuit; asthma, tussim, suffocationem, si in pulmones; pleuritidem sæuam conuulsivam, si in intercostalia & pleuram; nauseas, anxietates, vomitus, ructus, tormina, spasmos viscerum, si in viscera abdominalia; & ita incredibile quot morbos creat, sæpe subito lethales: quos frustra exquisitissimo remedio, vel methodo, fonte ignorato, tractes: nec enim cedunt, nisi podagræ recenti paroxysmo, eoque sæuo, resuscitato. Contingit id damni
ex

ex applicatu incauto narcoticorum, refrigerantium, constringentium, incrassantium; vel ex omni remedio debilitante, euacuante, rursus reuellente, suffocante; hinc missio sanguinis, purgatio sursum, deorsumue, emplastra, cataplasmata modo dicta; opiata omnia, id efficiunt; vt & spontanea senii decrepiti debilitate ingruente; vel partibus omnibus extremis ita obstructis, exsiccatis, corruptis, destructis, vt mala materies per eas amplius ire nequeat: hinc liquet quæ, quibus cum symptomatibus, & cur, podagricis, ex hoc morbo mors.

1274. Proinde curatio, quam contemplatio mali, & experientia commendauit, absoluitur 1. restitutione vigoris in visceribus perditis (1265.). 2. ablatione liquidi iam corrupti fluentis in vasis, vel stagnantis ad loca (1262. 1263.).

1275. Ad primum (1274.) spectat α. Vsus plantarum aromaticarum, amararum, antiscorbuticarum, maxime si per se vsurpentur solo melle exceptæ. β. vsus salium lixiuiosorum fixorum sæpe iterata, parua dosi, diu continuata, assumtorum. γ. Tum cibi, potusque nutrientes, facile dige-

digerendi, leues. δ . Exercitio magno, continuato, equitationis in aëre puro, tum frictionibus, motibusque partium sæpe iteratis. ϵ . Somno maturo, longo.

1276. Ad alterum (1274.) vsus conducit. 1. salis cuiuspiam volatilis parua dosi diu assumti, mane ante quam quis surgat, cum largo haustu decocti cuiusdam lenis, sudorisque, vel madoris, expressione leui per horam. 2. frictio calida, cum linteis siccis, partium. 3. vsus purgantis, ferofi, vna cum mercurialibus acuti, & addito circa vesperam potu opiato sedante.

1277. Quibus equidem remediis, & curandi methodo, multum sæpe proficitur, etiam in tophacea.

1278. Ad summam doloris in loco sæuitiem temperandam, vrgente summa necessitate, opiatīs internis, copioso feri lactis, similisue, potu calido, externis emollientibus, anodynīs, calidis, quin verberatione cum vrticis, inunctione balsami sulphuris terebinthinati, inustione cum lino, vtendum sæpe est.

1279. Cæterum non aliter vsurpanda, quin summopere metuatur citior induratio loci affecti, mobilitatisque iactura.

1280.

1280. Maximum vero cuique remedium, quod oppositum illi causæ, unde originem duxerat morbus (1255. 1258.).

1281. Si autem materiæ podagricæ introuersæ signa adsint (1273.) sine vlla mora tentanda est eius expulsio in iuncturas: ergo statim applicentur femoribus larga vesicatoria; locis, dolere assuetis, fomenta aromatica salina tepida; fiat deambulatio, vel motus magnus in rheda; sumatur larga copia decocti alicuius aromatici sudoriferi, vel, hoc non iuuante, vini rhenani generosi; his dein factis, dolore incipiente, in calidum lectum repositus, & opertus, sudet.

1282. Quæ si quis omnia consideret, videt difficultatem summam curandi huius morbi: tum rationem, cur in renouantibus huius medelam quæsiuerint summi & medici & chemici? cur lac, & quousque sanet? an sit acor specificus cruore conceptus mater podagræ? quæ sit ratio nodi, tophi, cretæ, podagricorum? Cur miserrima sit, quæ sine tumore, podagra? cur mitior tumens? cur dolor tandem desinat in podagricis; cur, quamdiu dirissimus dolor in paroxysmis, fere-

serena, eaque longa, interualla sint? Cur cessante doloris sæuitie, dein vix vnquam integre liber sit æger? an vllum absorbens alcalinum specificum sit; quod podagram radicitus extirpet? Cur machina statica Sanctorii summa directrix & index futurorum, & faciendorum in podagra? Cæterum podagra, spiritui vitæ inhærens, in humore articulorum tenuissimo, & in semine ipso, tantum se prodit violentis effectibus.



I N P O D A G R A.

SECT. 1275. L. A.

Vid. 1233.

SECT. 1275. L. A.

Rec. *Alcabest Glauberi* vnc. j.

Sumat, omni mane, gutt. ix. ex iure vitulino.

Rec. *Ciner. Genistæ* vnc. j.

Vini Rhenani lib. jss. M.

Bibat depurati liquoris vnc. ss. omni mane.

MORBI VIRGINVM.

1283. **P**ræter omnia hæc acutorum & chronicorum genera, sunt non-

nonnulli morbi virginibus, grauidis, puerisque proprii, tum & puerili ætati.

1284. Quo tempore fœmininum corpus ad incrementum suum peruenit, in bene facta temperie plus solet conficere cruoris, quam qui vasis contineatur, vnde arteriis vterinis fluoris menstrui nomine fecernitur.

1285. Si, posito corpore in conditione (1284.), hic sanguis retinetur, oritur plethora; tarditas; grauitas; pallor; dolor lumborum, inguinum; deprauatæ functiones omnes fere naturales, vitales, animales; quæ facile deducuntur a vasis nimis pressis, liquido copiosiore, stagnante, suffocato.

1286. Ab eodem autem sic accumulato miræ sæpe parantur viæ, raris secretionibus menstruis notæ; dum per oculos, aures, nares, gingiuas, vias saliuæ, œsophagum, aluum, vesicam, mammas, cutim, vulnera, vlcera, exire viderint medici.

1287. Vel & sæpe labefactantur inde omnia viscera, oriturque partim a putredine concepta, partim a vasis læsis, infinitum morborum genus (106.).

1288. Cognoscitur hic morbus 1. ab ætate. 2. incremento corporis iam perfectio. 3. plethora. 4. signis deinde morbi subsequents.

1289. Pro solutione requirit varia remedia respectu variæ causæ.

1290. Quas inter naturalis, vel superveniens, pudendorum concretio manum chirurgi requirit debito instrumento, debito vulnere, viam facientis.

1291. Cæterum, vbi a stagnante liquido, huic conciliabitur fluor. 1. fotu, & frictu pedum. 2. apertura venæ in pede, & sanguine misso. 3. purgantibus vterinis datis. 4. emmenagogis. 5. emplastris, fomentibus, linimentis, vaporibus, calore. 6. ipsa vasa a plethora debilitata roborando per chalybeata, & adstringentia.

1292. Sublata his morbi scaturigine, solent omnia fere mala (1285. 1286. 1287.) sponte evanescere. Vel curantur ex natura & cura eius morbi, cuius imaginem referunt quam proxime: quod facile ex antedictis fit.

IN MORBIS VIRGINVM.

SECT. 1291. N. 3.

Aloe.

Myrrha.



Myrrha.
 Bryonia.
 Colocynthis.
 Gumm. Ammon.
 Bdellium.
 Sagapenum.
 Opopanax.
 Galbanum.
 Asa fœtida.

Elxir proprietatis quodcumque.

SECT. 1291. N. 4

Omnia hic supra N. 3.

| | |
|---------------|------------|
| Aristolochia. | Ruta. |
| Artemisia. | Sabina. |
| Cardiaca. | Salvia. |
| Chamæmelum. | Sambucus. |
| Iuniperus. | Serpillum. |
| Maiorana. | Tanacetum. |
| Marum. | Thuya. |
| Matricaria. | Thymus. |
| Pulegium. | |

Tum §. 75. N. 5. §. 54. N. 4.

SECT. 1291. N. 5.

Emplastra de Cumino.

Meliloto.
 Galbano.
 Baccis Lauri.
 Labdano.

Oxycroceum.

Applicata aquis pedum, umbilico & inguinibus.

Forus, ex sapone Venet. & decoct. herbarum N. 4.
 §. 1291.



Linimenta ex vnguento Martiato.

Neruino.

Enulato sine Mercur.

Agrippæ.

De Arthanita.

Olea aromatica stillatitia *vid.* §. 75. N. 5. inter stimulan-
tia; præcipue vero

Oleum stillatit. Baccar. Iuniperi.

Hyssopi.

Macis.

Maioranæ.

Origani Cretici.

Rosmarini.

Sabinæ.

Spicæ.

Tanaceti.

Succini.

Olea infusa Absinth.

Anethi.

Chamæmeli.

Nepetæ.

Rutæ.

Castorei.

Crocini.

Irii.

Lumbricor. terrestr.

V. G.

Rec. Vnguent. Martiati,

Neruini, ana vnc. j.

Olei stillatit. Baccar. Iuniperi drach. j.

Sabinæ,

Infusi Rutæ,

Castorei, ana vnc. ss.

M. F. Linimentum, in hoc casu,

Vmbilico, pubi, inguinibus applicandum.

Vapo-

Vapores, ex decocto N. 4. *utero excepti.*

SECT. 1291. N. 6.

Vid. 1250.

MORBI GRAVIDARVM.

1293. **P**ostquam grauida est fœmina plurimis afficitur malis ex sola grauiditate oriundis.

1294. Quorum nonnulla oriuntur ex sanguine menstruo secerni impedito ob clausum vterum, & fœtu tamen non potente hætenus in sui incrementum eum absumere.

1295. Alia ex ipsa mole, motuque fœtus, atque secundinarum, & aquarum, vim exercentium in partes hæce sensiles admodum.

1296. A priori (1294.) videntur pendere nausea, vomitus, prostratus appetitus, vel idem deprauatus plane, animi deliquia, vertigines, dolores summi stomachi, pectinis, inguinum, renum, mammarum, torpor, grauitas, dyspnœa, abortus.

1297. Quæ proinde pendentia ab una
li 3 causa

causa eodem remedio, sanguinis missione, tolli solent.

1298. In qua tamen instituenda, locus, tempus, copiaque, maxime aduertenda.

1299. Tum victus tenuis, motus ordinatus, potus levis, admodum profunt.

1300. Interim cardiaca aromatica, vna cum lenissimis antihystericis, vel & blandis subacidis, summi usus sunt, & efficacior.

1301. Ab incremento foetus oriri videntur eadem fere, quæ enumerata (1296.), tum difficultas urinae, & alui, hæmorrhoides, varices, inflatio pedum, vterinorumque labiorum, lapsus procliuis.

1302. Quibus quidem auxilium ferri potest aliquando remedio V. S. (1297.), vel & situ corporis pro tempore mutato, tum etiam fasciis, similibusque, atque tandem linimentis lenibus.

1303. Inter periculosissimos vero gravidarum morbos habetur fluor vterini sanguinis.

1304. Qui fere ex eo, quod placenta ab utero soluta, & arteriis plenis sanguine disten-

distendente, vteroque distento, sæpe plenioriuo arteriosus cruor emanet.

1305. Cognoscitur ex orificio vteri laxato, sanguinis fluxu magno, citato, admodum debilitante, viuo, vel grumoso, dolente.

1306. Causa huius, affectus animi vehementes, motus corporis nimii, hysterica, & emmenagoga male applicata, percussio inferioris partis abdominis.

1307. Remedia, quies animi, corporisque, aër frigidus modice, venæ sectio, adstringentia, opiata.

1308. Si his nihil proficitur, infans methodo optima, pro situ eius mutata, illico educendus, vterusque ab fœtu, placenta, grumoso cruore integre liberandus erit.

1309. Neque refert: quonam gestationis tempore id acciderit, cum melius sit perire, vel aliter periturum, fœtum, salua matre, quam perire certo vtrosque.



AD GRAVIDARVM MORBOS.

SECT. 1300.

Rec. Cortic. elect. depurat. citrei,

li 4

anran-



aurantior. ana vnc. ij.

Cinnam. drach. vj.

Magellan. drach. ij.

Vini Hispan. lib. iij.

F. Vin. Medicatum.

Capiat vnc. ij. vesperi itura cubitum.

Rec. *Sal. vol. oleos. drach. j.*

Tinct. Gumm. Lacc. drach. ij.

Castor. drach. fs.

M. *Capiat gutt. xij. in paroxysmo hysterico.*

Rec. *Succ. Citrei rec. expressi vnc. jv.*

Syrup. Kermesin. vnc. iv.

Vini Rhenani lib. iij.

Tinct. Cinnam. vnc. ij.

Cortic. Citrei vnc. iij.

M. *Capiat vnc. jfs. in languore.*

Rec. *Rob. Ribesior.*

Minae Cydonior.

Syrup. Berberis condit.

Acetosf. Citrei ana vnc. ij.

Sp. vitæ Matthioli vnc. j.

Aq. stillat. cortic. citrei vnc. xij.

M. *Capiat vnc. fs. in languore.*

SECT. 1302.

Rec. *Vnguent. Popul.*

Rosac. ana vnc. j.

Nutrit. drach. vj.

Sacchar. Saturni scrup. j.

Ol. infus. Rosar.

Violar.

Hyperici, ana vnc. fs.

M. F. Linimentum, *huic casui aptum.*

SECT.



SECT. 1307.

Rec. *Lapid. hæmatit.*

Bol. Armen.

Sang. dracon. ana drach. j.

Syrup. myrtini vnc. j.

Laud. pari gr. iij.

Aq. stillat. plantag. vnc. vj. M.

Capiat vnc. fs. omni $\frac{1}{4}$ horæ, donec inceperit leniri malum,
si medicamento hujusmodi superabile sit.

PARTVS DIFFICILIS.

1310. **P**artus difficilis fit vitio matris,
infantisue.

1311. Vitio matris, deficientibus viri-
bus ad expellendum, vel partibus ipsis
naturalibus male se habentibus.

1312. Si vires deficiunt, hæ excitandæ
sunt ope vterinorum, cardiacorum, ster-
nutatoriorum.

1313. Si vteri collum internum nimis
angustum, durumue linimentis succurren-
dum quantum possibile, vt lubricum e-
mollescat, vel fotu.

1314. Si tumor hic (1313.), vel in vagi-
na enatus expulsionem impedit, is discuti-
endus, suppurandus, vel eximendus
ope chirurgica.

1315. Si excoriata harum partium la-
bia

bia coaluerint, cito, & ante partum, si fieri possit, dissecanda, & cicatrice obducenda sunt.

1316. Si ossium compages arctior iter impediuerit, linimentis emollientibus (1313.), fomentis similibus, lenienda sunt, tum manu lege artis, succurrendum parturienti est.

1317. Infantis vitio contingit, vbi ille immobilis mortuus, vel ita situs, vt ipse sibi claudat portam.

1318. Mortuus cognoscitur, si immobilis; si arteriæ vmbilicales sentiuntur in funiculo vmbilicali quiescere, maxime prope corpus infantis; si foetida exeunt; si pondus ingens; si laborat tenesmo; si syncope; horripilatione; halitu graeuolente; colore liuido; si diu elapsis aquis nondum peperit; si epidermis prompte a cute secedit, si cutis foetus flaccida, facile separanda; ossa mollia, & mobilia.

1319. Simul ac foetus cognoscitur mortuus (1318.), metu gangrænæ, syncopes, mortisque maternæ, eximendus est, vel per pedes maxime, si fieri queat.

1320. Situs infantis redigendus est in eum,

cum, quo foetus possit educi, vel per caput, vel per pedes inprimis.

1321. Id efficitur 1. positu matris debito. 2. mutatione situs infantis.



IN PARTV DIFFICILI.

SECT. 1316.

Linimenta.

Vid. §. 35. N. 3. §. 1302.

MORBI PVERPERII.

1322. **P**uerpera corripitur lipothymia, syncope, conuulsionibus, statim a partu: quia sanguis arteriosus a cerebro, & cerebello, auersus agitur in laxa abdominis vasa; dein dolore post partum, a labore tolerato, partibus contusis, a sanguine, foetu alio, secundinisue restantibus.

1323. Fascia lata laxum abdomen fulciens tollit priora mala (1322.). Foetus alius, secundinae partes, grumi sanguinis, manu educenda.

1324. Dolor a labore tollitur opiato, antacido, cardiaco, diluente, fotu anodyno externo.

1325.

1325. Nimio lochiorum fluxu vexatur, a nimia fluiditate, agitatione sanguinis, vel ut plurimum a retentis (1322.) in vtero, eius contractionem impedientibus.

1326. Si a retentis, hæc educenda (1323.).

1327. Si ab affectu animi, sanguine nimis fluido, nimis agitato, concurrendum ad hordeata, gelatinas, emulsiones, opiata, adstringentia.

1328. Quorum delectus docent signa morbi, temperiei, velocitatis.

1329. Dum fluit ab vteri vasis restrictis in mammas pabulum serosum lacteum, febricula exoritur, qua orta, sæpe lochia omnino retinentur, vnde infinita & pessimæ indolis symptomata; prout in hoc illudue viscus rapiuntur, hinc phrenitides, pleuritides, peripneumoniæ, anginæ, paraphrenitides, mammarum inflammationes, peior hepatis, ventriculi, omenti, mesenterii, lienis, renum, intestinorum, tum dysenteria, colica, iliaca, apoplexia, paralyfis, & multiplex fane mali species.

1330.

1330. Cuncta hæc eradicantur sponte, radice mali excisa (1329.).

1331. Hinc requiruntur antacida lenia, ad labem acidam feri sopiendam; diluentia lenia ex hordeatis, auenatis, amygdalatis, iusculis; aperientia specifica lenissima ex moderate cardiacis & vterinis; aperientia localia, clysmata, fomenta, cataplasmata, emplastra, linimenta, cucurbitæ, pessaria, suppositoria.

1332. Venæ sectio haud facile, nec nisi vrgente summa necessitate, adhiberi potest..

1333. Neque curanda symptomata proinde, ac si essent morbi acuti sui generis (1329.).

1334. Lacte ad mammas delato, sæpe fit eius stagnatio, coagulatio, dolor inflammatorius, suppuratio, scirrhus, cancer.

1335. Cognoscitur horrore, frigore & calore reciprocis, febricula, signisque incipientis inflammationis.

1336. Curatur 1. antacidis lenibus. 2. diluentibus lenissimis. 3. discutientibus externis cito applicatis.

1337. Si iam in apostema tendit, quantocyus maturandum, aperiendum, depu-

depurandum, consolidandum, de quibus
in chirurgicis.

1338. Lactantis papillæ dolor, fissura, inflammatio, tollitur balsamicis blandissimis, spirituosus cephalicis applicatis.

1339. Lac abundans nimis, & tenue, temperatur victu blando, siccoque, & motu: lac deficiens curatur victu humido, blando, nutriente; fotu, frictioneque mammæ; sublatione causæ indagatæ.



AD PVERPERII MORBOS.

SECT. 1324.

Rec. *Lapid. cancr.* drach. iij.

Corall. rubr. drach. ij.

Margarit. drach. j.

Laud. pari gr. iij.

Syrup. Kermes drach. vi.

Aq. stillat. cort. Citrei,

Meliss.

Maioran. ana vnc. iij.

M. Capiat vnc. fs. omni $\frac{1}{4}$ horæ, donec sopiatur dolor;
superbibendo vnc. ij. sequentis.

Rec. Hord. mund.

Avena integræ, ana vnc. j.

Cum aq. decoct. spatio $\frac{1}{2}$ horæ lib. iij. admisce

Vini Rhen. lib. i.

Aq. stillat. cinnam. vnc. ij.

Syrup. Kermesini. vnc. iſs.

Rec.



Rec. *Olei stillat. Cinnam. gutt. ij.*

Sacchari perlati drach. j.

F. S. A. *elæosaccharum, cui dein admisce*

Margarit. occid. drach. fs.

Matris perlar. drach. j.

Corall. rubr. drach. fs.

Laudani puri gr. iij.

M. F. *Pulu. subtiliss. diuid. in vj. dos. æq.*

*Sumat vnam omni semibora ex vini Rhenani vnc. fs. donec
dolor mitescit; dein detur vna tantum, mane & vesperi,
per binos dies.*

SECT. 1336. N. 1.

Antacida.

Vid. §. 66. N. 5. §. 76. & §. 1324.

SECT. 1336. N. 2.

Diluentia.

Vid. §. 54. N. 4.

SECT. 1336. N. 3.

Discutientia hic bona.

Rec. *Flor. Chamæmel.*

Sambuc.

Melilot.

Lauend. ana vnc. ij.

Croci drach. j.

Cum *Lacte dulc. decoct. in Cataplasma admisce*

Sapon. Venet. drach. ij.

Micæ panis albi q. f.

SECT. 1338.

Rec. *Sp. flor. rorismar. q. f.*

Appli-



Applicetur cum linteo.

Rec. Ol. *Amygdal. dulc.*
infusi Hyperici,
Violar.

Rosar. ana vnc. fs. M. F. linimentum.

Rec. *Vnguent. Rosar.*

Popul.

Nurrit. ana vnc. fs. M.

MORBI INFANTVM.

1340. **I**nfanti recens nato oriuntur morbi proprii i. a strigmentis glutinosis, caseosis, lentis, quibus os, cœsophagus, stomachus, intestina ei replentur.

1341. Qua sola de causa, nausæ, vomitus, tormina, singultus, conuulsiones sæpe oriuntur; atque deinceps restant indigestiones assumptorum.

1342. Curatur facile ieiunio horarum x, vel xii; assumptione pauci vini cum melle misti, iterata dosi hoc tempore abstinentiæ dati; vel lenissimo quodam simul adiecto stimulo purgante.

1343. Quin, ad proluendam hanc pituitæ mucosæ saburram, sæpe profunt egregie epithemata moderate aromatica, & spirituosa.

1344. 2. Multum patiuntur vulgo a meco-

meconio non satis cito expulso, ob debilitatem fœtus, duritiem materiæ, copiam eius nimiam, siccitatem viæ.

1345. Hinc ab eius mora, aëre iam appulso, acrimonia, acor, putredo, in vapores resolutio, adeoque dolores torminosi, conuulsiones, nausæ, vomitus, singultus, tussés, sternutationes, clamores, fletus, peruigilia, terrores, febres, macies, mors.

1346. Corrigitur his expellens sopita stimulo leni purgante, leni suppositorio, cardiaco suauissimo & leni.

1347. Durities materiæ corrigitur haustu feri lactis recentis cum pauco melle diluto, clysmate ex fero lactis saponato, vel mellito.

1348. Intestina lubricantur, assumpto oleo lini, oliuarum, amygdal. dulcium, &c. tum iniectis iisdem clysmatis specie, & linimentis similibus.

1349. Qua methodo, quibus medicamentis felicissime superantur varia illa & pessima symptomata ab hac vna radice orta (1345.).

1350. Si vero vsquam, hic antacida
Kk vium

vsus habent, & inter illa absorbentia imprimis.

1351. Opiata raro, neque sine magna circumspectione, adhibenda.

1352. Quin euitanda omnia nimis attenuantia, stimulantia, volatilia.

1353. Cuique vero singulari malo (1345.) facile remedium inuenitur, cognita historia causæ, & curationis omnium morborum hucusque descriptorum.

1354. 3. Multum patiuntur ab ipso lacte, dum id nimis cito, fortiterque in stomacho coagulatum, compingitur in vnam massam grauem, acremque.

1355. Hæc enim sensim acrior, acidiorque reddita, feces alui virides, acidum spirantes, materiem vomitu reiectam acidam; hinc tormina, flatu, dolores, & infinita alia excitat, maxime conuulsiones.

1356. Quæ curantur antacidis fixis, purgantibus permistis, clysmatibus similibus, carminantibus blandis, oleosis internis, externisque.

1357. Insultus porro epileptici hinc plerumque originem ducunt, irritato genere nervoso ope acrimoniæ vellicantis.

1358.

1358. Vnde & his remediis folis curantur, si medelam capiunt.

1359. 4. Simulac hæc superarunt mala infantes, & incipiunt vti cibis crudis, fructibus horariis, carnibus, casco, similibusque, vermes oriuntur.

1360. Causam dant oua insectorum, in aëre vel terra viuentium, assumpta, neque vi tenelli motus destruenda.

1361. Nidum dat pituita intestinalis, vel gastrica, in qua hærent, fouentur, pariunt, augenturque.

1362. Hinc raro in adultis, & in his modo torpidis, & leucophlegmaticis.

1363. Suntque rotundi, lati, ascarides.

1364. Efficiunt irritatione nauseas, vomitus, alui fluores, animi deliquia, pulsus exiles, deficientes, intermittentes, pruritus narium, insultus epilepticos.

1365. Efficiunt consumptione chyli esuriem, pallorem, debilitatem, aluum adstrictam, inde tumorem abdominis, ructus, borborygmos.

1366. Efficiunt sæpe perforationem ipsorum intestinorum.

1367. Vnde & toties lethales reperti sunt.

1368. Cognoscuntur ab ætate, victu, temperie, effectibus, (1364. 1365. 1366.).

1369. Curatio fit 1. nidum destruendo (1361.) per alcalia fixa, gummata phlegmagoga, mercurialia, antimoniata, aromatica amara.

1370. Tum externe inungendo abdomen balsamicis ex aromaticis fortissimis, permistis purgantibus, oleosisque.

1371. 2. Vermes necando, quod fit ope medicamentorum mellitorum, salinorum, indigestibilium vermibus, amarorum aromaticorum, mercurialium, acidorum, vitriolatorum ex chalybe, vel cupro.

1372. 3. Expellendo lumbricos viuos enectosue ope purgantium amarorum, phlegmagogorum, mercurialiumque.

1373. Quin clysmata, suppositoria, vnguenta externa ad eadem profunt quam maxime.

1374. Quando dentes incipiunt prodire, maxime acuti, ab tensione, punctura, laceratione gingivarum nervosarum, sanguinolentarumque, oritur inflammatio, tumor, gangræna, couulsio, alui fluor viridis, saliuatio, febris, mors.

1375.

1375. Quæ cuncta facile ex eadem causa oriri demonstrantur.

1376. Quin sublata irritatione nervorum (1374.) sponte cessant.

1377. Quod fit 1. gingivas emolliendo, refrigerando, leniendo, mollibus, glutinosis antiphlogisticis. 2. sæpe atterendo ad corpora dura, glabra. 3. diffecando ope lanceolæ.

1378. Conuulsiones hinc oriundas minuta sp. C. C. dosis felix tollit.



IN MORBIS INFANTVM.

SECT. 1342.

- Rec. *Mell.*
Vini Gall.
Hydromell. ana vnc. fs. M. vna dosis.
 Rec. *Syrup. Cichor. cum rbeo. drach. iij.*
Sapon. Venet. drach. fs.
Aq. stillar. melissæ vnc. fs.
 M. *Vna dosis.*

SECT. 1343.

- Rec. *Cinnam.*
Maceris,
Nucis myrist.
Mastich.
Olibani, ana drach. ij.
Sp. vini theriacal. vnc. iv.
F. Tinctura; Dein,

Kk 3

Rec.



Rec. *Vitell. oui* N. j.

Tinctura præscriptæ. vnc. fs.

Aq. stillat. rosar. drach. ij.

Excepta pauxillo mica panis stomacho applicentur.

Rec. *Flaved. cortic. citrei rasi* vnc. fs.

Nucis myrist. drach. ij.

Vini Hispan. drach. iij.

M. conterendo simul in mortario.

Et mica panis excepta applica ut prius.

SECT. 1346.

Rec. *Cassia rec. extract.* drach. fs.

Rhei gr. iij.

Syrup. cichor. cum rbeo. drach. ij.

M. *Pro una dosi.*

Rec. *Mannæ Calabrin.* drach. ij.

Syrup. rosar. solut. drach. j.

Aq. stillat. flor. sambuci drach. iv.

M. *Pro una dosi.*

Rec. *Mell. albi* drach. iij.

Syrup. rosar. solut. cum fenna drach. j.

Aq. stillat. cichor. drach. iv.

M. *Pro una dosi.*

Rec. *Rhei elect. gr.* vj.

Agaric. elect. gr. ij.

Syrup. violar. drach. ij.

Exacte contritis admisceto

Aq. stillat. meliss. drach. ij. *Pro una dosi.*

Rec. *Sapon. Venet.* parum in globulum vel conum formati.

Rec. *Globulum exiguum vel conulum, factum ex Saccharo coniformi.*

Rec. *Mel ad duritiem coctum & in suppositorium exiguum formatum.*

Rec



Rec. *Sebi candekarum parum; forma in speciem debet
tam.*

Cardiaca hic bona.

Rec. *Mell. drach. j.
Vini Hispan. drach. ij.
Vitell. oui drach. ij. M. F. haustus.*

Rec. *Aq. stillar. cinnam. drach. ij.
Elixir. propr. cum sale tartar. pp. gutt. vj.
Syrup. Kermes drach. j. M. F. haustus.*

SECT. 1347.

Rec. *Seri lact. rec. drach. vj.
Mellis drach. j. M. F. haustus.*

Rec. *Seri lact. rec. vnc. ij.
Sapon. Vener. drach. jfs.
Mell. drach. ij. M. F. clyfma.*

SECT. 1348.

Rec. *Ol. Lini drach. j.
Syrup. Althææ. drach. ij.*

M. *Pro una dosi.*

Rec. *Ol. Oliuar.
Syrup. capillor. Vener. ana drach. ij.*

M. *Pro una dosi.*

Rec. *Ol. Amygdal. dulc. rec. drach. iij.
Syr. Glycyrrhiz. drach. ij. Pro una dosi.*

Rec. *Olei lini vnc. fs.
Vitell. oui drach. ij.
Mell. mercurial. vnc. fs.
Seri lactis recent. vnc. j. M. F. clyfma.
Applicandum semel quotidie, donec lubricitas appareat.*

Rec. *Vnguent. Althææ compos. vnc. j.
Olei sem. lini vnc. fs. M. F. linimentum.*

Quo abdomen inungatur mane & vespere.



SECT. 1350.

Rec. *Lapid. Cancror.*

Osteocoli.

Cretæ,

Mandibul. lucii piscis,

Osiracoderm. ostreor. ana drach. ij.

M. F. *Palu. Dosis, gr. viij. bis, vel ter, de die.*

Rec. *Aq. stillariz. flor. rbœad.*

fœniculi, ana vnc. ij.

Lapid. Cancror. drach. ij.

Sapon. Venet. gr. vij.

Syrup. althææ vnc. fs.

M. *Bibat. drach. ij. omni hora, si non dormit.*

SECT. 1356.

Rec. *Sapon. Venet. drach. ij.*

Vitell. ouor. drach. iv.

Lapid. cancror. drach. iij.

Rbei drach. fs.

Bene terendo misce cum

Aq. stillariz. menth. vnc. iv.

Syrup. Althææ vnc. jfs.

Capiat vnc. fs. omni hora, donec sedentur Symptomata.

Rec. *Sapon. Venet. drach. fs.*

Sal. Gemm. gr. iij.

Mell. anisofat. vnc. fs.

Aq. stillariz. fœniculi vnc. jfs. M. F. clyfina.

Rec. *Fellis bubuli drach fs.*

Mell. mercurial. vnc. fs.

Aq. stillariz. menth. vnc. jfs. M. F. clyfina.

Oleosa interna.

Vid. §. 1348.

Oleosa

*Oleosa externa hic.*

Vng. Martiat.

Neruin.

Olea infusa Absinthii.

Anethi.

Chamæmeli.

Rutæ.

Olea pressa Lauri.

Macis.

Nucis myristicæ.

Palmæ.

SECT. 1369.

Rec. Gumm. Opopanac. drach. j.

Vitell. ouor. drach. ij.

M. S. A. dein adde

Sapon. Venet. drach. j.

Syrup. artemis. vnc. jss.

Aq. stillat. feniculi vnc. iij.

Capiat drach. j. omni quadriborio, uno vel altero die, cum regimine.

Rec. Mercur. nigri,

Agarici trochisc. ana drach. j.

Sacchari puri drach. jss.

M. F. Pulu. diuidendus in x. partes.

Capiat vnam mane & vesperi, vacuo stomacho.

Rec. Sal. Card. bened. drach. ij.

Syrup. s. rad. aperient. vnc. j.

Aq. stillat. fumar. vnc. iv.

M. Capiat drach. iij. omni triborio.

Rec. Semin. Absinth. vulg.

Santonie.

Tanacet. ana drach. iij.

Mell. vnc. ij.

M. Sumat drach. ij. omni mane.

Kk 5

SECT.



SECT. 1370.

Rec. *Vnguent. Agripp.*

Arthanit. ana vnc. j.

M. F. linimentum;

Cuius pauxillo inungatur subinde locus umbilici.

Rec. *Fellis taurini,*

Aloes pur. ana drach. ij.

Vnguent. althææ vnc. j.

M. *In similes usus.*

Rec. *Ol. Tanaceti,*

Castorei, ana vnc. fs.

Vnguent. neruin. vnc. j.

M. *In eundem effectum.*

In quibus obseruandum, an nimis turbet aluum; id quippe accidit sæpe: ne in dysenteriam prolabatur infans, ex usu nimio, cauendum tunc erit.

SECT. 1371.

Rec. *Mell. vnc. ij.*

Sal. gemm. drach. jfs.

Aq. stillat. cichor. vnc. iv.

M. F. potus, cuius vnc. fs. bibat omni hora diei.

Rec. *Corn. Ceru. vstum, ad scrup. j.*

Capiat quater de die, quo tempore vacuus est stomachus, ex Syrup. rosar. pallid. drach. ij.

Rec. *Corallin. marin. drach. ij.*

Limatur. martis drach. fs.

M. F. pulu. diuidendus in dos. xvj.

In usum eundem.

Rec. *Semin. Santonici,*

Ratæ,

Tanaceti,

Absinthii, ana drach. j.

Sac.



Sacchari drach. iij.

M. F. pulu. diuidendus in dos. xvj.

In usus eodẽm.

Rec. *Hydromell.* rec. lib. j.

Semin. Santonic.

Taniacet. ana vnc. j.

F. S. A. Vin. medicatum; cui dein puro admisceto

Mellis albi vnc. ij.

Capiat vnc. j. mane, vacuo stomacho.

Rec. *Mercur. nigr.* gr. viij.

Vitriol. martis, parum calcinati, gr. ij.

M. F. puluis, diuidendus in ij. dos.

Capiat vnam mane alteram vesperi, inani stomacho.

Rec. *Mercur. dulc.* gr. vij.

Diagryd. gr. v.

M. F. pulu. Mane hauriendus ex hydromelle.

Rec. *Tartar. vitriolat.* gr. iv.

Vitriol. Martis gr. iij.

M. F. Pulu. tenuissimus, diuide in dos. iij.

Capiat vnam mane, circa meridiem, vesperi, vacuo stomacho.

Rec. *Vitriol. comm.* gr. ij.

Syrup. violar. drach. iv. M.

pro vna dosi, mane, ieiuno stomacho assumenda.

SECT. 1372.

Rec. *Diagryd.* gr. iv.

Mercur. dulc. gr. vj.

M. F. Pulu. tenuis. Pro vna dosi.

Rec. *Rad. Ialapp.*

Mercur. nigri ana gr. xij.

M. F. pulu. *Vt prius.*

Rec. *Agaric.* gr. viij.

Mercur. nigr. gr. xij.

M. F. pulu. *Vt prius.*

Rec.



- Rec. *Aloes* gr. iij.
Resin. Ialapp. gr. j.
Vitriol. martis gr. ij.
 M. F. pulu. *Vt prius.*

SECT. 1373.

- Rec. *Ol. Lini* vnc. iij. F. clyfina.
 Rec. *Mell.* vnc. ij.
Aq. still. Cichor. vnc. ij. F. clyster.
 Rec. *Decoët. Tanacet.* vnc. iij.
Aloes gr. vj. M. F. enema.
 Rec. *Vitriol. Martis* gr. xv.
Aq. stillat. cichor. vnc. iv.
 M. F. lauamentum dictum.
 Rec. *Mell. coëti ad spiffitudinem debitam,* vnc. iv.
Aloes vnc. is.
Vitrioli Martis drach. ij.
 M. S. A. F. parua suppositoria,
Applicanda post aluum exoneratam.

Vuguenta externa.

Vid. §. 1370.

SECT. 1377.

- Rec. *Nitri* gr. xx.
Sp. Sal. gutt. v.
Syrup. Violar. vnc. j.
Aq. stillat. flor. sambuc. vnc. iij.
 M. *His foueantur gingiua.*
 Rec. *Cremor. lactis rec.*
Vitell. ouor. ana vnc. j.
Syrup. Violar. drach. vj.
Aq. stillat. rosar. vnc. iij.
 M. *In eodem vfus.*
 Rec. *Flor. recent. Rosar.*
Sambuci ana pug. fs.

Inclu-



Includantur linteo, appenso, vt in fundo manean-
plumbo, tum immittantur vitro longo, cylindrico,
affundatur lac recens, ponantur in digestionem; *Cre-
mor supernatans adhibeatur inflammatis ad gin-
giuas.*

SECT. 1378.

Rec. Spirit. Corn. Cerv. gutt. iij.

Bibat ex Syrup. Kermes drach. ij. ter de die.

V A R I O L A E.

1379. **Q**uin infantibus frequens, huc re-
feretur, morbus, qui vocatur
variolarum. Cuius quidem
adeo accurata Sydenhami descriptio, vt
decies legi merenti pauca modo addenda
habeam, vnde pateat & has ad eandem
simplicitatem, vt præcedentes morbos,
reduci posse, & aliquid in ordine meden-
di desiderari hætenus.

1380. Est vt plurimum epidemicus, ver-
no tempore primo incipiens, æstate cre-
scens, languens autumnò, hyeme sequenti
fere cedens, vere iterum eodem ordine
rediturus. Quo citius in hyeme incipit,
eo violentior, quo serius, eo mitior, erit
mali natura. Hinc liquet; quo anni tem-
pore periculosior.

1381. Occupat omnem ætatem, sexum-
que;

que, maxime autem pueros, eosque, qui hactenus hunc morbum nondum passi sunt; quo ætas humida plus dissipauit, solida magis coegit, eo violentior morbus: Hinc pueris, mulieribus, mollibus, laxis, facilior: exercitatis, viris, senibus, peior.

1382. Malum hoc, licet epidemicum, contagio suscipitur communicato ab homine qui prius laborauit: quod primo videtur aëri inhærens, pulmonibus, oribus, naribus, œsophago, stomacho, intestinis, dari. Adeoque hoc tempore admodum parum materiei venenatæ habere.

1383. Hæc contagiosa materies (1382.) humoribus mista statim producit effectus quosdam ordine se mutuo excipientes; qui sunt: horripilatio; rigor; febris acuta; calor ingens, perpetuus; oculorum splendor, a liquore tenui & calido illapso; capitis, dorfi, artuum, dolor magnus, maxime circa partes, cordis scrobiculo subiectas; vomitus, nausea; inquietudo magna; stupor; somnolentia; atque infantibus insultus epileptici.

1384. Initio huius status (1383.) cruor venis missus pulcher, saluberrimoque simillimus; secundo, tertio, quartæ die, iam

iam instar pleuritici & inflammati cernitur (1384.), eo plus, quo plus duravit, & vehementius fuit, malum.

1385. Durat hic status, pro varietate epidemica, vehementia morbi, temperie ægri, vario tempore: quo diuturnior ex sua natura, eo mitior futurus totus morbus, & contra.

1386. Vnde videtur morbus in hoc statu (1380. ad 1386.) esse velocitas liquidorum aucta a stimulo inflammatorio omni sanguini admisto.

1387. Morbus ergo ille (1386.), affinis omni acuto inflammatorio, difficulter in hoc statu ab eo distinguitur; scientia epidemici regnantis (1380.), ægri in hunc morbum proni (1381.), contagii prægressi (1382.), & inde secutorum symptomatum (1383.), docet quod adsit, & quod secuturæ sint papulæ ipsæ in altero, mox describendo, decursu.

1388. Cognito (1387.) hoc morbi statu (1380. ad 1387.), indicatio videtur oriri hæc primo; vt, stimulo inflammatorio ablato (1386.), sanetur status præsens, & impediatur ulterior eius progressus, & proinde caueatur futura suppuratio, gangræna, &c.

1389.

1389. Stimulus videtur auferri posse correctione per specifica ita dicta, vel methodo vniuersali antiphlogistica.

1390. Correctio specifica niti debet inuento remedio opposito illi veneno contagioso, quod tam parua mole susceptum reliqua parit, vt effecta (1382. 1383.).

1391. Quale (1390.) inueniri posse, comparatio historiarum antidotorum, & indoles huius mali, faciunt sperare; & ad indagandum impellit summa hinc futura humano generi vtilitas.

1392. In stibio, & mercurio, ad magnam penetrabilitatem arte deductis, nec tamen salina acrimonia nimium corrosiuis, sed bene unitis, vt quæramus, incitat aliquis horum aliquando successus.

1393. Methodus vniuersalis videtur hic adhiberi posse, & experimentis perfici debere, illa, quæ deprehensa est in omni inflammatorio valere, ne inflammatio in pus, gangrænamue, abeat: quum in aliis omnibus succedat, hic nihil repugnet, morbus variolosus sæpe sine variolis sit.

1394. Consistet illa (1393.) in his: 1. mittatur cruor, vt (854. N°. 1. 890. N°. 1. &c.) 2. Clysmatibus, fotibusque, laxetur

tota

tota cutis, os, œsophagus, intestina, sæpe. 3. potetur multum aquæ tenuissime farinosa, acidulæ, nitrosæ; hauriatur nitrum stibii, vel polychrestus sal, & hydrogala tenue. 4. sit victus tenuis; aër in pulmones ducendus frigidiusculus; corpus bene tectum, & perspirabile.

1395. Quamvis enim in hoc morbo raro cogitetur de hac indicatione (1388.), & de hac methodo inprimis (1393. 1394.), casus tamen, ignaro morbi medico, sæpe dedit successus probantes talem artem.

1396. Morbus hic vbi statum primum, quem contagii voco, absoluit, secundum ingreditur, qui sic se habet: punctis parvis rubris instar morsus pulicaris cutis capitis primo & faciei, mox manuum & brachiorum, dein trunci, & inferiorum, inficitur; mox mitescunt symptomata (1383.); augentur omni hora quoad magnitudinem, & numerum pustulæ valde rubescences, assiduo magis, magisque, eleuantur; inflammantur; cutis tenditur; dolor; calor; impedita circulatio; impedita perspiratio; hinc humorum maior ad interiora repulsus; febris; anxietas; dyspnœa; dolor faucium; angina;

Ll

na;

na; diarrhœa; dysenteria; mictus cruoris; hæmoptoe; cutis inter pustulas liberæ inflammatio rubra, dolens, calens; quæ vbi durauerunt spatio 4, 5, vel 6, dierum, iam absolute suppuratæ sunt, & in totidem parua apostemata conuersæ. Hunc inflammationis decursum voco, usque in abscessum; durat pro varietate epidemici, temperiei, magnitudinis, regiminis, vario tempore, plerumque quatuor, aut quinque diebus; ita, vt octauo, ab inchoamento, die suppuratio adsit; cruor tum valde inflammatus.

1397. Si morbus contagii ingens (1383, ad 1386.), pustulæ multæ, sibi mutuo proximæ, ac quasi implicitæ, inflammationis omnia signa magna, temperies salina oleosa, vigor ætatis, vita prægressa lautissima, remedia & regimen velocitatem multum augmentia, ætas feruidissima, fuerint, tum ad finem inflammationis vesiculæ lymphæ rubellæ distentæ adsunt, gangrænosæ indolis indices (427. N°. 5.); hinc cutis circulationi, & exhalationi inepta; inde humorum in interiora repulsus; inde saliuatio ingens; tumor magnus manuum, pedumque.

1398.

1398. Ex his diagnosis & prognosis secundi status cognoscitur, ratioque morbi, & omnium symptomatum in eo capitur, his fere regulis circumscripta:

Quo mitior status contagii, eo lenior status inflammationis.

Quo lentius erumpunt pustulæ, quoque proin diuturnior status contagii, eo morbus leuior.

Quo pauciores, magis separatae, maiores, plus a facie remotæ, candidiores, & dein flauæ magis pustulæ, quoque tardius procedunt, eo meliores.

Quo plures, magis intricatae, minores singulae, magis in facie hærentes, fuscae, nigrae, citiusque incedunt, eo peiores.

Quo materies pustularum pus magis blandum & perfectum refert, eo melius.

Quo materies pustularum ichorem gangrænosum plus refert, eo peius.

Quo spatium inter pustulas magis rubet, calet, tenditur, tumet, circatemperat, eo melior spes, ob circulationem hic remanentem.

Quo idem plus pallet, vel fuscum euadit, eo peius; angina sequitur lethalis, aut peripneumonia; nisi saluatio liquida, vel

L l 2

ingens

ingens tumor manuum, pedumue accesserit; ratio est, liquorum hic impedita, hinc ad interiora aucta, circulatio.

Si in locis inter pustulas liberis maculae purpureae, lethalis gangraena designatur.

1399. Indicatio hoc in statu (1396.) est varia pro vario gradu durantis morbi: nam in primo initio apparentis inflammationis externae, videtur requiri cautela, ne vergat in suppurationem: de qua iam actum (1393. 1394.): aut, si id spernitur, curandum ut minima fiat, procul a capite, & tarda: quod fit 1. victu tenuissimo, putredini resistente: 2. potu, diluente, blando, subacidulo. 3. medicamento antipyrico, aperiente, diluente, assiduo magna copia ingesto. 4. balneo pedum bis de die repetito, horum fotu tepido continuo, epispasticis applicatis ad caua pedum & poplitum. 5. regimine frigidiusculo, maxime admissu puri & frigidi aëris, interim corpore inferiore contra frigus munito. Hæc autem statim & ab initio sic applicanda sunt. 6. si nimio impetu fuerit morbus, opiata vespertina quinta conducunt, reliquis simul, ut præscriptum est, actis.

1400. Post toleratum decursum hunc (1396.), sequitur status tertius suppurationis, quo incepta illa crescit & perficitur: in eo pustulæ iam purulentæ quotidie augentur, dein maturescunt, albesunt, flauent; ac tertio, quartove die huius decursus, rumpuntur. Tum vero tota pinguitudo & cutis pure scatet mobili, externe aret, locis liberis inflammatur; hinc impedimento perspirationis, circulationisque, irritatione generis membranosi & nervosi, absorptu puris in venas, fit febris pessimæ indolis, cum pessimis symptomatibus; si materies hæc purulenta sanguini mista diu mouetur, putrescit (82. 100. 406.); hinc pro vario delapsu in diuersas corporis partes diros effectus, vixque superabiles, producit; deliria; phrenitides; anginas; peripneumonias; pleuritides; vomitus; dysenterias; hepatitidem; apostemata; anthraces; iuncturarum tumores, abscessus, immobilitates; tabem; phthisin; & infinita similia.

1401. Si vero tum materies tenuior, acrior; morbusque vehementior, exeditur cutis, pinguitudo, & caro; fiunt lata, pessima, ad ossa sæpe penetrantia, vlcera cacoethe; cicatrices fœdæ.

1402. In hoc statu (1400.) curandus puris ad exteriora exitus, ab interioribus expulsio; quod fit laxando cutim fomentis laxantibus tepidis, assiduo & laboriose renouatis, ablutione & gargarismo oris, fauciumque, assiduo; potu largo, calido, cardiaco, detergente, aperiente, putredini resistente; clysmate blando, diluente, emolliente, laxante quotidie iniecto, diu retento; victu ex iure carnum cum sale & acidis condito; vini meracissimi subinde moderato usu; dato simul, contra enormes impetus, opio.

1403. Si morbus vehementissimus; ichor gangrænosus loco puris; tota fere cutis occupata; facile patet, cur infelicem adeo, imo ineluctabilem, perniciem adferat hic morbus: omnium vero clarissime id liquebit ei, qui ex anatomicis norit, ut externam cutim, ita oculos, narium omnes membranas, oris omnia velamenta, asperam arteriam, bronchia, œsophagum, stomachum, intestina, iecur, lienem, pulmones, obsideri his pustulis; hinc quippe dicta intelligit, & videt, quid ad curationem requiratur, & an magnitudo mali, perditio tot ægrorum, post vulgata-

gata auxilia applicata frustra semper, non excitet boni medici solertiam, vt initiali inuadentis summa tentet; vulgata quippe methodo nullus, nisi sponte, emergit. Prophylaxis insitiua videtur satis certa, tutaque.



IN VARIOLIS.

SECT. 1392.

Rec. *Antimon. diaphoret. una cum suo nitro fixante conseruati*, drach. vj.

Mercur. dulc. drach. ss.

Sal. polychrest. veri drach. j.

Diu terendo F. pulu. tenuissimus, diuidendus in xxxv. dof. æquales.

Capiat vnā tertia quaque hora; superbibendo, post singulas, feri lact. rec. vnc. iv.

Rec. *Flor. Sulphur.* drach. j.

Cinnabar. Antimon. scrup. j.

Stibii diaphoret. nitrati.

Salis polychrest. ana drach. jss.

M. F. pulu. subtilissimus, diuidendus & sumendus vt prius.

SECT. 1394. N. 2.

Rec. *Flor. Maluæ,*

Althææ,

Taraxaci,

Verbasci,

Lychnid. saponar. ana vnc. ss.

Farin. lini drach. ij.



Coq. cum aq. ad vnc. xij. F. clyfma.

Iniiciendum duodecima quaque hora.

Panni lanei eodem decocto madidi, expreffique iterum, calidi applicentur corpori inferiori, pedibus, poplitibus, inguinibus, cruribus, femoribus.

Eodem os, nares, fauces, colluantur, humectentur, fenentur.

SECT. 1394. N. 4.

Rec. *Flor. papauer. errat.*

recentiff. sambuci. ana vnc. j.

Auena integræ vnc. fs.

Cum aq. decoct. vnc. xx. admisce

*Nitri ftribiati, h. e. ab antimon. diaphoretico lauando,
& cryftallifando, feperati. vnc. fs.*

Succi citrei recent. vnc. j.

Syrup. violar. vnc. jfs.

Bibat quantum lubet.

SECT. 1394. N. 4.

Vid. 28. N. 1.

SECT. 1399. N. 1.

Vid. 28. N. 1.

SECT. 1399. N. 2.

Vid. 1394. N. 3.

SECT. 1399. N. 3.

Rec. *Succi recens expreffi Cichorei,*

Lactuca,

Taraxaci,

Fumariæ, ana vnc. ij.

Radic. fcorzoner. vnc. iv.

Nitri puri drach. jfs.

M. *Bibat vnc. j. omni hora diei.*

Rec.



Rec. Radic. *Saxifragill.*

China,

Gramin. ana vnc. ij.

Scorzoner. vnc. viij.

Flor. Sambuci vnc. j.

Cum aq. decoct. spatio i. horæ, pint. vj. exhibe. *Bibat*
vnc. v. omni hora.

SECT. 1399. N. 4.

Rec. *Emplastr. de Meliloto,*

Galbani,

Sagapeni, ana vnc. j.

M. *Extensa ad alutam applica cauis pedum.*

Rec. *Fermenti acidi panis* vnc. vj.

Ruta m. j.

Semin. sinapi contusi drach. vj.

Salis drach. iv.

Acezi drach. iv. M.

Applica ad cauis pedum & poplitum noctes atque dies.

SECT. 1399. N. 6.

Rec. *Syrup. papau. albi* vnc. j. F. haustus.

Rec. *Laudani puri* gr. j. F. pilula.

Rec. *Laudani puri* gr. j.

Aq. stillar. Melissæ vnc. fs. M. F. haustus.

SECT. 1402.

Vid. scripta ad 1394. & 1399. N. 6.

MORBI EPIDEMICI.

1404. **N**otandum vero est super omnia,
morbos hactenus descriptos
fluidorum, licet nomine, signis plerisque,

& aliqua specie euentus iidem appareant incauto, tamen in indole tecta, phænomenis non nisi perito obseruatis, vario tempore incrementi, status, coctionis, crisis, effectu, euentu, sanandi methodo requisita, sæpe immensum differre.

1405. Adeoque requirere longe aliam administrationem 6. rerum non naturalium, aliam medelam, alia medicamenta.

1406. Cuius tamen varietatis causa adeo latens, vt a nullo sensili vitio 6. rerum non naturalium deduci hæctenus queat.

1407. Et tamen ob communem pluribus afflictionem, possibilem euitationem, & exclusionem vento, vel igne, in aëre residere comprehenditur.

1408. Et in eo magis ob varietatem inexplicabilem exhalationum, quæ vel misturæ, vel stimuli ratione nostræ machinæ nocent, quam ob mutationem notabilem qualitatum sensilium; vt obseruatio docet.

1409. Tamen vix nisi contagio humano, quod mirum, morbos excitare.

1410. Hos autem proprie epidemicos vocare solemus.

1411. Horum cognoscitur natura iuxta regulas datas (11. 12. 13.).

1412. Lucem vero affundit medico incognitum talem, & recens inuadentem epidemicum curaturo. 1. Determinatio eius ad speciem notam, cui maxime similis. 2. Obseruatio eius, qui, eo tempore, circa æquinoctium vernum, vel autumnale, frequentior. 3. Attentio ad phænomena spontanea, quæ mortem, salutem, meliorem, peiorem statum morbi præcedunt, comitantur, sequuntur. 4. Eorum, quæ inuitabiliter geruntur, ingeruntur, egeruntur, adiutamentum, vel nocumentum. 5. Comparatio plurium eodem tempore decumbentium simul. Abstinencia ab omni auxilio, quod dubium, valde mouens, mutans, tectum morbi genium obscurans.

1413. Ex quibus omnibus accuratissima attentione obseruatis indicatio nascitur.

CALCVLVS.

1414. **V**bi in corpore alicubi corpus quoddam plane insolubile hæret, ei crusta calculosa breui se applicat, plus, minusue.

1415.

1415. Id fin in renibus fit, a parte terrestri sanguinis exsiccata, fit calculus renum, maxime ortus ad vltimas arterias, specie arenæ.

1416. Qui sensim ibidem accrescens renem obstipat, carnem eius suffocat, consumit, specie grumi, puris, carunculæ, pel-
lium expellit, totumque tandem corrumpit, mictus sanguineos, purulentos, fœtidos excitat; quin sæpe vlcerationem vicinorum, post inflammationem creat.

1417. Idem quacunq; causa ex loco originis (1415.) in peluim, & inde in vtre-
rem, huius flexus, angustias, introgressum in vesicam delatus, sæpe intercipit vrinas, cum dolore inflammatorio.

1418. Per vtreteres in vesicam delatus expellitur sæpe.

1419. Restitans in vesica crescit per orbcs appositos.

1420. Manente semper nucleo rubro, reliqui orbcs, rubri, albi, cinerei, cærulei, perque gradus colorum notatur gradus insolubilitatis, ipsa chemia detegendus.

1421. In vesica hærens inflammatio-
nem, eiusque symptomata, tum pressio-
nes, attritus, vlcera, puris mictus, strangu-
rias,

rias, obstructionem vrethræ, impossibilem mictum nisi supino, febrim hecticam, tabem, facit; sæpe impellitur in vrethram immobilis.

1422. Calculus renum cognoscitur a dolore ibidem obtuso, a mictu sanguineo post motum ad strata lapidea, motum corporis vehementiorem, præcipue in curru, a lapidibus sæpe emissis, carunculis, pure, filamentis (1416.).

1423. Vesicæ, ex dolore in reddenda vrina, & post, & ante, ex vrina stillicidio tantum emissa, alba cum sedimento mucoso, crasso, multo, graueolente, pruritu ad caput penis, tenesmo in reddenda vrina, manus per anum immisso digito, cathetere, & (1421.).

1424. Calculus renum indicat sui imminutionem, expulsionem, reductionem eo, vt non lædat.

1425. 1. Id fit victu humido, blando, tenui, modice salito; potu aquæ, vel huic simillimo; viribus vitæ.

1426. 2. Alterum fit laxando vasa per balnea, clysmata, linimenta laxantia; lubricando vias medicamentis humidis, emollientibus, lenibus, oleosis blandis; aperi-

aperiendo per opiata & anodyna; propellendo opē medicamentorum prudenter diureticorum, motu moderato.

1427. 3. Tertium, occurrendo symptomatibus; inflammationi per V. S. & reliqua huius remedia; dolori per emuliones anodynas; asperitati per oleosa, saponata, glutinosa.

1428. Neque enim de specificis lithontripticis hætenus vera fides.

1429. Delatus in angustias pelvis, requirit eadem (1425. ad 1428.), maxime clysinata, fots, venæ sectionem.

1430. Per vretes ex rene in vesicam illapsus noscitur a nephritide antegressa, dolore in via vretis subsecuto, horum cessatione cum signis (1423.).

1431. Tum requirit citissimam hinc expulsionem, ne crescens peior fiat.

1432. Id fit iisdem fere mediis (1425. ad 1428.), sed topice applicatis: balneo oleoso, clymate simili, iniectione olei in vesicæ vias, affricu huius.

1433. Tum succurrendum omnibus symptomatibus, prout hunc illumue morbum imitantur.

1434. Si in vrethram immobilis impactus,

pactus, iniectio, fatus, suetus, auriscalpium specillum, pressio lenis, vel & incisio applicanda requiruntur, aut punctura perinæi.

1435. Si maior, quam excerni queat, lithotomia educendus.

1436. Et inprimis apparatus magno, vtpote certissimo, arte Rauiana emendato.

1437. Sciendum tamen omnem euentum operationis semper dubium: propter singularia, vix vlla sagacitate præuidenda, neque vlla arte sananda, incidentia.

1438. In mulieribus vero, dilatando vrethram, educitur: raro incidendo.

1439. Si in collo vesicæ hærens impedit vrinam, cathetere repellendus.

A D C A L C V L V M.

SECT. 1425.

Olera hic bona.

Borrago.

Chærophylla.

Chondrilla.

Lactuca.

Petroselinum.

Radi-



Radices Dauti.
Raporum.
Sifari.

Sonchus.

Scorzonera.

Taraxacum.

Tragopogon.

Hæc, horumue quædam, cum iure carniæ cocta pro victu optima.

Serum Lactis,

Lac,

Lac ebutyratum,

} animalium solo gramine pastorum.

Plurimum valet usus horum tamdiu continuatus, donec alius fit, manetque, aliquamdiu laxa; licet debilitas inde quædam successerit: hæc quippe felix sæpe soluit vel inueteratum malum.

SECT. 1426.

Rec. Fol. Malvæ,

Albæ,

Ibisci,

Mercurialis,

Parietariæ,

Brançæ Vrsinæ,

Attriplicis, ana m. iv.

Ex eodem decocto fiant clysinata, & etiam potulenta assidua; nam laxant, aperiunt, molliunt, pellunt.

Decoctum oleosum ad lubricandum.

Rec. Amygdal. dulc. N. xxx.

Pistachior. N. xx.

Semin. Papav. contrus. vnc. iij.

Excorticata, & contusa, decoque cum aqua vulgari q. s. spatio $\frac{1}{2}$ horæ, tum fortiter & diu contritis simul S. A. adde

Sapon. Venet. drach. iv.

Glycyrrhiz. vnc. ij.

Ebul.



Ebulliant denuo parum, dein decocti lib. iij. exhibe.
 Bibat. vnc. viij. quater de die, vacuo stomacho, & dein pa-
 rum leniter deambulet.

Opiatum, anodynum, aperiens.

Rec. Syrup. s. rad. aperient. vnc. jss.
 Laudani puri gr. ij.
 Nitri puri gr. xx.
 Aq. stillat. petroselinii vnc. vj.
 M. Bibat vnc. ss. omni hora.

Propellens diureticum.

Rec. Cicer. rubr. contus. vnc. ij.
 Semin. Petroselinii vnc. j.
 Rad. Gramin.
 Petroselinii ana vnc. iv.
 Fol. Agrimon.
 Virg aurea,
 Veronic. maris, ana m. ss.
 Glycyrrhiz. vnc. j.

Cum aq. decoct. spatio $\frac{1}{2}$ horæ lib. iij. admisce
 Nitri drach. ij. Bibat vnc. ij. omni hora.

LUES VENEREA.

1440. **P**ost annum 1493. in regno Neapolitano, mox Gallico exercitu, dein per totam Europam lues venerea orta adhuc durat.

1441. Quæ generatione, lactatione, contrectatione, salivâ, sudore, liquido genitali, exhalatione, contagio est.

Mm

1442.

1442. Et qua parte contrahitur, primo se manifestare solet.

1443. Neque a non infecto, vel non infecta, eodem hoc morbo, vnquam orta deprehensa est.

1444. Pars infecta (1442.) diuerso quidem tempore pro varietate loci infecti, materiæ contagiosæ, gradu caloris excitantis, temperiei diuersitate, pruritu, calore, leni inflammatione, pustula subalba, squamosa, erodente, mucosa, insanabili vulgatis remediis, cognoscitur primo.

1445. Hinc crescendo vicina primo, & plerumque externa inficit similibus pustulis vlcerosis, dehinc interna, labia, gingiuas, palatum, linguam, fauces, nasum, cerebrum, pulmones, hepar, lienem, vterum &c.

1446. Quæ stillant saniem mucosam, lentam, subuiridem, carnem erodentem, in latum magis, quam profundum proserpendo.

1447. Hinc in veretro externo cancri; in interno gonorrhœa; in vagina fluor dictus albus.

1448. Tum glandulæ inguinales tumentes vtroque in sexu, bubones venerei,
com-

communicato per lymphatica resorbentia contagio.

1449. Et in viris membri inflammatio ingens, breui in gangrænam soluta.

1450. Tum testes tumidi, dolentes, sæpe in ulcerationem abeuntes, inflammatorio tumore ad vesiculas feminales orto.

1451. Vt & carunculæ, stranguriæ, erosio vrethræ, prostatarum, colli vesicæ, vasorum seminalium; similia mulieribus.

1452. Hinc fertur in membra, cum dolore nocturno medios artus occupante, vt & flexurarum rigiditate.

1453. Vnde in cartilaginibus, nasi maxime, & palato, erosio.

1454. Mox media ossa occupans caries producit præcipue in cranio.

1455. Tumque superpositæ partes in apostemata assurgunt pessima.

1456. Quin & in tophos duros eleuat, dolentes obscure, sensim acutius, tumque & superposita corrumpentes.

1457. Vnde facile constat de signis, quibus morbus hicce cognoscitur.

1458. Gonorrhœa curatur, balneo,
Mm 2 foru,

fotu, iniectione, purgatione mercuriali sæpe repetita, emulsionibus, balsamicis, abstinencia ab omni cibo, potuque lauto & ad venerem stimulante, victu contra potuque tenui.

1459. Persistendum in curatione, donec nihil amplius insoliti ex pene exstillet, vel in vrina se manifestet.

1460. Inflatio membri virilis tollitur cataplasmate anodyno, discutiente, emolliente, fotu simili, & venæ sectione larga, & dictis (1458.).

1461. Bubo venereus tollitur dissipando per emplastra singularia; suppurando, si hæc non profunt; & aperta depurando.

1462. Testis tumidus fouendus similibus (1460.): si vrget, educendus sanguis ex brachio; emplastro quoque scroto applicato leuandus; donec redierit in statum plane naturalem.

1463. Pustulæ, & cancri dicti mercurialibus erodendi ad viuum vsque, tum sensim lenioribus sanatur iisdem.

1464. Semper autem vtendum iisdem fere internis, ac (1458.) præscripsit.

1465.

1465. In mulieribus fluor venereus curatur iisdem (1458.).

1466. Sed præcipue fotibus detergentibus validis, mercurialibus.

1467. Vbi vero pustulæ vbique dispersæ, dolores artuum, nocturni labores, bubones magni, torturæ ossium, sæpe tolerata gonorrhœa, docent adesse luem, saluatio mercurialis requiritur.

1468. Quæ vt fiat, aliquot diebus prius impleatur æger ptisana.

1469. Tum vtatur quolibet bihorio dosi apta mercurii dulcis.

1470. Simul ac anima fcetere, gingiuæ dolere, dentes erigi videntur, attendendum an pergere, consistere, vel inhibere, deceat.

1471. Si expuitur ad lib. iij, vel lib. iv, quolibet nycthemero, sufficit.

1472. Si minor, excitandus fluxus erit, stimulo eodem.

1473. Si maior, quam vires ferre queant, sistendus erit leni clysmate, vel purgante, vel sudorifero.

1474. Si ruit vis mercurii ad aluum, opus erit opiato, & diaphoretico.

1475. Vbi os, gingiuæ, fauces, nimis

Mm 3

tument,

tument, dolentue, vtendum molli, blando, liquido gargarismate, vel collutione, vel (1473.).

1476. Pergendum donec omnia symptomata euanuerint, vulgo per xxxvj. dies.

1477. Tum subinde leni dosi mercuriali vtendum per alios xxxvj. dies, vt lenissimæ sputationis maneat vestigium.

1478. Neque vllum aliud remedium tum ad sanitatem requiritur.

1479. Tophi minuuntur emplastris (1461.); vel, apertura facta, osse abrafo.



IN LVE VENEREA.

SECT. 1458.

Balneum.

Rec. Fol. rec. Rutæ,

Scordii,

Alliariæ,

Maluæ, ana m. ij.

Cum aq. decoct. & expressis, admisce ad lib. ij.

Sapon. Venet. drach. j.

Sp. Vin. comm. drach. vj.

In hoc tepido virga, & scrotum, immergantur, ter, quaterue de die, spatio $\frac{1}{2}$ horæ: dein panni lanei præscripto decocto immersi, & expressi, omni applicentur pubi, scroto, perinæo.

Fiant



Fiant ex iisdem iniectiones.

Rec. Mell. rosar. vnc. j.

Aloes puriss. gr. x.

Sal. Ammon. gr. iv.

Aq. stillat. fœnicul. vnc. vj. M. pro iniectione.

Purgatio.

Rec. Rad. Ialapp. drach. j.

Mercur. dulc. scrup. j.

F. Pulu. Pro una dosi.

Rec. Scammon. gr. xij.

Rad. Ialapp. gr. xvij.

Mercur. dulc. gr. xxv.

M. Vt prius.

Rec. Pil. Coch. mai. gr. xl.

Præcipit. albi gr. iij.

M. accurate F. Pil. N. i.

Summa aurore deuoranda.

Emulsio.

Rec. Semin. 4. frigid. maior. ℥

minor. ana drach. iij.

Cum aq. bordei F. emulsio, citius vnc. xxj. admisce

Nitri drach. j.

Syrup. Diacodii vnc. fs.

Rec. Terebinth. vulg. vnc. j.

Rhei barb. drach. iv.

Glycyrrhiz. sicca q. s. vt F. massa ad formandas pilul.

Capiat j. omni hora, gr. iv.

SECT. 1460

Rec. Flor. Sambuc.

Melilot.

Chamamel.

Papau. errat.

Mm 4

Al.



Athææ, ana vnc. iij.

Cum lacte *ebutytrato* coctis admisce

Farin. lini vnc. j.

Ol. lini vnc. ss.

Sp. vini theriacal. vnc. j. F. Cataplasma.

SECT. 1461.

Dissipans.

Rec. *Flor. Sulph.* vnc. ij.

Mercur. nigr. drach. ii.

Sacchar. Saturni drach. iij.

Emplastr. de Meliloto,

Cuminio,

Galbano,

Ammoniac,

Sagapeno, ana vnc. ss.

M. F. S. A. emplastr. Cum aluta applicandum.

Rec. *Flor. Sulph.* drach. iv.

Sacchari Saturni drach. j.

Picis Sutoria unc. ij.

M. in eisdem usus.

Suppurans.

Rec. *Ficus molles*, ad lib. ss.

Mell. recent. vnc. ij.

Galbani, in vitello oui soluti, vnc. j.

F. S. A. cum aq. coquendo cataplasma.

Rec. *Pulv. fol. siccat. scordii* vnc. ij.

Vitrioli albi drach. ij.

Aloes drach. j. M. F. pulv.

Aperto ulceri, deterso prius, inspergendus ad depurandum.

SECT. 1462.

Rec. *Emplastr. de Meliloto,*

Diapomphol. ana q. s.

Rec.



Rec. Emplastr. Vigon. cum mercur. duplic. q. f.
Extens. ad alutam exhibe.

SECT. 1463.

Rec. Mercur. sublimari drach. j.
Aq. calcis viuae vnc. ij. M.
Hac aqua tangantur lenissime una vel altera vice.
Dein fiat aucta copia aq. calcis sensum lenior.

SECT. 1466.

Rec. Fol. recent. Scordii.
Abfinth.
Alliar.
Rutæ,
Rorismar. ana m. ij.
Flor. recent. Tanacet.
Centaur. min.
Card. bened. ana m. iſs.
Rad. Imperator.
Hellebori nigri, ana vnc. ꝑ
Cum aq. decoct. lib. v. admisce
Sapon. Venet. vnc. jſs.
Hoc fomento pudenda depurentur.
Rec. Mell. rosar. vnc. iv.
Mercur. sublim. corrosiu. drach. ſs.
Aq. stillat. rutæ vnc. x.
M. In eundem vsu.

SECT. 1468.

Rec. Rad. Gramin.
Chinæ,
Sarsaparill. ana vnc. ij.
Mord. mundati drach. vj.
Glycyrrhizæ vnc. jſs.
Cum. aq. decoct. spatio 2. horar. lib. iij. exhibe.

Bibat

M m 5



Bibat de hoc decocto vnc. iv. omni hora dicti.

SECT. 1469.

Rec. *Mercur. dulc. triti, gr. ix. F. una dosis.*

SECT. 1473.

Rec. *Fol. Sennæ, vnc. j.*

Agarici drach. iv.

Semin. carthami drach. ij.

Rad. ialapp. drach. j.

Cum aq. decoct. Vnc. xij. iniice pro *elysmate*.

Rec. *Diagryd. gr. xv.*

Syrup. rosar. solut. cum senna drach. vj.

M. *Pro una dosis.*

Rec. *Diascord. Syluii gr. xxiv.*

F. una dosis pro sudorifero.

SECT. 1474.

Rec. *Laudan. pari gr. iij.*

Corall. rubr. drach. j.

Sacchari perlati drach. ij.

M. F. Pulu, tenuissimus diuid. in vj. dos. æquales.

Capiat vnam omni $\frac{1}{4}$ horæ, donec sedetur dolor alui & diarrhœa.

Vel.

Rec. *Diascord. Syluii drach. j.*

Syrup. diacod. drach. ij.

Aq. stillat. cortic. citrei vnc. iv. M.

Capiat vnc. ss. omni $\frac{1}{4}$ horæ, donec sedentur modo dicta.

Rec. *Theriac. Andromach. vnc. ij.*

Extensam ad alutam applica abdomini in usum eundem.

SECT. 1475.

Vid. 1426.

RA.

RACHITIS.

1480. **M**edio fere labente seculo decimo sexto, in mediterraneis Britanniaë primo, deinde per totum hoc regnum, denique & per omnia Europæ borealis loca, ortus est morbus novus, hodie frequentissimus, qui *rachitis* appellatur.

1481. Infantibus ille nunquam connatus, raro ante nonum ætatis mensem, vix unquam post biennium vitæ, sed spatio hoc medio frequens, accidit.

1482. Maxime autem infestus habetur proli, cuius parentes laxa & debili conditione corporis; otiosi; molles; opipara mensa, cibis pinguibus, saccharatis, pauco pane, vinis dulcissimis, & aqua multa calida, vsi; morbis chronicis, venere, ætate, exhausti, tabi inprimis venereæ, & iteratis gonorrhœis, multum obnoxii; effectam ferme genituram impenderunt generandis liberis.

1483. Vbi vero nutricem iisdem affectam malis nactus est, magis augetur infanti præcoci incremento morbus.

1484. Inprimis si frigidius, humidiusque,

que, tractatur, aquosis, mucosis, crudis horæis, piscibus, farinosis azymis, & saccharatis, pascitur; febre autumnali intermittente, morbo chronico, vel acuto, diu laboravit; a scabië, herpete, vlceribus, suppressis male curatus; balneo, fotu, linimentis, vnguentis vaporibus humidis, enervatus; perpetuæ quieti in sella perforata addictus, nudato inferius corpore.

1485. Cognoscitur morbus hic incipiens in his, qui nondum incedunt, 1. ab ætate. 2. a causis prægressis. 3. a fratribus, sororibus, simili malo captis. 4. a tumore flaccido capitis, & faciei. 5. a cute laxa. 6. a tumore abdominis. 7. a macilentia reliquarum partium, imprimis musculorum. 8. a protuberantia epiphyseon ad iuncturas radii, vlnæ, humeri, genu, tibiæ, fibulæ. 9. a magnitudine arteriarum & venarum iugularium, dum reliquæ decrescunt.

1486. In illis vero qui iam ambulare inceperant noscitur adueniens malum. 1. ex omnibus antecedentibus. 2. ab incessu tardiore, infirmo, prolapsu, instabilitate, transeunte in assiduam sedendi voluntatem, mox abituram in decubitum perpetuum, tandemque in impotentiam motus quo-

quorumcunque artuum, collo flexili, capite nutante. 3. ab ingenii præmaturo acumine, sensuum sincero exercitio, appetitu & digestionem ferme illæsis.

1487. Adultior morbus exhibet magnum caput, futuris amplis interstinctum; thoracem ad latera compressum ad sternum in acutum assurgens, cum nodosis costarum extremis; abdomen protuberans; cariosos cum nigritudine dentes; quæ sensim aucta sæpe in omni vita perniciosos similes morbos creant, maxime spinam ventosam & cariem ossium.

1488. Toto interim decursu mali lenta febricula depascitur corpus usque in mortem; tumque cadaver omnes fibras, membranas, vasa, viscera, mollia, flaccida, humores solutos, mucososque, exhibet.

Quare causa proxima mali cacochymia iners, mucosa, frigida, vappida, latente forte leni labe venerea permista, cum laxa partium firmarum fabrica.

1489. Curatio optima fit. Cibo leui, eupepto, sicciori, minus pingui, aromatibus mitioribus condito, sæpe dato & copia moderata. Potu pauco, meraco, excereuisia imprimis non veteri quidem, at diu

diu cocta & spissa. Aëre sicco, & calidiusculo. Vestitu accurate sicco, & calefaciente, ex lana præprimis confecto. Decubitu super storeis ex aromaticis, roborantibus, exsiccantibus, herbis factis, in elatiori ædium parte, supra tabulata lignea. Gestatione, concussione, oscillatione, ventione in rheda super strata viarum, frictione multa, calida, sicca, pannis fumo aromatum perfusis instituta maxime ad abdomen & spinam. Cantharidum iterata quandoque applicatione, vomitoriis lenibus aliquoties cum prudentia repetitis. Purgantibus, deinde roborantibus per aliquot dies successiuos adhibitis. Denique vsu diu continuato medicamentorum roborantium, exsiccantium, antiscorbuticorum, & spiritus excitantium. An & immersio in frigidam prodest? an linimenta? & quæ?



IN RACHITIDE.

SECT. 1489.

Cibus optimus.

I. Panis bene fermentatus, biscoctus, cum admisto paucō croco, nuce myristica, cardamomo, cinnamomo,

mo, femine celeri, atque similibus gratissimis, & roborantibus, aromatibus.

2. Caro columbarum, gallinaceorum, cuniculorum, ouilla, hædina, vitulina, *macilenzior, leniter assa, minusim incisa*; dein *intermist*o pane biscocto, sale & *pauco* petroselini, thymi, nucis myristicæ, aut similium, parata.

3. Oryza, milium, hordeum, *cum aqua, & unis passis*, cocta; dein *cum pauxillo vini*, & leniorum aromatum, condita.

Potus optimus.

Vinum Gallicum maturum, rubrum, adstringens, *ter quaterue de die ad vnc. j. exhibitum.*

Vinum Hippocraticum *ita datum ad vnc. ss. eodem tempore.*

| | |
|-----------------------------|---|
| Cereuisiæ recen- tes, vt | { Mumma Brunsvicensis. |
| | { Ale Britanorum. |
| | { Cereuisia Bataua, quæ xij. florenorum |
| | { pretio venalis. |

Hiscæ æstiuo tempore aqua portio aquæ ferratæ medicatæ admisceri potest, in primis vero acidularum Spadanarum.

Rec. Folior. recens. in umbra ficcatorum,
Filicis maris, lib. iij.

Maioranæ,

Melissæ,

Menthæ, ana m. ij.

Flor. recens. in umbra ficcatorum,

Meliloti,

Trifolii odorati,

Sambuci,

Rosarum, ana vnc. ij.

Terantur in puluerem tenuem, misceantur duplo tanto
palcæ bordci, atque dein his linteis immixtis fiant le-
ctuli



Atoli & pulmonaria, quibus incumbant, quique ab humido rite defendantur, & sæpe exsiccentur.

Rec. Benzoini,
Mastiche,
Olibani,
Succini,
Thuris, ana vnc. j. M. F. pulu.

De hoc pulvere inspersum parum prunæ fumet, super hoc fumo panni lanci detenti, fricandis partibus adhibentur.

Rec. Radic. Ypecacuanhæ scrup. j.
Vini albi Gallici vnc. j.
Sacchari drach. ij.

Infusa totam noctem, depurata exhibe mane.
Hoc repetatur quarta quaque die, in vicem quintam.

Rec. Rbei selecti vnc. ss.
Myrobalani citrini, sine nucleis drach. iij.
Agarici trochiscati scrup. ij.

Infundantur frigida cum cerevisia fortioris lib. iv.

Post xxiv. horas paratus erit potus, quo utatur pro familiari quotidiano, spatio iv. septimanarum.

Si vero nimis inde purgetur, æqua copia cerevisia alterius dilui poterit, aut etiam maiore, si usus indicat.

Herbæ roborantes, siccantes, excitantes, anti-scorbuticæ, Rachitidi sanandæ propriæ.

Agrimonia.
Betonica.
Capparidis cortex ex rad.
Ceterach.
Cichoreum.
Cuscuta.

Diapensia.
Endjuia.
Felix mas.
Hepatica.
Lingua ceruina.
Melissa.

Myro-



| | |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| Myrobalani pruna. | Ruta muraria. |
| Osmunda regalis. | Scabiosa. |
| Polypodium. | Tamarisci <i>cortex flor. folia.</i> |
| Quercus <i>folia glandesque.</i> | Trichomanes. |
| Rhabarbarum. | Veronica. |
| Rubi folia & radix. | |

Ex his *cereuisiæ*, *vina*, *infusa*, medicata parari queunt, maximo cum fructu, aut & *condita*, & *similia* componi. ex. gr.

Rec. *Agrimoniæ*,
Ceterach,
Filicis radic.
Lingua Ceruinæ,
Polypodii radic.
Rutæ murariæ ana vnc. ij.

Minutim scissa, mista, linteo immissa, infundantur frigida, cum lib. xij. *cereuisiæ*.

Vel.

Rec. *Folior. & Flor. betonicæ* vnc. iij.
Cortic. radic. capparidis,
Tamarisci,
Rubi sylvestris,
Trichomanis, ana vnc. ij.
Limaturæ martis vnc. ss.

Cum *Vini* lib. viij. in frigore infusa adhibentur, *ter de die*, ad vnc. j.

Rec. *Entis Veneris Boylei* gr. ij.

Exhibe vesperi, ex *vino Canariensi*, *quotidie*, *spatio iij. septimanarum*.

Rec. *Limaturæ martis* vnc. j.
Aceti stillatit. acerrimi vnc. x.
Sacchari vnc. iij.



In phiala alta ebulliant leniter spatio xxvj. horarum;
filtratus liquor seruetur vase clauso.

*Dentur gutt. vj. bis quotidie, horis medicis, ex pauxillo
vini Hispanici.*

RHEVMATISMVS.

1490. **A**rthritidi, podagræ, scorbutoque, agnatus morbus frequentissimusprehenditur, qui *rheumatismus* appellatur.

1491. Quem antecedunt temperies sanguinolenta labe acri infecta, ætas mascula, victus lautior, calefacto corpori subito admissum frigus, autumnalis tempestas, perspiratio prohibita, diathesis inflammatoria lentior cruore pleuritico se manifestans. Cum febre continua incipiens, dolorem creat atrocissimum, dilacerantem, ad minimum motum sæuissime auctum, diu in vno loco fixum, iuncturas quorumcunque artuum obsidentem, cæterum genibus magis infestum, lumbis & coxendici, quandoque cerebrum, pulmones, viscera, excruciantem, cum
tumore

tumore & rubedine loci, periodico itu & reditu.

1492. Si durat, & augetur, sæpe post atrocissima tormenta articulum motu priuat, anchylosin creat, vix vlli cedentem remedio.

1493. Causa proxima eius videtur inflammatio in arteriis lymphaticis membranarum, quæ ad ligamenta iuncturarum, non tam sæua vt in supurationem eat. Curatur missione sanguinis; purgatione antiphlogistica repetita & semper vesperi per narcoticum sedata, balneo leni, tepido, fomentis antiphlogisticis loco affecto applicatis. Vesicatoriis validioribus, & cauteriis. Medicamentis summopere diluentibus atque emollientibus simul. Victu tenuissimo, quiete. Tepore lecti, & ad finem curationis frictione ficca, calida, vna cum vsu antiscorbuticorum.

1494. Si lumborum sedem occupans lumbago rheumatica, si coxam, ischiadicus vel coxarius dolor audiens,

N n 2

eadem

eadem methodo, licet paulo difficilius curatur.

1495. Hinc apparet morbi huius frequentia, varia admodum facies, summum periculum si cerebro vel pulmone incubuerit, maxima difficultas eum hic detegendi, discrimen in quod præcipitat calidiorum vsus, vel præmatura narcoticorum exhibitio.

F I N I S.



IN.



I N D E X

RERVM ET VERBORVM

IN APHORISMOS.

Numerus arithmeticus paragraphum,
non vero paginam denotat.

A.

| | |
|---|---|
| A bdominis vulneris <i>leuis</i> | 567. horum enumeratio |
| signa 306. cura 308 ad | 770 |
| <i>peritonæum</i> vsque <i>pene-</i> | <i>Α'γκύλωσις</i> 556 |
| <i>trantis</i> effectus 307 | Alimenta <i>quædam</i> putredi- |
| cura 308. in <i>cauitatem</i> | nis naturam in corpore |
| <i>penetrantis</i> signa 309 | adipiscuntur 80. <i>qua-</i> |
| cura 311. viscerum <i>illa-</i> | <i>dam</i> extra corpus. 81 |
| <i>forum</i> signa 310. <i>læso-</i> | Amputatio vid. extirpatio. |
| <i>rum</i> signa 312. effectus | Aneurisina <i>verum</i> 160. 176 |
| 113. cura 314 ad 321. | <i>spurium.</i> 178 |
| Abscessus quid? causa. fi- | Angina quid? 783. <i>duplex</i> |
| gna. 387. effectus. 406 | species 784. <i>sine tumore</i> |
| indicatio & cura 403 ad | 785. 786. <i>cum tumore.</i> |
| 413 | 787. 790 |
| Acrimonix acidæ origo 60 | Angina <i>aquosa</i> quæ? 791 |
| causæ antecedentes 61 | sedes 792. causæ 793 |
| sedes 62. effectus in <i>pri-</i> | effectus 794 cura. 796 |
| <i>mis viis digestionis</i> 63. in | Angina <i>convulsiva</i> , <i>paraly-</i> |
| <i>sanguine</i> 64. cura 66 | <i>rica, suffocativa.</i> 818 |
| morbus hic quibus <i>fami-</i> | Angina <i>inflammatoria</i> quæ |
| <i>liaris</i> 58 | 798. causæ 799. effectus |
| <i>Acuti</i> febriles morbi qui? | varius pro varietate par- |
| | N n 3 tis |

INDEX RERVVM

- tis 800 ad 806. prognos-
is generalis 806. 807. e-
xitus 808 cura. 809 ad
814
- Angina *suppuratoria* 814
gangraenosa 816. *scir-
rhosa* 797. 817. *cancro-
sa* 817
- Anginae prognosif ex *Hippo-
crate* 819
- Animalia, quæ succos ha-
bent acelcentes 78. quæ
acalescentes. 79
- Animalia quæ sponte inpu-
tredinem vergunt 83
- Anodynum pro varietate
causæ variat. 227
- Anthraces. 416
- Anxietas *febrilis*. 631. 634
- Aphthæ 978. quid sint? 979
980. causa 980. locus
981. quibus familiares
& quando? 982. causæ
antecedentes 983. dia-
gnosis 984. symptomata
984 ad 987 effectus 988
989. indicatio. cura 990
quæfita 991. *regulæ* pro-
gnosticæ 902
- Apoplexia 1007. 1008. *fu-
tura* quomodo præuidea-
tur? 1020. quomodo *præ-
sens* cognoscatur? 1021
causa proxima 1009. re-
motæ 1010. harum co-
gnitio vnde? 1011. mor-
bi diuifio 1012. locus
1013. *magnitudo* vnde
cognoscatur? 1015. in-
dicatio. cura 1022 ad
1036
- Apoplexiæ leuitas & *sana-
bilitas* vnde decernatur?
1016. quomodo solua-
tur ope naturæ? 1017
paulo grauioris effectus
& exitus 1018. *exquifi-
tæ* prognosif 1019.
- Arteria non nimis magna
transuersim disiecta 159
vulnerata non tota disse-
cta 160. quid si arteria
maior tota disiecta fit
161. si eius *tunica* exte-
rior vulnerata 176
- Atrabilaris humor qui?
1092. 1093. effectus
1095. cura 1097.
- B.
- Bilis atra 1102 cura 1103
Bilis atra *turgens* 1104
vis corrosiua 1105. cura
1106
- Borborygmi vid. ructus.
- Βρογχισμός quando insti-
tuenda? 812. quomo-
do? 813. quomodo ab-
soluenda? ibid.
- Bronchoceles causa. cura
1221
- Bubonum cognitio, prædi-
ctio,

ctio, curatio vnde petenda?

Bubonum *venereorum* locus 1448. cura 1461

C.

Cachexia quid? 1166. causa proxima *triplex* 1167. *prioris* causæ 1168. harum effectus 1169. 1170. *posterioris* causæ 1171. vt & *ultimæ* 1172. prognosif 1173 indicatio 1174. cura 1175 ad 1183

Calculus: eiusque Materies quid? 1414. in *renibus* vnde? 1415. diagnofis 1422. effectus 1416. indicatio 1424. cura 1425 ad 1428 in *peluim* delati effectus 1417. cura 1429. in *vrerem* delati effectus 1417. cura 1434 ad 1439. per *vrerem* in *vesicam* delati *expulfio* 1418. restitantis *accretio* qualis? 1419 *huius* natura vnde cognoscatur? 1420. diagnofis 1423. 1430. effectus, 1421. cura 1431 ad 1434. in *collo vesicæ* hærentis effectus cura

1439
Calor *febrilis* 673. diagnofis.

sis. *ibid.* causa proxima 674. *huius* proximæ 675 ad 685. *gradus caloris* vnde sciatur? 686. 687 effectus 689. cura 690 ad 698. *quæfita*. 698

Caluaria diuersimode lædi potest 254. diagnofis 255. effectus, prognosif 256. indicatio curatoria *quintuplex* 259 ad 265

Cancer quid? 492. causa proxima. *ibid.* remota 495. diuersitas 493. *occultus* qui? 494. *huius* diagnofis 498. sedes 496. effectus, prognosif 499. 500. cura. 509

Cancer *paruus* quomodo curetur? 501. *quæ* in curatione vitanda? 502

Cancer *magnus* quid indicet? 503 ad 508. *symptomatum* palliatio 508 prognosif. 505

Cancrorum *venereorum* locus 1447. cura. 1463 1464

Capitis vulnera quas partes lædant? 239

Capitis *tegumentum externorum* læforum diagnofis. 240. prognosif. 241 ad 245. cura 245 *symptomatum* ablatio. 246 ad 249

INDEX RERV

- Capitis concussus** validus
 quid efficiat? 274. dia-
 gnosis 275. indicatio, cu-
 ra. 282. 283
- Carbunculorum** cognitio
 prædictio curatio vnde
 sciantur? 416
- Caries ossis** vnde? 526
 541. 544. prognosis,
 cura 548. quæsitæ, 550
 ad 556.
- Carus** quid? causa, diagno-
 sis 1045. curatio *natura-*
lis 1046. *artificialis*, vn-
 de petenda. 1047
- Catalepsis** quid? varia eius
 nomina 1036. causa pro-
 xima 1037. huius pro-
 xima 1038. effectus
 1039. causæ anteceden-
 tes 1040. exitus in ali-
 os morbos 1043. anatomi-
 a quid demonstret
 1041. sanatio ope *natu-*
rae 1042. ope *artis* 1044
- Cataphora** quid sit? 1048
- Causos** vid. febris ardens.
- Cerebri intropressi** vel *intro-*
pulsi effectus 268
- Chronici morbi febriles** qui?
 567. causa generalis *du-*
plex 1050. *prioris* cau-
 sæ & cura 1051. *posterioris*
 effectus in *fluidis*, ho-
 rum cura 1052. in *solidis*,
 horum cura vnde pe-
 tenda? 1053. 1054. pro-
 gnosis 1056
- Cibus** quo tempore *febris*
 & qua copia dandus?
 600. ad 603.
- Colicus dolor** vnde? 959
 sedes 963. effectus 972
 prognosis. 973
- Coma febrile** quid? causæ
 703. antecedentes 704
 indicatio 705. cura. 706
 707
- Combustio** vnde? 476. gra-
 dus 477. cura. 479
 ad 484
- Consolidatio** in *osse* quo-
 modo fiat? 472. quo-
 modo in *carne*? 473.
- Contusio** quid? 321. eius
 idea 322. effectus varii
 323 ad 329. præsentis
 & partis affectæ diagno-
 sis 329. prognosis 330
 indicatio. 331. cura
 332 ad 387
- Conuulsio** quid? 230. cau-
 sæ 231. 232. effectus
 233. cura. 234
- Conuulsio febrilis** vnde?
 710. effectus 711. pro-
 gnosis 712. indicatio.
 cura. 713. 714
 Coxa.

ET VERRORVM.

Coxarius dolor 1494. vid.
rheumatilinus.

Cranii in *iunioribus*, intro-
pressi in *adultioribus* post
fracturam *intropulsi* ef-
fectus, prognosis 267. di-
agnosis 269. cura 270
271. 272

Cranium si *fissum fractum*
contusum sit quid inde?
273. diagnosis 275. pro-
gnosis 330. 3. locus *lesus*
intra cranium quomo-
do cognoscatur? 276
indicatio 277. 278. cu-
ra 279 ad 297

Crepitus. vid. ructus.

Cruor quid fit? 93. quo-
modo in serum resoluat-
ur? 94. eius motus au-
cti causa proxima 98
remota 99. effectus 100
signum pathognomi-
cum 101. curatio 102 ad
106

D.

Debilitas *fibræ* quid fit?
24. causa anteceden-
tes 25. effectus 26. cura
28

Debilitas *vasorum* & *visce-
rum* quid? 41. huius dif-

ferentia 42. causa 43
effectus. 44. cura & in
ea *obseruatio*. 46. 47
48

Debilitas *febrilis* vnde?
660. diagnosis 662. cau-
sa remota 661. vnde
cognoscantur? 663. ad
667. cura 667. vt & cau-
sarum 668. ad 672.

Delirium *febrile* quid? 700
diagnosis ibid. causa 701
cura. 702

Dentitio 1374-- 1378.

Desipientia vid. *παράφρε-
σιν*.

Diarrhœæ *febrilis* materia
causa 719. prognosis
720. effectus 721. cura
722

Dogmata medica quid ex-
plicant? 4

Doloris idea 220. diffe-
rentia 221. proprietas
221. causa proxima 223
remota 224. effectus
226. causa ablatio 228
sensus ablatio 229

Dolores sine *apparente tu-
more* in quibus vasis fi-
ant? 122

Dysenteria *blanda, subcruen-
ta*, *biliofa*, cui bono?
963

N n 5 Dysen-

INDEX RERVM

Dysenteriae *purulentae* cau-
sæ. Effectus 965. cura
966

Dysenteria *foetida cineri-
cia ichorosa liuida* &c.
quid indicet? quid præ-
fagiat? 969

Dysenteriae *siccioris* causa
973

Dysenteriae *acerrimae assiduæ* causa, effectus 975
Prognosis. ibid.

Dyspnoeæ causæ, effectus.
1202

E.

Elasticitas fibræ imminuta
29. vid. debilitas fi-
bræ.

Elasticitas nimia 36
vid. rigiditas nimia.

Emprosthotonus vid. spa-
smus.

Empyema quid? 1183. cau-
sa proxima 1184. 1185
prognosis 1192 ad
1196. effectus 1204
cura 1191. causæ ante-
cedentes harumque cura
vid. vomica.

Epidemici morbi qui? 1407
ad 1411. causa proxi-
ma 1409. antecedentes
1407. 1408. natura vn-
de cognoscatur? 1411

medico epidemicum cu-
raturæ quæ observanda?
1412

Epilepsia quid? 1071. pro
quo morbo olim habe-
batur? 1072. cur?
1073. causa proxima
1074. 1086 remotæ
per *δευτεροπάθειαν* 1075
1. *Πρωτοπάθειαν* ibid. 2
ἰδιοπάθειαν ibid. 3 *Συμ-
πάθειαν* ibid 4. 5. 6. ef-
fectus 1077. prognosis
1078. indicatio 1079
cura 1080 ad 1085
quaesitum de remedio
huic morbo specifico
1085

Erysipelatum cognitio, præ-
dictio, curatio unde pa-
teant? 380

Exanthematum *febrilium*
materies, causæ, nomina
723. cura. 725

Exostosis quid 549

Extirpatio ossis *quando* in-
stituenda? 464. in quo
loco 465. huius defini-
tio 467. 468.

ad *administrationem* quid
requiratur? 469. *actio*
quomodo fiat 470
symptomatum hanc se-
quentium cura 471 ad
467
F.

F.

Febbris qualis morbus?

558. in huius indagatione quæ obseruanda? 559. 562. diagnosis

563. signum pathognomicum 570

571. natura vnde cognoscatur? 569. causæ proximæ

572 ad 575. remotæ infinitæ 583. quæ diuiduntur in communes

siue *epidemicas* 584. vel in *singulares* 586. phænomena,

575 ad 580 effectus 587. prognos

588. 589. exitus in mortem 592. in alium morbum

593. in sanitatem & quomodo? 594. 595

indicatio *quadruplex*. 598. *Primæ* satisfit 599

ad 603. *Secundæ* 603. ad 609. *Tertiæ* 609 ad

617. *Quartæ* 617 ad 728

Febris acuta quæ? 564

causæ proxima 581. remotæ, 582

Febris ardens 738. causæ proxima 742. Antecedentes

740. diagnosis, effectus 739. prognos

771. cura. 743

Febris Autumnalis intermittens vehementis

cura.

767. 768

Febris continua quæ? 727

quæ *continua non putris*? 729. harum causæ, signa,

cura 728. 729. differentia. *ibid.*

Febris continuæ putridæ causæ 730. diagnosis

731. differentia 732

733. prognos 734. 735

cura 736

Febres continuæ remittentes quæ? 727. dicuntur & *συνεχῆς* 737

Febris ephamera seu *diaria* vid. *Febris continua*.

Febris intermittens quæ?

727. quæ *autumnalis* quæ *vernalis*? 747. phænomena

749 ad 752. Exitus in alium morbum

causæ 752. causæ proxima 755. effectus 753.

754 indicatio 756. 757

cura & qualis in initio. 758. Causæ proximæ tollendæ quid profit &

quando? 759. 760. quid noceat? 761. 762. in *ἀκμῇ* 763. in *decremento*. 764

symptomatum prophylaxis 765. ægrique *virium* restauratio

766. prognos. 769

Febris lenta siue *chronica* quæ? 565. *epidémica* siue

INDEX RERVM

- siue communis?* 566. *sin-*
gularis? *ibid.*
Febris continua *siue continens*
 737. *vid. febris continua.*
Fibrarum minimarum ori-
go 21. 23. *morbi.* 24
ad 38
Fibræ debilitas laxitas &c.
vid. debilitas &c.
Fistulæ 43. *harum causa*
 406. *apertæ & clausæ*
quomodo cognoscantur?
 414. *cura* 415. *clausa-*
rum effectus 417. *pro-*
gnosis. 418
Flatus. vid. ructus.
Flatus dolentes vnde? 960
Flexilitas fibræ vid. laxitas.
Fluida omnia ex arteria ma-
gna propulsa vnde secre-
ta sint. 92
Fluida in corde mista vnus
liquidi speciem referunt.
 92. *horum figura, sub-*
stantia, color. 93
Fluidum rubrum concre-
tum vid. cruor.
Fluor vterinus vid. graui-
darum morbi.
Fluoris albi a lue venerea
locus 1447. *cura* 1465
Fractura quid? 339. *quæ*
simplex, quæ complica-
ta? 340. *differentia* 341
effectus 342. 343. *dia-*
gnosis 345. *prognosis*
 346. *indicatio* 347. 348
cura 349 *ad* 357. *euen-*
tus. 357
Frigus febrilis 621. *causa*
ibid. effectus 622. *pro-*
gnosis 623. *cura mala*
quæ? 624 *optima.* 625
 626
Furunculorum cognitio,
prædictio, curatio vnde
petendæ 416

 G.
Gangræna quid? 419
locus 420. *causa pro-*
xima 388. *antecedentes*
 421. *efficientes* 423 *ad*
 425. *augentes* 389
 390. *signa futura* 426
præsentis 427. *progn-*
osis 430. *ad* 433. *indi-*
catio 433. *cura* 434 *ad*
 442
Gangrænæ inueteratæ ef-
fectus 442. *indicatio*
 443 *ad* 446. *cura* 446
ad 354
Gangrænæ ab impactu a-
cri Gelu factæ cura 454
ad 457
Glutinosum pingue vnde?
 60. *causæ antecedentes*
 69. *sedes* 70. *effectus*
in primis viis 71. *in*
san-

sanguine 72. 73. cura
75
Gonorrhææ locus 1447. cu-
ra. 1458. 1459
Grauidarum morbi 1293
causa duplex. 1294
1295. prioris effectus
1296. cura 1297 ad
1301. posterioris effe-
ctus 1301. cura 1302
fluor uterinus grauidis
qualis morbus. 1303
causa 1304. diagnosi.
1305. causæ remotæ.
1306. cura 1307 ad
1310

H.

Hæmorrhagiæ causa, pro-
gnosis 160. 161. cu-
ra 218. *reuulsio* an hic iu-
uet; & quando? 219
Hæmorrhoidum *cæcarum*
causa 959. sedes 963 so-
lutio. ibid.
Hæmiplegia quid? 1018
prognosis 1062. reliqua
vid. in *paralyfi*.
Hepatis, vsus humor, situs
950. circa eiusdem mor-
bos horumque effectus
quæsitæ. ibid.
Hepatis inflammatio siue

hepatitis 914. sedes 915
causæ antecedentes 916
effectus 917. 918. exi-
tus in *sanitatem* ope
naturæ 919 ad 930
signa perfectæ sanatio-
nis 931. in alium mor-
bum puta *suppuratio-
nem* 933. signa huius
futuræ 934. factæ 935
effectus, prognosis 936
ad 943. cura 942. ad
945. *scirrbum* eiusque
effectus 946. prognosis
947. *calculus hepatis*
948. in *mortem*, 949
prognostica 950

Humores in homine viuo
quales reperiantur? 58
crudi, vnde hauriantur?
59

Hydroccelarum variæ spe-
cies 1227. harum cau-
sæ, diagnosi. ibid. cura
1252

Hydrocephali locus 1217
prognosis, cura. 1218

Hydrops quid? 1215. lo-
cus. 1216 ad 1228
causæ proximæ 1228
remotæ 1229. effectus
1230. indicatio *tri-
plex*. 1231. *primæ* sa-
tisfit

INDEX RERVM

- tisfit 1232 ad 1238. *secundae* 1238 ad 1250
tertia 1250. *quaesita*
 1253
 Hydrops ἀνὰ σάρα. 1225
 - - ἀσκήτης. 1226. 939
 - - *asperae arteriae.* 1221
 - - *glandularum.* 1222
 - - λευκοφλεγματία. 1225
 - - *oxariorum.* 1223
 - - *pulmonis.* 1220
 - - *thoracis.* 1219
 - - ὑπὸ σάρα. 1225
 - - *uteri.* 1224
 Hydrops tympanites. 1226
 939 cura. 1251
 Hypochondriaci morbi origo causa sedes 1098. effectus 1099. prognosis 1100. cura. 1101

 I.
 Icterus *multiplex* 914. *primae speciei benignae* dictae origo 918. cura 919 ad 930. *secundae, paulo grauioris* cura 930 ad 933. *tertia, peioris* causa 937. prognosis 938 *quartae, nulla arte finibilis* causa 939. *quintae, valde periculosa*, diagnosis 940. *sextae, cito lethalis* conditio 941 cura, si qua, 942. *septimae, perpetuae* productio 946. palliatio 947. *octauae, subitae & ingentis* meta 949. prognostica circa ieterum. 950
 Ileici causa, diagnosis, prognosis. 961. 962
 Infantum morborum causa *prima*: sc. strigmenta glutinosa 1340. effectus 1341. cura 1342. 1343
secunda: meconium non satis cito expulsum. 1344 effectus 1345. cura 1346 1354. *tertia*: lac in stomacho coagulatum 1354 effectus 1355. cura 1356 ad 1359. *Quarta*: *vermes* 1359. horum generatio 1360. 1361. quibus minus familiares 1362. figura 1363. effectus 1364 ad 1367. prognosis 1366 1367. diagnosis 1368 cura 1369 ad 1374. *dentitionis* effectus 1374 1375. cura 1376. 1377. *convulsionum* sanatio 1378
 Inflammatio quid? 371 eius nomen 370. sedes 373. 374. causa proxima 372. causae stagnationem in arteriis minimis efficientes 375 ad 378 in *vasis lymphaticis arteriosis* 378. in omni vase

ET VERBORVM.

se conico 379. eius di-
 uersitas cum aliis morbis
 380. diagnosi & effe-
 ctus 381 ad 386. sana-
 tio beneficio naturae 386
 exitus in *suppurationem*
 387. in *gangraenam*.
 388. in *sphacelum* 389
 ad 392. in *scirrhum* &
 quando? 392. prognosif
 393. indicatio *quadru-*
plex 395. *primae* satisfit.
 396. *Secundae* 397. *ter-*
tiae 398. 399. *quartae*
 400. *quæfita* 401
Inflammatio *primi* generis
 in quibus vasis; in quibus
secundi accidat? 122
Instituta physiologica medi-
 ca quid explicant. 4.
Intestinorum inflammatio-
 nis causæ 959. diagnosi,
 effectus, prognosif 960
 ad 964. exitus in *absces-*
sum signa effectus 965
 cura 966. in *gangrae-*
nam 967. huius futuræ
 signa 968. præsentis 969
 Prognosif ibid. 970. cu-
 ra ibid. in *scirrhum* 971
 huius diagnosi 972. ef-
 fectus 973. prognosif
 975. cura 974. 976. in
cancrum : quomodo?
 976. huius palliatio. ibid.
quæfita. 977

Ischiadicus dolor 1494
 vid. *rheumatismus*.

L.

Lac stagnans vide puer-
 perii morbi.

Laryngis inflammatae de-
 scriptio 802. cura 809

Laxitas fibræ quid? 29. vid.
debilitas.

Laxitas vasorum & visce-
 rum vid. *debilitas*.

Lethargus quid? 1049. co-
 gnitio, curatio vnde pe-
 tendæ? ibid.

Lienis affecti historia vnde
 petenda? 958

Liquida nostra vnde confi-
 ciantur? qualem indo-
 lem in nobis acquirant?
 60. ex animalium parti-
 bus confecta varia sunt.

77. 78. 79

Lochiorum fluxus vid. pu-
 erperii morbi.

Lues venerea vid. venerea
lues.

Lumbago rheumatica 1494
 vid. *rheumatismus*.

Luxatio quid? 358. 359
 causæ. 361 ad 364. pro-
 gnosis. 366. indicatio.
 367 cura 368. 369.

M.

Macularum *rubrarum*
cognitio prædictio.
 cura.

INDEX RERVM

- curatio vnde noscantur? 416
- Mania** quid? 1118. causæ &c. vt in *melancholia* 1119. diagnosi 1120 quid anatomia demonstrat? 1121. huic morbo *princeps* remedium. 1123 sanatio ope *naturæ* 1124 quando oritur hic morbus 1125. huic proficua, nocua 1126
- Maniæ** natæ in *robustis* &c. hominibus cura. 1127
- Meconium.** 1344. 1359
- Medela** *vniversalis* quæ? quæ *propria*? 9. vtraque vnde reperiatur? 10 ad 14
- Medullæ** a *contusione ossis* læsæ effectus. 325
- Melancholia** quid? 1089 causa proxima 1090. huius causæ, effectus &c. vid. *atrabilarius succus* 1092. causæ euidentes 1109. sanatio *naturalis* 1110 *artificialis*. 1113 ad 1118
- Melancholicus** succus qui? vid. *atrabilarius*.
- Membranae** vulneratæ, vid. *nerui*
- Membri virilis** inflammationis exitus 1449. cura. 1460
- Morbus** quid? 1. quando effectus *corporeus* dicitur? 7. huius ablatione quid fiat? 8. hæc quomodo fiat? 9. morbi cognitio & curatio quæ requirant. 4
- Morborum** describendæ historiæ & curationi ordo optimus qui? 14. qui huius tractationis? 16 ad 21
- Morbi** qui *temperiei*, vel *congeniti* falso habentur. 44
- Morbi** ex *excessu* circulationis 92 ad 106. ex *defectu* 106
- Morbi** acuti vid. *acuti*.
- Mundatio** vulnerum *artificialis* quæ? 260. quæ *naturalis*? 261
- Musculorum** *contusione* læsorum effectus. 325
- Musculorum** *ossi hyoidi & laryngi* eleuandis serui-entium inflammationis signa 803. cura. 810
- N.
- Nauseæ** *febrilis* causa proxima, remotæ, harumque diagnosi 642 effectus 643 cura. 644 quæsitæ. 645
- Nephritis** quid? eius diagnosi 993. causæ 994 effectus.

ET VERBORVM.

effectus 995. cura boni-
tate *naturæ* 996. *artis*
997 ad 1001. exitus in
suppurationem 1001. huius
futuræ, præsentis signa,
cura *ibid.* effectus 1002
in *scirrhum* 1003. in
calculus renalem 1004
in *gangrænam*. 1005
Nervi *visibilis* origo, stru-
ctura, liquor, vis contra-
ctilis. 181
Nervi *partium integre dis-*
sectarum effectus qui?
182. qui si *totus* nervus
difsectus sit? 162. *se-*
cti vel *puncti* diagnosis
effectus prognosis 163.
183. 184

O.

Observatio medica vnde
habeatur? 11
Obstructio quid? 107
causa proxima 108. re-
motæ 109 ad 119 ef-
fectus 120 ad 124. cura
125 ad 144
Oedema in quibus vasis fiat?
122. eius differentia cum
inflammatione vnde pa-
teat? 380
Omenti affecti historia vnde
haurienda? 958
Opisthotonus. vid. *spasmus*.
Ossa, morbos similes quos

molliores partes patiun-
tur 512. cur? 513. *quin-*
ruplici morborum serie
distinguuntur 514 ad
526. prima adscribitur
interstitiis ossium 513
ad 518. morborum cau-
sa 513. 516. 531. effe-
ctus 531. secunda *vesi-*
culis ossium. Harumque
liquori 518. morborum
causa. Effectus 526. pro-
gnosis 527. 528 tertia
ossis *tegumento externo*.
520. morborum causa
531. prognosis 533. ha-
rum *omnium* cura 534
quarta ossis *tegumento*
interno 522. morborum
causa 531. 543. exitus
in *gangrænam* 543. in
cariem ossis 544. huius
diagnosis 545. cura 546
cura si *suppuratio* vel
gangræna adsit 547. 548
quinta *vasis & vasculis ve-*
ficularum ossium 524
diagnosis & effectus mor-
borum 526. cura 534
Ossium inflammationis in
suppurationem vergentis
signa 535 huius præsen-
tis signa 536. effectus
537. cura 538. in *gan-*
grænam 540. in *cariem*
541 cura. 542
O o P.

INDEX RERVM

P.

Pancreatis affecti historia
vnde haurienda? 958

Paralysis quid? 1057. causa
proxima 1058. remota
1059. 1060. effectus
1061. prognos 1062
1063. sanatio ope *naturae* 1064. indicatio 1065
ad 1068. cura 1068 ad
1071

Paraphrenitis quid? 907.
diagnos 909. prognos
910. 913. cura 911. 912

Paraplegia quid? vnde? 1018
prognos. 1062

Parapoplexia effectus 1015

Παραπλοσύν quid? 771. §.
2. causa proxima 776
antecedentes 772. §. 2.
cura 782. reliq. vid. in
phrenitide vera.

Partus difficilis causa *du-*
plex 1310. prioris causae
& cura 1311 ad 1317
posterioris causae signa
effectus cura 1317 ad
1322

Pericranii laesi diagnos
249. causa 250. effectus
251. cura 252

Periosteum vid. ossium mor-
bi.

Peripneumonia *vera*? 820
sedes ibid. 821. 822. cau-

sa proxima 820. remota
824. effectus 825. 826
prognos 823. 827. 828
847. 848. exitus 829
in *sanitatem resolutione*
benigna 830. 1. hanc iu-
uantia 850. *spuri eua-*
cuatione 830. 2. hanc
promouentia 851. impe-
dientia 864. hinc effectus
qui? 865 cura 866. *al-*
ui excretionem 830. 3. huic
proficua, 852. *urinae e-*
missione. 840. 4. hanc
efficientia 853. in *alium*
morbam 831. puta in
suppurationem 832. dia-
gnos huius futurae 833
iam iam instantis 834. fa-
cta 835. effectus 836. cu-
ra 835 ad 859. in *ab-*
scessus ad alia loca 837.
horum futurorum circa
pulmones signa 836. cu-
ra 858. 859. diagnos
vergentium ad *crura*.
839. ad *aures* 840. pro-
gnos 842. cura 860. ad
hepar 841. cura 861. in
tumorem scirrhusum, cal-
losum 843. cura 862. in
gangraenam 844. pro-
gnos ibid. 863. in *mor-*
tem 848

Peripneumoniae *notbae* inua-
sionis tempus causa pro-
gno-

- gnosis 867. 868. dia-
gnosis 872. quibus fami-
liaris; quibus minus? 871
874. cura *salutaris* 873
minus *salutaris* 869
870
Peruigilium febrile quid?
708. causa proxima ibid.
exitus. ibid. cura 709
Pharyngis inflammata signa
effectus prognosis 801
815 cura 809
Phlegmones cum inflamma-
tione differentia, vnde
sciatur? 380
Phrenitis vera quid? 771
causa proxima 776. re-
motæ 777. antecedentes
772. diagnosis 773. pro-
gnosis 774. quid anatomi-
a demonstret? 775. cu-
ratio ope *naturæ* 779. *ar-*
tis. 781
Phrenitis symptomatica vid.
παρεργασίη.
Phthisis pulmonalis quid?
1196. causa proxima.
1197. remotæ 1198. 1203
1204. diagnosis 1199
cura 1200. prophylaxis
1201. prognosis 1207
reliq. vid. in *vomica*.
Rhymatum cognitio, præ-
dictio, curatio vnde pe-
tendæ? 416
- Plantæ** sponte *alcalescentes*
quæ? 76
Plethora quid? 106. *α.* cau-
sa proxima ibid. *β.* remo-
tæ. ibid. *γ.* effectus dia-
gnosis prognosis. ibid. *δ.*
cura. ibid. *ζ.*
Pleuritis quid? 875. quæ
humida; quæ *sicca*? 876
vtriusque sedes 877. quæ
vera; quæ *spuria*? vtrius-
que locus 878. quæ *idio-*
pathica? quos & quando
infestet? 879. 906. quæ
symptomatica 880. cau-
sa proxima 882. antece-
dentes 881. effectus 883
prognosis 901. 904. 906
exitus in *sanitatem au-*
xilio naturæ 885 ad
890. *auxilio artis* 890
891. in *alios morbos* pu-
ta in *suppurationem* 892
signa huius futuræ ibid.
præsentis 893. in *absces-*
sum, huius diagnosis, ef-
fectus 894. cura 895. in
empyema 896. cura ibid.
in *scirrhum callum* hu-
ius diagnosis, effectus,
897. cura 898. in *gan-*
graenam 899. huius cau-
sa 900. futuræ & instan-
tis signa 901. præsentis
signa effectus 904. in *mor-*
tem. 905
Pleu-

INDEX RERVM

Pleuritidis *siccæ* causâ effectus 901. cura 902. 903.

Podagra quid? 1254. diagnosis 1261. causâ proxima 1262. 1263. huius origo 1255. antecedentes 1258. 1265. remotæ. 1266. 1267. locus 1259. 1264. signa instantis *paroxysmi* 1257 progressus 1260. prognos 1263. 1269. quæsitum an *V. S.* profit? 1270. an *purgatio*? 1271. an *sudorifera*? 1272. indicatio duplex 1274. *primæ* fatiscit 1275. *secundæ* 1276. *doloris* sedatio 1278 1279. *matæriæ* impeditæ & introuersæ causæ signa effectus 1273. cura 1281 quæsitâ 1282

Podagræ *rophaceæ* cura 1274 ad 1278

Praxis medica quid? 2. eam tradituro quæ scitu necessaria 3. 5. 6. quæ agenda. 11. 12. 13

Puerperii morbi 1322. *doloris* post *partum* causæ 1322. harum ablatio 1323. 1324. *Lochiorum nimii fluxus* causæ 1325 cura 1326 ad 1329. *febris* ut & *Lochiorum reterentorum* causæ effectus,

1329. cura 1330 ad 1334. *lactis stagnantis* effectus 1334. diagnosis 1335. cura 1336. in *apostema* vergentis cura 1337. lactantis *papillæ doloris* ablatio 1338. lactis nimis abundantis temperatio. 1339

Pustulæ inflammatoriæ erysipelatosæ scarlatinæ, &c. vid. exanthemata febrilia

Putredo quid? 82. causæ 84. effectus, 85. 86. cura 88

R.

Rabies *canina* 1128. cur ita vocetur? 1129. unde oriatur? 1130. quibus frequentius? 1133. causæ antecedentes. 1134 efficientes. 1136. *incipientis rabiei* signa ut & gradus in *animalibus* 1135. in *homine* 1138 diuersitas temporis respectu inuasionis 1137. prognos. ibid. quid anatomia demonstret? 1140 indicatio 1141. 1142 prophylaxis 1143. cura morbi *præsentis*. 1144 quæ nocent 1145. an *specificum* detur? 1147 Rachii-

Rachitis eius prima *natiui-
tas* 1480 quibus familia-
ris 1481. causa proxima
1488. § 2. anteceden-
tes 1482 ad 1485. signa
incipientis in nondum
incedentibus. 1485. in
iam *ambulare incipienti-
bus* 1485. diagnosis *fa-
cta*. huiusque effectus
1487. Symptomata 1488
cura. 1489

Ratiocinium medicum quid
efficiat? 13

Rheumatismus quibus mor-
bis agnatus 1490. causa
proxima 1493. anteceden-
tes 1491. effectus
1492. prognos 1495
cura 1493

Rigiditas *fibræ* nimia quid?
31. causa 32. effectus 33
cura. 35

Rigiditas nimia *vasorum &
viscerum* quid? 50. cau-
sa 51. effectus 52. cura
54

Ructus diagnosis causa pro-
xima 646. remota 647
648. effectus 649. cura
650. quæ sita 651

S.

Saluatio *mercurialis* in
quo morbo instituenda?
1467. ante institutionem

quæ applicanda? 1468
quomodo producat? 1469.
quamdiu? 1470
quæ copia 1471. quomo-
do excitetur? 1472. quo-
modo sistatur 1473. si ad
aluum ruit, quomodo de-
tineatur 1474. quomodo
absoluatur 1476. 1477
Symptomatum ablatio
1475

Sanatio quid? quid requirat
4. quid efficiat quomodo
5. per quæ 6

Sanguinis concretionis cau-
sa 96. eius rubedo vnde

Scirrhus quid? 392. causa
proxima ibid. remota.
484. antecedentes 485
sedes 484. effectus 486
prognosis 488. 489. cura
490. 491. differentia cum
inflammatione vnde pa-
teat 380

Scorbutus quibus frequentis-
simus 1148. 1150. causa
proxima 1153. effectus
prognosis 1151. indica-
tio 1156 ad 1160. cura
1160 ad 1166. quæ sita
circa *curam* 1165. §. 2.
diagnosis *speciei primæ*
1151. cura 1160 *secun-
dæ* 1151. 2. cura 1161 ad
1164. *tertiæ* 1151. cura
O o 3 1164

INDEX RERVM

1164. *quartae* 1151. 4.
cura. 1165
- Serum quid? 93. quomodo
in liquidum tenuius re-
soluatur. 95
- Siccitatis *febrilis* causæ na-
tura effectus cura 699
- Sinus vid. fistulæ.
- Sitis *febrilis* causæ diagno-
sis 636. 637. prognosis
638. indicatio 639. cura
640. 641
- Spasmi singularis opisthoto-
ni emprosthotoni tetani
vniuersalis origo sanatio
&c. vnde hauriendæ
1088
- Sphacelus quid 419. locus
420. causa proxima 390
391. antecedentes 422
ad 426. signa *futuri*
427. 428. *praesentis* 429
prognosis 430 ad 433
indicatio 457 ad 460. cu-
ra 460 ad 476
- Spina ventosa 549. eius cau-
sa 526
- Sudoris *febrilis* causa pro-
xima 715. effectus 716
indicatio 717. cura 718
- Suppuratio vid. abscessus.
T.
- T**abes *renal*is vnde? 1002
Tabes *lenta* in *crure*
vnde? 1003
- Tendines *vulnerati* vid.
nerui &c.
- Terebrationis *usus* 282. lo-
cus vnde cognoscatur?
283. quæ obseruanda *an-*
te institutionem 284 ad
287. 288. *post* instituti-
onem? 289. 290. 292
cranium perforatum esse
vnde sciatur 291
- Testium *tumidorum* exitus
1450. cura 1462
- Tetanus vid. spasmus.
- Thoraci vulnerum inflictio-
rum *nec in caua* pene-
trantium signa 297. *ob-*
liquorum descendantium
effectus 298. cura 299. *in*
caua penetrantium dia-
gnosis 300. effectus 301
effusi cruoris signa 302
cura 303 ad 306
- Tonsillarum* inflammata-
rum signa effectus pro-
gnosis 805. cura 811
- Tophorum *durorum* effectus
1456. cura 1479
- Tormina cum borborygmis
vnde 960
- Tremoris *febrilis* causa 627
effectus 628. prognosis
629. cura 630
- Trepanum terebra vid. tere-
bratio.

V.

Variolarum morbi *descrip-*
tionis auctor optimus
 qui? 1379. *qualis* mor-
 bus eiusque *natura* pro-
 gnosis quoad *tempus* in-
 vasionis 1380. quibus *fa-*
miliarissimus, quibus *fa-*
cilior, quibus *peior*? 1381
status primus contagii di-
 ctus quomodo suscipia-
 tur 1382. huius effectus
 1383. 1384. *diagnosis*
 ibid. *duratio*, *prognosis*.
 1385. *causa proxima*
 1386. *morbus hic a mor-*
bo inflammatorio vnde
 distinguatur? 1387. in-
 dicatio *huius status* 1388
cura 1389 ad 1393. *me-*
thodus uniuersalis in
 morbo inflammatorio
 cur *hic* adhiberi possit?
 1393. in quibus consistat
 1394. quid efficiat? 1395
status secundus quomo-
 do se habeat? 1396. *signa*
futurarum papularum.
 1387 *praesentium* 1396
 harum *locus* ibid. effectus
 ibid. exitus in *suppura-*
tionem, *abscessum* ibid.
 in *gangraenam* 1397
prognosis 1398. indica-
 tio curatio 1399. *tertius*

status eiusque *sequelæ*
 1400. 1401. *cura* 1402
prognosis 1403

Vasorum *minimorum* origo
structura morbi 38. *ma-*
iorum origo *structura*
duplex morbi *genus* 39
 41 ad 58

Venereae luis *primus ortus*
 1440. fit *contagiosa*
 1443. quomodo 1441
locus vbi primo se prodit
 1440. *diagnosis* in *hoc*
loco 1444. in *aliis* 1445
 horum *affectorum* effe-
 ctus 1446 ad 1457. *cura*
 1458 ad 1480. imprimis
saliuatio mercurialis si
 morbus in summo gradu
 vid. *saliuatio* 1467

Ventriculi *inflammari* cau-
 sæ *signa* effectus 951
Prognosis 952. *cura* 954
suppurati *diagnosis* ef-
 fectus *cura* 955. *scirrbo-*
si vel *cancerosi* facti *signa*
 effectus 956. *cura* 957

Vermes 1359-1369

Virginum morbi 1283. cau-
 sæ *antecedentes* 1284
remotæ 1285. effectus
 1286. 1287. *diagnosis*
 1288. *cura* 1289 ad
 1292. *symptomatum* ab-
 latio 1292

INDEX RERVM ET VERBORVM.

- Viscërum contusorum** effectus 327
Voluuli vnde? 960
Vomica pulmonum 1185
 1. *pleurae* ibid. 2. *diaphragmatis* ibid. 3. *mediastini* ibid. 4. *pericardii* ibid. 5. *causæ* ibid. signa futurarum 1186 præsentium 1187. effectus 1188. 1206. prognosis ibid. cura 1189 1190. 1208 ad 1214
Vomit *febrilis* quid? 652 causa proxima ibid. huius causæ 653 ad 656. effectus 656. cura 657. 658 quæsita 659
Vulnus quid? 145. causa subiectum diagnosis effectus 146 ad 149. differentia 150 ad 157. phaenomena 159. *oculo patientis* natura quomodo noscatur? 167. quomodo absconditi? 168 prognosis 169 ad 175 indicatio *quadruplex* 145. *prima* 186 ad 189 *secunda* 189 ad 210 *tertia* 210 ad 217 *quarta* 217
Vulnera capitis thoracis abdominis vid. capitis &c. vulnera
Vulnera arteriæ nervi &c. vid. arteria nervus &c.
Vulnera incurabiliter *lethalia* 150. 151. vnde prædicentur? 170
Vulnera sua natura *lethalia, arte vero curabilia* 152 vnde cognoscantur? 171
Vulnera ex non *lethalibus* *lethalia* facta 153. vnde renuntientur? 172
Vulneris inter firmas partes *descendentis* cura. 237. 238
Uterinus *fluor* 1303. 1310.

INDI-



INDICATIONVM ET FORMVLARVM,

in libello de materia medica comprehensarum.

I N D E X,

Cuius numeri paginas designant.

A.

Abstergentia quæ, & quænam horum materies 30

Abstergens, *in vulneribus* medicamentum. 103

Absterfua, *in anxietate febrili*, quænam sint. 236

Acida salina. 40

Acidi *absorbentia*. 35

- *diluentia* ib. & 28

- *immutantia* 36

Acidi *obtrudentia* 35

Acido aultera fossilia 13

- - *vegetabilia* 10

Adstringentia, quæ *cruorem coagulant* 106

- - quæ *vasa contrahunt*. ib.

Adstringens liquor *in narium hæmorrhagia*. 346

- puluis, *ad amputationes*. 183

Alcalina salina fixa. 40. volatilia ib.

Alimenta & potulenta *fibræ forti constituendæ apta* 8. seq.

- antacida *ex animalibus* 33 & 34. *ex vegetabilibus* 33. 34

Alcahest Glauberi, *in podagra* 492

Alui emollientia 96

Alium, *in ictero inflammatorio* subducentia 347

Animalia antacida pro alimentis 33. 34

- *succos acescentes habentia* 56. 57

- *stimulantia* 45

O o 5

Ano-

INDEX II.

- Anodyna 97
 - *in scirrbo non mouendo* 190
 Antacida 33 ad 36
 - *pro infantibus*, medicamenta 516
 - *puerperis ex lacte laborantibus* 506. & vide
 507. tum 55. 56 & 35. 36.
 Anthelmintica, *vide* vermes necantia.
 Antinephritica vera 373
 Antiscorbutica acriora 442. &c
 - calida 445 &c. sed vide 442. &c.
 - frigidiuscula 444
 - modice adstringentia ibid.
 - *rachitidi sanandae* propria 556
 - specifica leniora 441 *seq.*
 Antispasmodica, *in vulneribus*. 110.
 Aperientia deterfiua, *ad vlcus apertum pulmonis* 311-113
 - diluentia, *in cancro*, blanda 196
 - emollientia, *ad calculum*, laxantia; pellentia 539
 seq.
 - *in Febris Intermittentibus*. 275
 Apophlegmatifantia *in Apoplexia*. 385
 Aqua, *in glutinoso spontaneo*, aromatica, stimulans 47
 Aquosa emollientia. 17. *seq.*
 Aromata, *in glutinoso spontaneo*, cibis potibusque con-
 diendis apta 39
 Aromatica acria, *in plethora*, pro condimentis cibo-
 rum & potuum. 64
 - stimulantia varia 41 *seq.*
 Attenuantia, *in obstructione*, mercurialia 73.
 - digerentia *in scorbuto lento* 440.
 Attrahentia quæ, & quamnam horum materies 74

B.

- Balneum *ad glutinosa* 49
 - *in gonorrhœa venerea*, pro partibus virilibus
 546
 Balsami vulnerarii, *ad vulnera pura*, 101

Balsa-

INDICATION. ET FORMVL.

Balsamica, in *Phthisi*, lenissima 462

Balsamus, in *Apoplexia lenta*, 386

Biliofa stimulantia 49

Bolus purgans *antiphlogisticus* impetum cruoris minuens 154

- in *anxietate febrili*, purgans 235

- in *Lue venerea*, sudoriferus ad salivationis impetum minuendum 550

C.

Cancrorum fluviatilium ius 27

Cardiacus potus calidus, in *gangraena ex gelu*, resocillans 177

Carnem generantia in *vulneribus* 104

Cataplasmata, in *abscessu*, emortua resoluens, maturans 160. 161

- in *angina inflammatoria*, laxans, emolliens &c. 291

- in *Aphthis*, emolliens 367

- ad *Bubones venereos*, suppurans 548

- in *Combustione*, resoluens 186

- ad *contusa*, laxans, penetrans resoluens 137

- *Escharam gangraenosam* emolliens, diaphoreticum, anodynum 177.

Cataplasmata, in *gangraena*, 174. 176

- *Hydrocele*, discutiens valide 483

- *Inflatione membri virilis*, discutiens, anodynum, 548

- Narcoticum, demulcens 100

- pro *puerperis ex lacte laborantibus*, discutiens 507

- ad *scirrhum*, emolliens, resoluens 189

Caustica *abscessus* aperientia 161

- in *Angina scirrhusa* 288

- ad *Cancros venereos* 549

- in *sphacelo*, acria 462

Cereuisia medicata *antiscorbutica* 444

Cereuisia

INDEX II.

- Cereuisia medicata in glutinoso spontaneo*, stimulans 48
Hydrope, lymphæ fluorem concilians 479
Rachitide purgans, roborans 556
 excitans, roborans, 557.
- Cicatrisantia* 105
- Clyfma*, in *angina inflammatoria*, nutriens 292
 purgans 291
- Clyfma*, in *aphthiis*, laxans 367
- *Apoplexia acra* 386
 - *ad calculum*, aperiens, laxans, molliens, pel-
 lens, ex quibus fiat 540
 - in *febris*, motum temperans, refrigerans 226
 - *infantibus*, intestina lubricans 515
 - - a lactis aciditate laborantibus 516
 - - *Meconii* duritiem emolliens 515
 - *Lue venerea*, salivationis impetum minuens 550
 - *Peripneumonia notha* 318
 - *Rabie canina* 432
 - *Variolis*, laxans 531
 - *Ventriculi inflammatione* 351
 - *Vermes* expellens 520
 - in *Vulneribus abdominis* 331
- Collutorium*, in *aphthiis*, laxans, detergens, &c. 367
deciduis, demulcens ibid.
- *Apoplexia*, pressionem in cerebrum minuens 385
 - *pro infantibus in dentitione*, emolliens 520
- Collutorium*, *ad scorbutum* 445
- Condimenta*, in *glutinoso spontaneo*, cibi & potus,
 aromatica 39.
- in *plethora*, ciborum & potuum, acria aro-
 matica 64
- Condimenta*, in *gangræna*, putredinem incipientem
 corrigentia 174
- Conditum*, in *febrili languore*, aromaticum &c. exci-
 tans 227

Condi-

INDICATION. ET FORMVL.

- Conditum, *in fibra laxa*, adstringens 12
- *Glutinoso spontaneo*, stimulans 46
 - *Hydrope*, lymphæ fluorem concilians 479
 - *Mania, a debilitate corporis*, roborans, cardiacum 420
 - *Narcoticum* 99
 - *in phthisi pulmonali*, incrassans, stipticum &c. 462
 - *ad vermes*, nidum destruens 517
 - *Vlcus apertum pulmonis*, aperiens, detergens 313
- Conserua, *in phthisi pulmonali*, refrigerans, stiptica, &c. 462

Contusa quæ digerunt, 123

Corrodentia, *in vulnere*, 103

Corrosiua *in hæmorrhagia* 106

Cortices aromatici stimulant 44

Corticis peruiani, præparationes 277

Cremor panis, *pro debilibus*, quomodo fit 9

Cruorem coagulatum, *in vulnere* diluens iniectio 110. III
D.

Debilibus quonam lacte, & quomodo vtendum 8

Decocta vulneraria & potus 94. seq.

Decoctum *in abscessus maturatione*, 156

- *alkalino spontaneo*, leniens, acescens 57
 - *in anxietate febrili*, sudoriferum 236
 - *Aptbis deciduis* corroborans 367. 368
 - *in Calculosis*, diureticum propellens. 541
 - *lubricans vias*, oleosum 540
 - *in cancro*, aperiens, blandum 196
 - *ad contusa*, purgans forte, nec inflammans 135
 - *in fibra debili & laxa*, adstringens 11
 - *in fibra rigida*, diæteticum 15
 - *pharmaceuticum*, emolliens 17
 - *in febre intermittente* adstringens 275
- Deco.

INDEX II.

- Decoctum in febre intermittente, sudoriferum 276
- - frigore febrili, 230
 - - glutinoso spontaneo, 45
 - - humectans 28
 - - in hydrope, lymphæ fluorem concilians 480
 - - in ictero, leniter vi antiphlogistica aluum emol-
liendo subducens 347
 - - inflammatione, tenue, aromaticum, calide
potandum 156 ,
 - - diluens & refrigerans 154
 - - purgans, euacuans, reuellens.
ibid.
 - - intestinorum, balsamicum, de-
tergens 359
 - - Lue venerea, ante saluationem hauriendum
549
 - - Nepbritide, antiphlogisticum, leniens 372
 - - Ossium morbis, guaiaci, abstergens, penetrans
&c. 207
 - - Panis in debilibus, 9
- Decoctum panis, in fibra rigida, leniens humectans 9
15
- - in peripneumonia notha, leniter aperiens, &c.
318
 - - vera, per diuresin soluenda, diu-
reticum 310
 - - vera, spuo sananda, emolli-
ens 310
 - - suppurata, emolliens &
lenissime aperiens 312
 - - post peripneumoniam veram suppuratam, vergente
pure ad hepar, aperiens forte &c. 314
 - - in phthisi pulmonali, refrigerans stipticum. 462
 - - pleuritide, imminente gangraena, antise-
pticum aperiens, &c. 333
 - - laxans, resoluens, &c. 332
- Deco-

INDICATION. ET FORMVL.

- Decoctum *pro puerperis dolentibus a labore*, cardiacum 506
 - - *in scirrho non mouendo*, anodynum 196
 - - *Scorbuto acri*, lene antisepticum 446
 - - *Variolis*, ad stimulum variolosum expellendum 532
 - - *Visceribus fortioribus & rigidis*, resolvens 29
 - - *ad vlcus pulmonis apertum*, deterfiuum, aperiens 312
 Decoctum, *in vomica pulmonis*, balsamicum vulnerarium 464
 - - *in vulneribus*, adstringens 95
 - aperiens 95
 - attenuans 94
 - emendans acidi 95 alcali 95
 glutinosi & oleosi ibid.
 - excitans 95
 - inspissans ib.
 - laxans 95
 - mitigans 94
 - Capitis, attenuans, diluens, aquosum 124
 Deriuantia quænam sint. 74
 Deterfiua, *in fistulis* 163
 - *ad vlcus pulmonis apertum*, aperientia 311 seq.
 Diaphoretica *vide* sudorifera
 Digerentia, *ad conuulsa*, quænam 123
 Digestiua, *in fistulis*, liquefacta 162
 Digestiuum, *in vulneribus*, 102
 Diluentia 28
 - *in cancro*, aperientia, blanda 196
 - *pro puerperis ex lacte laborantibus* 507. 220.
 & *vide* 27. 28
 Diuretica quæ, & horum materies 138
 - *in anxietate febrili*, bona 236
 Dolorem tollentia 62

Exx6-

INDEX II.

E.

Eκκοπρωτικά 96

Elementa, *fibrae forti constituendae* apta, quamam
materia contineantur 8. 9

Elixir, *in vulneribus*, corrodens 103

Emetica *vide* vomitoria

Emmenagoga 495

Emollientia quamam sint 28

- *Alui* 96

- aquosa 17. 18

- *ad calculum*, aperientia, laxantia, pellentia
540

- *gangraeuosam escharam* 176

- *subfaringosa suboleosa* 17. 18

Emplastrum, *ad bubones venereos*, dissipans 548

- Cicatrisans 105

- *ad contusa*, digerens 123

- laxans, penetrans, resoluens
137

- Emplastrum defensivum, rubrum 102

- *in Lue venerea*, *ad diarrhoeam* in salivatione
mercuriali sistendam 550

- *in nausea febrili ex liquido nervoso turbato*,
stomachicum 242

- *ad paralyfin*, acre aromaticum 398

- *in pleuritide* 332

- *ad scirrhum*, emolliens, resoluens 189

- *in Scirrbo non mouendo*, saturninum, mercu-
riale, blandum 191

- *ad testes venereos tumidos* 548

- *in variolis suppurandis*, cauis pedum adpli-
candum 533

- *virginum morbis*, mouens 495

- *vulneribus*, retinendis balsamis aptum 102

- tenax 104

Emulsio, *antiplogistica*, diluens & refrigerans simul 155
Emul-

INDICATION. ET FORMVL.

Emulſio, *in alcali ſpontaneo*, aceſcens, leniens 58

- *fibra rigida*, emolliens 17
- *frigore febrili*, ſumenda 229
- *gonorrhœa venerea*, refrigerans 547
- *narcotica fortior* 99
- *mitiſſima* 98
- *paulo magis ſoporata* *ib.*

Emulſio, *in pleurizide*, laxans, reſoluens 337

Ens veneris Boylei *in rachitide* 551

Epispaſtica quid ſint, & quænam 154

- *in variolis ſuppurandis*, cauſis pedum adplicantur 533

Epithema *ad febres intermittentes* 278

- *in gangræna*, vires excitans, vbi acidum frigidum 173
- *ſuſcitans*, vbi alcaleſcentia calida *ib.*

- *pro infantibus recens natis*, ad ſaburram pituitoſam expellendam 513

- *narcoticum in vulnere* 100

- *in nauſea febrili*, ex liquido neruoſo turbato 242

Epulotica 105

Escharam gangrænoſam emollientia 105

Exſiccantia *in vulneribus* 103

Extractum, *in fibra laxa*, adſtringens 11

- *glutinoſo ſpontaneo*, ſtimulans 45

F.

Farinoſa mollia 16

Ferociæ animalium quorundam cauſſa 9

Fibræ ſorti conſtituendæ elementa apta quamam materia contineantur 8 ad 10

Flores, aromatici ſtimulantes 42. 43

Fomentum, *in cancro aperto*, lene, ſaturninum 197

- *ad contuſa*, digerens 123. laxans, penetrans, reſoluens 136

- *in febribus*, ad acre irritans externum,

Pp

muco-

1

Digitized by Google

INDICATION. ET FORMVL.

G.

Gangrænosa escharam emollientia 176
 Gargarifina. in angina inflammatoria; attenuans, nitrosum 291

laxans, pingue, *ibid.*

aphtis, laxans, detergens, &c. 367

deciduis, demulcens *ibid.*

apoplexia, pressionem in cerebrum minuens 385

Gelatina, *fructuum* subacidorum, nitrosorum, demulcentium, aquosorum, quam 238

panis in debilibus 9

Gummi *cicatrisantia* 105

in ulcere pulmonis aperto, deterfiva, aperientia 312

in virginum morbis, purgantia dicta vterina 495

Guttulæ narcoticæ pro haustu 99

in gravidis, ad paroxysmum hystericum 500

in visceribus fortioribus & rigidis, resoluentes 29

H.

Hauftus, in angina inflammatoria, purgans 290. 291
antiphlogisticus, purgans, euacuans, reuelans 153. 154

in anxietate febrili, purgans, 235

post aphtas, purgans, corroborans 368

ad contusa, purgans, fortis, nec inflammans 135

pro infantibus recens natis, intestini gluten expellens 513

Hauftus, *pro infantibus recens natis*, intestina lubricans 515

meconii duritiem

emolliens 514. propellens, cardiacus, *ibid.*

in lue venerea, purgans ad saluationis minuendum impetum 550

INDEX II.

- Hauftus**, *narcoticus* mitiffimus 98. paulo magis hypno-
ticus, *ibid.* & 533. plus foporatus 99
- *in naufea febrili ex liquido nervofo turbato* 243
- *rachitide*, emeticus 556
- *fcorbuto incipiente*, purgans 440
- *variolis fuppurandis*, narcoticus 533
- vermes necans 519
- *in ulcere hepatis*, depurans 343
- *pulmonis aperto*, vefpertinus, leniter
anodynus 313
- *vulneribus capitis*, ad reforbendum in venas
purgans 124
Helmontianus pulvis *biliofus* ftimulans 49
Herbæ *alcalescentes* 55
Herbæ *alcalescentes*, edules 76. 77
- *venenatæ ib.*
- *Rachitidi fanandæ propriæ* 556
- *ad vifcidum febrile*, lactefcentes, amaræ, frigidæ
227. vide vegetabilia.
Humectantia quæ, & horum materies 27
Hydragoga, *in hydropè*, fortia 482
Hydrogala, *in phthifi pulmonali* 463
Hypnotica 97-100. 313

I.

- I**nfusio biliofa *Petra de l Porco lapidis* 49
Infulum, *in fibra laxa*, adstringens 11,
- *Scorbuto acri*, lene, antifepticum &c. 446
- *Vomica pulmonali*, vulnerarium, ballami-
cum 466
Iniectio, *in convulfione*, extravaſatum cruorem & coagu-
latum diluens 110. 111
- *Fiftula pura*, consolidans 163
- *Fiftulis*, digeftiva 162
- *deterſiva. ibid.*
- *ad gonorrhœam veneream* 547
Infecta acria *ftimulantia* 45
Infupium, *in gangræna ex caufa calida*, ſpiritus exci-
tans 172 Iula-

INDICATION. ET FORMVL.

- Iulapium**, *pro grauidis*, in languore, cardiacum 500
 - - *in siti febrili*, gratissimum 238. 239. vide *Porus*.
Ius caneror. fluuiatilium, *ad humectandum*, leniendum
 emolliendum &c. 27
 - *Carnium humectans*, emolliens, *ibid*.
Iusculum carnis, *in intestinorum inflammatione*, medica-
 mentosum pro victu 359
Iura carniū pro debilibus, qualia, & quomodo præpa-
 randa 9

L.

- Lac**, *in debilibus* quale conducat 8. vtendi modus *ib.* in
Phtisi pulmonali 463
Lactescencia, *ad viscidum febrile*, amara, frigida 227
Laxantia, aperientia, emollientia, pellentia, ad calcu-
 lum 540
Lectuli, *in rachitide*, ex aromatibus 555. 556
Lenientia quænam sint 27
Linimentum, *in cancro aperto*, saturninum lene 197
 - *pro grauidis*, *ad varices*, *hæmorrhoides*,
 &c. 500
 - *in intermittentibus*, *ad spinam dorsi inun-*
gendam 277
 - *pro infanzibus* intestina lubricans 515
 - *ad papillas dolentes lactantium* 507
 - *ad paralyfin*, neruinum dictum 398
 - *in partu difficili*, emolliens 503
 - *Pleuritide*, laxans, resoluens, &c. 331
 - *Scirrbo non mouendo* anodynum 197
 - *ad vermes*, nidum destruens 518
 - *in virginum morbis*, stimulans vide 496
Linctus, *in peripneumonia*, sputo suppresso 315
Liquor, *ad caneros venereos*, causticus 549
 - *in gangræna*, parte incisa, calidus, corruptioni re-
 sistens 176
 - *Hæmorrhagia narium*, stipticus 346
 - *paralyfi*, penetrans, stimulans, *ad perfri-*
candas partes 398

INDEX II.

Liquor *in podagra*, vinosus, salinus 492

Lixivium, *in Sphacelo*, acre 183

Lumbrici, *vide vermes*

M.

Martis solutio *in Rachitide* 557

Massa balsamica, *in vomica pulmonis sanguinem*
condiens 465

Masticatoria, *in apoplexia*, ad pressionem *in cerebrum*
minuendam 385

Materies condimentorum, *in gangræna*, putredinem in-
cipientem corrigentium 174. 175

Maturantia *in pus* 159. 160

Mercurialia, *in obstructione*, attenuantia 73. & 481

in scirrho non mouendo, blanda 191

Mercurius dulcis *ad saluationem*, 550

Mistura, *in alcali spontaneo*, saponacea, abstergens, acida,
suboleosa 58

- *antiphlogistica*, diluens & refrigerans simul 155

- *in calculis*, opiata, aperiens 541

- *febris a nimio calore aeris*, subacida, nitrosa
224

intermittentibus, sudorifera, raro sal-

uens 276

- *frigore febrili*, sumenda 229

- *gangræna a causa frigida*, spiritus excitans, aci-
da 173

cardiaco - calida 177

- *pro gravidis*, cardiaca, aromatica 500

- *in fluxu uterino*, adstringens
501

- *in hydrope*, cardiaca, lymphæ fluorem concilians
480

- *ictera*, antiphlogistica & laxans 347

- *pro infantibus*, a lactis aciditate laborantibus 514

- *pro infantibus*, antacida 516

- *in languore febrili*, acris, excitans 225

- *lue venerea*, anodyna, ad diarrhœam sisten-
dam 550

Mistura,

INDICATION. ET FORMVL.

Mistura, *narcotica*, calida 99. frigida *ib.*

- *in nausea febrili ex liquido neruoso turbato*, austera, anodyna 242
- *pro puerperis dolentibus a labore*, cardiaca & anodyna 506
- *ad vermes*, nidum destruens 517
- *in visceribus fortioribus & rigidis*, resoluens 29
- *vomica pulmonis*, sanguinem muniens contra purulentiam 464

Motum sedantia, *in scirrho* 190. 191

Mulsa, *in phthisi pulmonali*, balsamica 463

N.

Narcotica quænam, & variæ formulæ 97 -- 100. 313.
fortiora & mitissima, *ibid.*

- *in variolis suppurantibus*, vespertina, vbi nimio impetu fuerit morbus 533

Nutritum, *in cancro aperto* 197

- *scirrho non mouendo* 191

Nutrimenta, *videatur* victus.

O.

Olea stimulantia 41

Olea alui emollientia 96

- *ad vulnera*, balsamica 101

Oleosa externa, *pro infantibus*, a lactis aciditate laborantibus, *ib.* sed vide 515

Olera, *in calculo*, optima, humida, blanda 539

- mollissima 16

Oleum, *ad phthisin pulmonalem*, expressum ex balsamicis lenissimis 462

Opiata, *in variolis*, vespertina, vbi nimio impetu furit morbus 533

- *in ulcere pulmonis aperto*, vespertina lenia 313

Ossa denudata, ab aëre, pure, &c. arcenis *tinctura* 124

Oui albumine, *in debilibus*, vtendi modus 9

P.

Panis, *in debilibus*, cremor 9

- decoctum, *ibid.*

P p 4

Panis,

INDEX II.

Panis, in debilibus, decoctum gratissimum 9
gelatina *ibid.*

Paregorica mitissima 97

Partes animalium, *aromaticæ*, acres, stimulantés 45

- *emollientes, oleosæ, blandæ* 18

- antacidæ 35

Pedra de'l porco lapidis infusum 49

Pellentia, ad calculum, emollientia, aperientia, laxan-
tia 5. 0

Peruvianæ corticis, in intermittentibus, præparationes va-
riæ 277

Pilulæ, *in fibra laxa*, adstringentes 13

- glutinoso, spontaneo, bilioſæ, ſtimulantes 48

- in gonorrhœa venerea, balsamica 547. purgantes *ibid.*

• *hydrope*, purgantes fortiter 482

narcoticæ 98

- in phthisi pulmonali, balsamicæ, lenes 463

- *in scorbuto incipiente*, purgantes 440

- *visceribus fortioribus rigidis, resoluentes* 29

- ad ulcus apertum pulmonis, aperientes deterfi-
uæ 312

anodynæ 313 vespertinæ leniter

- in vomica pulmonali, balsamica, sanguinem mu-
nientes a purulentia 465

Plantæ, *vide* vegetabilia.

Potulenta, *ad calculum*, aperientia, pellentia 540

- *pro debilibus* 9 ad II

- & alimenta, *fibrae forti constituendae*, elementa continentia 9 seq.

- *in fibra rigida*, lenientia, humectantia,
15 ad 17

- *in rachitide*, pro diæta 555

in scirrbo, ad diætā 190

Potus, in alcali spontaneo, acidus, abstergens, sapona-
ceus 39

Potus,

INDICATION. ET FORMVL.

- Potus**, *in anxietate febrili*, purgans 235
- *in febris*, a nimio calare aeris, aquosus, subacidus, leniter nitrosus 224
 - *in frigore febrili*, fumens 229
 - *in gangræna ex causâ calida*, spiritus excitans, 172
 - *in gangræna ex gelu*, cardiacus, calidus, refocillans 177
 - *pro grauidis languentibus*, cardiacus 500
 - *in hydropè*, cardiacus, acido-gratus, leniter aromaticus 480
 - *in nausea febrili ab acri, putri, &c.* 241. tum vide 235 ad 238
 - *in pleuritide*, refrigerans, resoluens &c. 332
 - *in peripneumonia vera sponte resoluenda*, lenis 310
 - - - *sputo suppresso*, leniter resoluens, antipyreticus 314
 - - - *in vlcus altum*, tussim mouens 311
 - *in podagra*, vinosus, salinus 492
 - *in rachitide*, pro diætâ 555
 - *in scorbuto acri*, lenis, antisepticus, &c. 446
 - *in fxi febrili*, commodissimus 238
 - *in variolis suppurandis*, antipyreticus, aperiens &c. 532
 - *in ventriculi inflammatione*, leniens &c. 351
 - *ad vermes*, destruens nidum 517
 - - - necandos 518
 - *in vomica pulmonis*, vulnerarius, balsamicus lenis 466
 - *vulnerarii*, & decocta 94. 95
 - *in vulneribus*, varii 95

Propellentia quæ sint, & qualis horum materies 74. vide Stimulantia.

Pulvinaria, *in rachitide*, ex aromatibus 556

Puluis, *ad amputationes*, adstringens 183

P p 5

Puluis,

INDEX II.

Pulvis, ad amputationes, narcoticus, cardiacus, ante operationem sumendus 183

- *antiphlogisticus, refrigerans, resoluens 155*

- *in anxietate febrili, purgans 235*

- *ad bubones venereos apertos, depurans 548*

- *in cancro, aperiens, blandus 196. purgans ib.*

- *ad contusa, purgans fortiter, nec inflammans 136*

- *in febris, ab aëris calore nimio, subacidus, nitrosus 224*

- *aëre humido, temperans, aromaticus ibid.*

- *intermittentibus, adstringens 278*

- *in fibra laxa, adstringens 13*

- *in glutinoso spontaneo, stimulan 48*

- *in gonorrhœa venerea, purgans 547*

- *Helmontianus, biliosus, stimulan 49*

- *in hydrocele, forma fumi vel vaporis sicci, discutiens 483*

- *ex sale marino, discutiens ibid.*

- *in hydropo, emeticus 481*

- *purgans ibid*

- *pro infantibus, antacidus 516*

- *in inflammatione, refrigerans, resoluens 155*

- *in languore febrili, excitans, acris, aromaticus, &c. 227*

- *in lue venerea, ubi diarrhœa ex salivatione, adstringens anodynus 550*

- *ad salivationem excitandam ib.*

- *in paralyfi, aromaticus, ad pannos pro frictionibus suffumigandos 398*

- *in peripneumonia, sputo suppresso, leniter resoluendo antipyreticus 314*

- *in phthisi pulmonali, antacidus 463*

- *pro puerperis dolentibus a labore, antacidus &c. 507*

- *in rachitide, ad pannos pro frictionibus suffumigandos 556*

Pulvis,

INDICATION. ET FORMVL.

- Puluis**, *in scirrho non mouendo*, anodynus 190
 - *in scorbuto incipiente*, purgans 440
 - *in variolis*, ad stimulum, variolosum expellendum 531
 - *vermes* expellens 519
 - *necans & purgans* 518
 - *in visceribus fortioribus & rigidis*, resoluens 30
 - *in ulcere pulmonis aperto*, leniter anodynus vespertinus 313
 - *aperiens*, deteriusus *ibid.*
 - *in vulneribus*, narcoticus 98
Purgantia, *in anxietate febrili*, commoda 235
 - *in apoplexia sanguinolenta instanti*, antiphlogistica 387. *sed vide* 153
 - *ad lentorem minuendum* 386
 - *in cancro* 196
 - *ad contusa*, fortia nec inflammantia 135. 136
 - *in febre intermittente* 276
 - *in inflammatione*, antiphlogistica, euacuantia, reuellentia 153
 - *in nausea febrili, a lenta &c. materia* 242. *sed vide* 234. 235
 - *in scorbuto incipiente* 440
 - *in vulneribus capitis*, ad resorbendum in venas 124
Putredinem, *in gangræna*, incipientem condimentorum corrigentium materies 174. *seqq.*
Putrefactum, *in gangræna*, a venis arcens 174
 R.
Radices *stimulantes aromaticæ* 43
 Resoluentia quæ, & qualis horum materies 28
 - *interna* 39. *sed vide* 27
Roborantia quæ, & qualia 34 *rum* 8. ad 13
Rob fructuum subacidorum, nitrosorum, demulcentium, aperientium, quænam 238

Sal

INDEX II.

S.

Sal volatile ficcum, alcalinum, aromaticum, *antacidum*, artificiale 36

- oleosum *antiscorbuticum* 443

- in glutinoso spontaneo, stimulanſ 48

Salia, in febribus intermittentibus, aperientia, alcalinâ & composita 275

Salina stimulantia acida, fermentata, igne producta, nativa 40

- - - - - alcalina, fixa volatilia ib.

- - - - - composita 41

Saponacea stimulantia 49. *sed vide* 36

Sapones, in obstructione, attenuantes, nativi, ex oleo & alcali, quinam 73

- - - - - compositi, ex oleo

& alcali, quinam ib.

- - - - - fuliginosi volati-

les *ibid.*

Sarcotica 104

Saturnina, in scirrho non mouendo, blanda 191

Sedantia, in scirrho, morum 190. 191

Semina aromatica stimulantia 44

Spiritus, in gangrena, excitantia, vario in casu, varia 172. *seq.*

Spiritus antiscorbuticus 443

- C. C. pro infantibus, in convulsionibus 521

- in glutinoso spontaneo, stimulanſ 47

- ad papillas dolentes 507

Stimulantes cortices aromatici 44

- Flores - 42

- Partes animalium, aromaticæ, acres 45

Stimulantes plantæ acres, aromaticæ dictæ, quæ 42

- Radices aromaticæ 43

- Spiritus inflammabiles fermentati 42

- Succi aromatici 44

Stimulantia quæ, & quænam horum materies 39-49

- - - - - acida salina, 39

Stimu-

INDICATION. ET FORMVL.

Stimulantia alcalina salina fixa 40

volatilia *ib.*

- Animalia 45

- Biliosa 49

- composita 45. *seq.*

- - salina 41

- Insecta acria 45

- Olea acria aromatica vel ambusta 41

- - expressa nativa, per

retortam destillata *ibid.*

- Salina quælibet 40

- Saponacea 49. *sed vide* 29

- simplicia 42

- Vegetabilia 42--44

Stiptici liquores, in hæmorrhagia narium, variū 346

Subferinosa emollientia 16. 17

Suboleosa emollientia *ib.*

Succi Fructuum horæorum, ad fibræ rigidam, aqua diluendi, quales 15

- expressi, ex plantis antiscorbuticis lenioribus & acrioribus, formula 443

- stimulantæ, acres, aromatici 44

Sudorifera quæ sint, & quænam horum materies 138

- in anxietate febrili, quænam commoda 235

Sudoriferum antipyreticon raro fallens 276

Suppositoria, pro infantibus, ad meconium expellendum 514

Syrupi emollientes, molles 19

- Fructuum subacidorum, nitrosorum, quænam 238

T.

Tepesfactoria in pleuritide, 332

Tinctura, in glutinoso spontaneo, stimulans 46

- - - in hydrope, purgans fortiter 482

- - - Cupri, in hydrope, diuretica & solvens 481

- - - Martis, in rachitide, roborans 558

Tinctura mastiches, in ossium denudatione, ærem, pus &c. arcens 124

Vapor

INDEX II.

V.

- V**apor, *in angina inflammatoria*, hauriendus 291
 - *in apoplexia ex causa lenta*, nares stimulans 386
 - - *in hydrocele*, aromaticus, siccus, discutiens 383
 - - *peripneumonia, suppresso sputo*, emolliens 314
sed vide 313
 Vapores, *ad rigiditatem*, emollientes, ex quibusnam
 fiant 19
 - - *in virginum morbis*, vterini 497
 - - *in ulcere aperto pulmonis*, emollientes 313
 Vegetabilia, *acido austera* 10
 - *alkalescentia*, condimentis seruientia & edulia
 55 *venenata ib.*
 - *Aluum*, leniter vi antiphlogistica emollien-
 do subducentia 347
 - *Antacida* 33. 34
 - *antiphlogistica*, emollientia lenia, *in ne-*
pbrtide, bona 373
 - *antiscorbutica acriora* 442
 Vegetabilia, *antiscorbutica calida* 442
 - *frigidiuscula* 444 *modice ad-*
stringentia ib.
 - *Rachitidi sanandæ propria*
 556
 - *specificæ leniora* 441
 - *farinosa mollia* 16
 - *lenia, antiphlogistica emollientia* 373
 - *mollissima, olera dicta* 16
 - *ad viscidum febrile*, lactescencia, amara,
frigida 227
 Vermes *necantia* medicamenta 518
 - *expellentia* medicamenta 519
 Vermium *nidum* destruentia media 517
 Velicatoria 49
 Victus, *pro aphthosis* optimus, quinam 366 *sed vide* 15

Victus,

INDICATION. ET FORMVL.

Viētus, ad apoplexiam sanguinolentam & medicamina 387
sed vide 348

- *in calculosis* 539
- *pro debilibus* 9. 10
- *in fibra rigida* 27 seq.
- *in gangranosa temperie acida, vires fuscitans* 173
sed vide 33. 34

Viētus in gangranosa temperie alcalina vires fuscitans 173
sed vide 56. 57

- *in hepatis ulcere* 348
- *Intestinorum inflammatione* 359
- *Peripneumonia in abscessum vergente* 310 *sed vide* 27. seq.
- *Phthisi pulmonali* 364
- *Rachitide* 554. 555
- *pro Scirrhis* 189. 190
- *in ulcere hepatis* 348

Vinorum in debilibus a fibra laxa, genera quæ 10

Vinum medicatum antacidum 33

- *antiscorbuticum* 444
- *in fibra laxa, adstringens* 12
- *glutinoso spontaneo, stimulan* 48
- *gravidarum morbis, aromaticum* 500
- *Hydrope, lymphæ fluorem concilians* 479
- *roborans* 482
- *in mania a debilitate corporis, cardiacum*
roborans 421

- *Rachitide, roborans, &c.* 557

- *ad vermes necandos* 519

Vires, in gangræna, fuscitantia 173

Vnguenta cicatrisantia 105

- *emollientia* 19
- *escharam gangranosam emollientia* 176
- *ad febrim excitans, acre stimulan externum,*

lenta, oleosa &c. 223

- *mollia emollientia* 19

Vnguēti-

INDEX INDICATION. ET FORMVL.

Vnguenta *Vermes* expellentia externa 518

Vnguentum aureum 104

- Basilicon *ib.*

- ad *Contusa*, digerens 123

- exsicicans 103

- in *scirrho non mouendo*, anodynum, faturinum, blandum, ad litum 191

- Tetrapharmacum 104

Vomitoria in *anxietate febrili*, commoda 234

- *Apoplexia*, lentorem attenuantia 385

- *Febre intermittente* 275

- *Febribus ex copia ciborum*, lenia 225

- *Hydrope*. 481. 482

- *anxietate febrili a lenta &c. materia* 234

Vomitorium in *Rachitide* 556

FINIS.



ANT 1312731

